

حملة شبابنا

برنامج

رحلتي في السادس

الطريق الى 100

حلول جميع الاسئلة الوزارية

من 1996 الى 2016

يمنع طباعتها او بيعها بأكثر من سعر الاستنساخ

الى أبناء
وطني

برنامج
رحلتي في
السادس

2016-2017

الطريق الى الـ 100
حلول جميع الاسئلة
الوزارية 1996-2016

السادس
التطبيقي

قصي هاشم

07902162268

رحلتي في السادس

* ان كل ما يقدمه البرنامج من مساعدة هو عمل خيري يهدى الى الله تعالى ...

* لا يحق لأي شخص استغلال الطلبة واستخدام ما يوجد في برنامجنا لأغراض مادية ...

* يمنع حذف حقوق البرنامج من الملزم وسحبها او طباعتها بأكثر من ثمن الاستنساخ

* البرنامج هو احد أنشطة حملة شبابنا ويهدف الى خدمة الطلبة وتوفير ما يحتاجونه من ملازم ونصائح وغيرها ...
تحت شعارنا الموحد ...

الى الله تعالى

الى أبناء
وطني

برنامج
رحلتي في
السادس

2016-2017

عزيزي الطالب اعلم ان ...
اذا اهدرت وقتك الان فلا تلم الا نفسك خدا
اصبر على ما لاتحب من المواد من اجل ما لاتحب
هذه الدنيا مسألة حسابية ... اجعل من اليوم عبرة ومن
الامس خبرة ... اجمع لها الجد والاجتهاد
واطرح منها التعب والشقاء
واترك الباقي على رب السماء

ابعد وسائل التسلية
والترفيه عن مكان
المذاكرة

قصي هاشم

07902162268

حلول الاسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الاول (مجموعة الاعداد المركبة) مرتبة حسب
تسلسل المنهج المقرر

1999 دور 1

جد بالصيغة العادية للعدد المركب $\left(\frac{3-i}{1+i}\right)^2$

$$\text{Sol: } \left(\frac{3-i}{1+i}\right)^2 = \left(\frac{3-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i}\right)^2 = \left(\frac{(3-1) + (-3-1)i}{1+1}\right)^2 = \left(\frac{2-4i}{2}\right)^2$$

$$= (1-2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = -3 - 4i$$

2000 دور 1

إذا كانت $x=2+3i$, $y=3-i$ جد قيمة $x^2 + 2y^2$

$$\text{sol: } x^2 + 2y^2 = (2+3i)^2 + 2(3-i)^2 = (4 + 12i + 9i^2) + 2(9 - 6i + i^2)$$

$$= (-5 + 12i) + 2(8 - 6i) = (-5 + 12i) + (16 - 12i) = 11 + 0i$$

2004 دور 1

جد الصيغة العادية للعدد المركب $(1 - \sqrt{3}i)^2 - (2 - \sqrt{3}i)^2$

$$\text{sol: } (1 - \sqrt{3}i)^2 - (2 - \sqrt{3}i)^2 = (1 - 2\sqrt{3}i + 3i^2) - (4 - 4\sqrt{3}i + 3i^2)$$

$$= (-2 - 2\sqrt{3}i) - (1 - 4\sqrt{3}i) = (-2 - 2\sqrt{3}i) + (-1 + 4\sqrt{3}i)$$

$$= -3 + 2\sqrt{3}i$$

2005 دور 1

جد ناتج بالصيغة الديكارتية $(3+4i)^2 + (5-3i)(1+i)$

$$\text{sol: } (3+4i)^2 + (5-3i)(1+i) = (9 + 24i + 16i^2) + (5 + 5i - 3i - 3i^2)$$

$$= (-7 + 24i) + (8 + 2i) = 1 + 26i = (1, 26)$$

1998 دور 1

ضع بالصورة العادية للعدد المركب $(1+3i)^2 + (3-2i)^2$

$$\text{sol: } (1+3i)^2 + (3-2i)^2 = (1 + 6i + 9i^2) + (9 - 12i + 4i^2)$$

$$= (-8 + 6i) + (5 - 12i) = -3 - 6i$$

2002 دور 1

ضع مايأتي بالصيغة العادية ثم جد نظيره الضربي $(-2 + i)(3 + 2i)$

sol : $c = (3 + 2i)(-2 + i) = -6 + 3i - 4i + 2i^2 = -8 - i$

$$C^{-1} = \frac{1}{c} = \frac{1}{-8-i} = \frac{1}{-8-i} \cdot \frac{-8+i}{-8+i} = \frac{-8+i}{64+1} = \frac{-8}{65} + \frac{1}{65} i$$

2003 دور 1

جد النظير الضربي للعدد المركب $3 + 5i$ ثم ضعه بالصورة العادية .

sol : $C^{-1} = \frac{1}{c} = \frac{1}{3+5i} = \frac{1}{3+5i} \cdot \frac{3-5i}{3-5i} = \frac{3-5i}{9+25} = \frac{3}{34} - \frac{5}{34} i$

2005 دور 2

إذا كانت $x = -1 + 2i$ جد قيمة $x^2 + 3x + 5$ بالصيغة الديكارتية (ارجاند)

sol: $x^2 + 3x + 5 = (-1 + 2i)^2 + 3(-1 + 2i) + 5$

$$= (1 - 4i + 4i^2) + (-3 + 6i) + 5$$

$$= (-3 - 4i) + (2 + 6i) = -1 + 2i = (-1, 2) \text{ وهي صيغة ارجاند المطلوبة}$$

2009 دور 2

حل المعادلة $z^4 + 13z^2 + 36 = 0$

sol : $z^4 + 13z^2 + 36 = 0 \Rightarrow (z^2 + 9)(z^2 + 4) = 0$

$$\text{either } z^2 = -9 \Rightarrow z = \pm 3i \quad \text{OR } z^2 = -4 \Rightarrow z = \pm 2i$$

2013 دور 1

جد قيمة $(1-i)(1-i^2)(1-i^3)$

sol : $(1-i)(1-i^2)(1-i^3) = (1-i)(1+1)(1+i) = (2)(1+1) = (2)(2) = 4$

2010 تمهيدي

إذا كان $a + bi = \frac{2+i}{1-i}$ اثبت ان $2(a^3 + b^3) = 7$

sol : $a + bi = \frac{2+i}{1-i} = \frac{2+i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{2+2i+i-1}{2} = \frac{1+3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} i$

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{3}{2} \Rightarrow 2(a^3 + b^3) = 2\left(\frac{1}{8} + \frac{27}{8}\right) = 2\left(\frac{28}{8}\right) = 7$$

2012 دور 3

اثبت ان $\frac{(1-i)^2}{1+i} + \frac{(1+i)^2}{1-i} = -2$

sol : $\frac{(1-i)^2}{1+i} + \frac{(1+i)^2}{1-i} = \frac{1-2i+i^2}{1+i} + \frac{1+2i+i^2}{1-i} = \frac{-2i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} + \frac{2i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i}$

$$= \frac{-2i+2i^2}{1+1} + \frac{2i+2i^2}{1+1} = (-1-i) + (-1+i) = -2$$

ضع بالصيغة العادية للعدد المركب $(1 + i)^5 - (1 - i)^5$

2012 دور 2

$$\text{sol : } (1+i)^5 = (1+i)^4 (1+i) = [(1+i)^2]^2 (1+i) = (1+2i+i^2)^2 (1+i)$$

$$= (2i)^2 (1+i) = 4i^2 (1+i) = -4(1+i) = -4 - 4i$$

$$(1-i)^5 = (1-i)^4 (1-i) = [(1-i)^2]^2 (1-i) = (1-2i+i^2)^2 (1-i)$$

$$= (-2i)^2 (1-i) = 4i^2 (1-i) = -4(1-i) = -4 + 4i$$

$$(1+i)^5 - (1-i)^5 = (-4 - 4i) - (-4 + 4i) = (-4 - 4i) + (4 - 4i) = 0 - 8i$$

إذا كان $x = 2i - 1$ جد قيمة $x^2 + 2x + 6$

2007 خارج القطر

$$\text{sol : } x^2 + 2x + 6 = (-1+2i)^2 + 2(-1+2i) + 6$$

$$= (1 - 4i + 4i^2) + (-2 + 4i) + 6 = (-3 - 4i) + (4 + 4i) = 1 + 0i$$

ضع المقدار $\frac{(1-i)^{13}}{64}$ بالصيغة العادية للعدد المركب

2013 خارج القطر

$$\text{sol : } \frac{(1-i)^{13}}{64} = \frac{(1-i)^{12} (1-i)}{64} = \frac{[(1-i)^2]^6 (1-i)}{64} = \frac{(1-2i+i^2)^6 (1-i)}{64}$$

$$= \frac{(-2i)^6 (1-i)}{64} = \frac{64 i^6 (1-i)}{64} = \frac{-64 (1-i)}{64} = -(1-i) = -1 + i$$

جد قيمتي $x, y \in \mathbb{R}$ التي تحقق $(2x + i)(y - 2i) = -2 - 9i$

1996 دور 1

$$\text{sol : } (2xy + 2) + (-4x + y)i = -2 - 9i$$

$$2xy + 2 = -2 \Rightarrow 2xy = -4 \dots\dots\dots (1)$$

$$-4x + y = -9 \Rightarrow y = 4x - 9 \dots\dots\dots (2) \text{ في (1) نعوض}$$

$$2x(4x - 9) = -4 \Rightarrow [8x^2 - 18x + 4 = 0] \div 2 \Rightarrow 4x^2 - 9x + 2 = 0$$

$$(4x - 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow 4x - 1 = 0 \Rightarrow 4x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{4} \therefore y = 1 - 9 = -8$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \therefore y = 8 - 9 = -1$$

جد قيمتي $x, y \in \mathbb{R}$ التي تحقق $(2x + i)(y + 2i) = 2 + 9i$ واجب بنفس الأسلوب

2006 دور 1

$$\text{Ans : } x = \frac{1}{4} \rightarrow y = 8, x = 2 \rightarrow y = 1$$

$$(2 + xi)(-x + i) = \frac{9y^2 + 49}{3y + 7i}$$

جد قيمتي x, y الحقيقيتين التي تحقق

1998 دور 2

$$\text{sol : } (2 + xi)(-x + i) = \frac{9y^2 + 49}{3y + 7i} \Rightarrow (-2x + 2i - x^2 i + x i^2) = \frac{9y^2 - 49i^2}{3y + 7i}$$

$$(-2x - x) + (2 - x^2) = \frac{(3y - 7i)(3y + 7i)}{3y + 7i} \Rightarrow (-3x) + (2 - x^2)i = 3y - 7i$$

$$-3x = 3y \Rightarrow -x = y \dots (1)$$

$$2 - x^2 = -7 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

$$x = 3 \Rightarrow y = -3, \quad x = -3 \Rightarrow y = 3$$

$$(3x + 2yi)^2 = \frac{200}{4 + 3i} \text{ جد قيمتي } x, y \text{ الحقيقيتين التي تحقق}$$

1999 دور 2

$$\text{sol : } (3x + 2yi)^2 = \frac{200}{4 + 3i} \Rightarrow 9x^2 + 12xyi + 4y^2 i^2 = \frac{200}{4 + 3i} \cdot \frac{4 - 3i}{4 - 3i}$$

$$(9x^2 - 4y^2) + (12xy)i = \frac{200(4 - 3i)}{25} \Rightarrow (9x^2 - 4y^2) + (12xy)i = 8(4 - 3i)$$

$$(9x^2 - 4y^2) + (12xy)i = 32 - 24i$$

$$9x^2 - 4y^2 = 32 \dots (1), \quad 12xy = -24 \Rightarrow y = \frac{-2}{x} \dots (2) \text{ in } (1)$$

$$9x^2 - 4\left(\frac{-2}{x}\right)^2 = 32 \Rightarrow \left[9x^2 - \frac{16}{x^2} = 32\right] \cdot x^2$$

$$9x^4 - 16 = 32x^2 \Rightarrow 9x^4 - 32x^2 - 16 = 0$$

$$(9x^2 + 4)(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow \text{either } 9x^2 + 4 = 0 \text{ غير ممكن لانه مجموع مربعين}$$

$$\text{OR } x^2 = 4 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \rightarrow y = -1 \\ x = -2 \rightarrow y = 1 \end{cases}$$

$$x(x + i) + y(y - i) + i = 13 \text{ جد قيمتي } x, y \text{ الحقيقيتين التي تحقق}$$

2000 دور 2

$$\text{sol : } (x^2 + xi) + (y^2 - yi) = 13 - i \Rightarrow (x^2 + y^2) + (x - y)i = 13 - i$$

$$x^2 + y^2 = 13 \dots (1), \quad x - y = -1 \Rightarrow x = y - 1 \dots (2) \text{ in } (1)$$

$$(y - 1)^2 + y^2 = 13 \Rightarrow y^2 - 2y + 1 + y^2 - 13 = 0 \Rightarrow 2y^2 - 2y - 12 = 0$$

$$y^2 - y - 6 = 0 \Rightarrow (y - 3)(y + 2) = 0$$

$$\text{either } y = 3 \Rightarrow x = 3 - 1 = 2 \text{ OR } y = -2 \Rightarrow x = -2 - 1 = -3$$

$$\frac{2-i}{1+i} x + \frac{3-i}{2+i} y = \frac{1}{i} \text{ التي تحقق } x, y \in R \text{ جد قيمتي}$$

2004 دور 2

$$\text{sol: } \left(\frac{2-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} \right) x + \left(\frac{3-i}{2+i} \cdot \frac{2-i}{2-i} \right) y = \left(\frac{1}{i} \cdot \frac{-i}{-i} \right)$$

2005 دور 2

$$\left(\frac{(2-1)+(-2-1)i}{1+1} \right) x + \left(\frac{(6-1)+(-3-2)i}{4+1} \right) y = -i$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}i \right) x + (1-i)y = 0-i \Rightarrow \left(\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}xi \right) + (y-yi) = 0-i$$

$$\left(\frac{1}{2}x + y \right) + \left(-\frac{3}{2}x - y \right)i = 0-i$$

$$\frac{1}{2}x + y = 0 \Rightarrow x + 2y = 0 \Rightarrow x = -2y \dots\dots\dots (1)$$

$$-\frac{3}{2}x - y = -1 \Rightarrow -3x - 2y = -2 \dots\dots\dots (2)$$

$$6y - 2y = -2 \Rightarrow 4y = -2 \Rightarrow y = \frac{-1}{2} \Rightarrow x = (-2) \left(\frac{-1}{2} \right) = 1$$

ملاحظة \\\\ اذا وجد
i وحده في المقام
يمكن ان نضرب
البسط بالعدد (1)
ونعبر عنه اما $(-i^2)$
او (i^4) ثم نختصر
البسط مع المقام

$$(x+i)(y-3i) = -1-13i \text{ التي تحقق } x, y \text{ الحقيقيتين جد قيمتي}$$

2006 تمهيدي

$$\text{sol: } xy - 3ix + iy - 3i^2 = -1 - 13i$$

$$(xy + 3) + (-3x + y)i = -1 - 13i$$

$$xy + 3 = -1 \Rightarrow xy = -4 \dots\dots(1)$$

$$-3x + y = -13 \Rightarrow y = 3x - 13 \dots\dots(2) \text{ in } 1$$

$$x(3x - 13) = -4 \Rightarrow 3x^2 - 13x + 4 = 0 \Rightarrow (3x - 1)(x - 4) = 0$$

$$\text{either } x = \frac{1}{3} \Rightarrow y = 3\left(\frac{1}{3}\right) - 13 = 1 - 13 = -12 \text{ OR } x = 4 \Rightarrow y = 12 - 13 = -1$$

$$(3x-i)(2y+i) + 11 = 7i \text{ التي تحقق } x, y \text{ الحقيقيتين جد قيمتي}$$

2006 دور 2

$$\text{sol: } 6xy + 3xi - 2yi - i^2 = -11 + 7i \Rightarrow (6xy + 1) + (3x - 2y)i = -11 + 7i$$

$$6xy + 1 = -11 \Rightarrow 6xy = -12 \Rightarrow y = \frac{-2}{x} \dots\dots(1) \text{ in } (2)$$

$$3x - 2y = 7 \dots\dots(2) \Rightarrow \left[3x + \frac{4}{x} = 7 \right] \cdot x \Rightarrow 3x^2 + 4 = 7x$$

$$3x^2 - 7x + 4 = 0 \Rightarrow (3x - 4)(x - 1) = 0$$

$$\text{either } x = \frac{4}{3} \Rightarrow y = \frac{-2}{\frac{4}{3}} = -2 \left(\frac{3}{4} \right) = \frac{-3}{2} \text{ OR } x = 1 \Rightarrow y = -2$$

2008 دور 2

جد قيمتي x, y الحقيقيتان التي تحقق $y + 5i = (2x + i)(x + i)$

$$\text{sol: } y + 5i = 2x^2 + 2xi + xi + i^2 \Rightarrow y + 5i = (2x^2 - 1) + 3xi$$

$$2x^2 - 1 = y \quad \dots (1), \quad 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \text{ in } (1) \Rightarrow 2\left(\frac{25}{9}\right) - 1 = y$$

$$y = \frac{50}{9} - 1 = \frac{50-9}{9} = \frac{41}{9}$$

2009 تممجي

جد قيمتي x, y الحقيقيتان التي تحقق $(3 + 2i)^2 y = (x + 3i)^2$

$$\text{sol: } (9 + 12i + 4i^2) y = (x^2 + 6ix + 9i^2)$$

$$(5 + 12i) y = (x^2 - 9) + 6ix \Rightarrow 5y + 12yi = (x^2 - 9) + 6ix$$

$$5y = x^2 - 9 \quad \dots (1), \quad 12y = 6x \Rightarrow x = 2y \quad \dots (2) \text{ in } 1$$

$$5y = 4y^2 - 9 \Rightarrow 4y^2 - 5y - 9 = 0 \Rightarrow (4y - 9)(y + 1) = 0$$

$$\text{either } y = \frac{9}{4} \Rightarrow x = \frac{9}{2} \quad \text{OR } y = -1 \Rightarrow x = -2$$

2010 دور 1

جد قيمتي x, y الحقيقيتان التي تحقق $12 + 5i = (x + 3i)(y - 2i)$

$$\text{sol: } 12 + 5i = xy - 2xi + 3yi - 6i^2 \Rightarrow 12 + 5i = (xy + 6) + (-2x + 3y)i$$

$$xy + 6 = 12 \Rightarrow xy = 6 \Rightarrow y = \frac{6}{x} \quad \dots (1) \text{ in } 2, \quad -2x + 3y = 5 \quad \dots (2)$$

$$-2x + 3\left(\frac{6}{x}\right) = 5 \Rightarrow -2x^2 + 18 = 5x \Rightarrow 2x^2 + 5x - 18 = 0$$

$$(2x + 9)(x - 2) = 0$$

$$\text{either } x = \frac{-9}{2} \Rightarrow y = 6\left(\frac{-2}{-9}\right) = \frac{-4}{3} \quad \text{OR } x = 2 \Rightarrow y = 3$$

2010 تممجي

جد قيمتي x, y الحقيقيتان التي تحقق $(x + yi)(1 - \sqrt{-3}) = -2\omega - 2\omega^2$

$$\text{sol: } (x + yi)(1 - \sqrt{3}i) = -2(\omega + \omega^2) \Rightarrow (x + yi)(1 - \sqrt{3}i) = 2$$

$$x + yi = \frac{2}{1 - \sqrt{3}i} \cdot \frac{1 + \sqrt{3}i}{1 + \sqrt{3}i} \Rightarrow x + yi = \frac{2(1 + \sqrt{3}i)}{1 + 3} \Rightarrow x + yi = \frac{(1 + \sqrt{3}i)}{2}$$

$$x + yi = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow x = \frac{1}{2}, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

2015 دور 1

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

6

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2012 دور 1

جد قيمتي x, y الحقيقيتان اذا علمت ان $\frac{2+i}{3-i}$, $\frac{5}{x+yi}$ مترافقان

$$\text{sol: } \overline{\left(\frac{2+i}{3-i}\right)} = \frac{5}{x+yi} \Rightarrow \left(\frac{2-i}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i}\right) = \frac{5}{x+yi} \Rightarrow \left(\frac{(6-1)+(-3-2)i}{10}\right) = \frac{5}{x+yi}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i = \frac{5}{x+yi} \Rightarrow 1 - i = \frac{10}{x+yi} \Rightarrow x + yi = \frac{10}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} \Rightarrow x + yi = \frac{10(1+i)}{2}$$

$$x + yi = 5 + 5i \Rightarrow x = 5, y = 5$$

2015 دور 3

جد قيمتي x, y الحقيقيتين اذا علمت ان $\frac{3+i}{2-i}$, $\frac{6}{x+yi}$ مترافقان

$$\text{sol: } \left(\frac{3+i}{2-i}\right) = \frac{6}{x+yi} \Rightarrow \left(\frac{3-i}{2+i} \cdot \frac{2-i}{2-i}\right) = \frac{6}{x+yi} \Rightarrow \left(\frac{(6-1)+(-3-2)i}{5}\right) = \frac{6}{x+yi}$$

$$1 - i = \frac{6}{x+yi} \Rightarrow x + yi = \frac{6}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} \Rightarrow x + yi = \frac{6(1+i)}{2}$$

$$x + yi = 3 + 3i \Rightarrow x = 3, y = 3$$

2012 خارج النظر

جد قيمتي x, y الحقيقيتان اذا علمت ان $\left(\frac{1-i}{1+i}\right) + (x + yi) = (1 + 2i)^2$

$$\text{sol: } \left(\frac{1-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i}\right) + (x + yi) = (1 + 4i + 4i^2) \Rightarrow \left(\frac{1-2i-1}{1+1}\right) + (x + yi) = (1 + 4i - 4)$$

$$(0 - i) + (x + yi) = -3 + 4i \Rightarrow (x) + (-1 + y)i = -3 + 4i$$

$$x = -3, -1 + y = 4 \Rightarrow y = 5$$

2003 دور 3

جد قيمتي x, y الحقيقيتين التي تحقق المعادلة $\frac{y}{1+i} = \frac{x^2+4}{x+2i}$

$$\frac{x^2 - 4i^2}{x+2i} = \frac{y}{1+i} \Rightarrow \frac{(x-2i)(x+2i)}{x+2i} = \frac{y}{1+i} \Rightarrow x - 2i = \frac{y}{1+i}$$

الحل //

$$(x - 2i)(1 + i) = y \Rightarrow (x + 2) + (x - 2)i = y + 0i$$

$$x + 2 = y \dots\dots (1), \quad x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 2 + 2 = 4$$

جد قيمتي x, y الحقيقيتان التي تحقق المعادلة $\frac{125}{11+2i}x + (1-i)^2y = 11$

2016 تمهيدي

$$\text{sol: } \frac{125}{11+2i} \cdot \frac{11-2i}{11-2i}x + (1-2i+i^2)y = 11 \Rightarrow \frac{125(11-2i)}{125}x + (-2i)y = 11$$

$$(11x - 2xi) + (0 - 2yi) = 11 \Rightarrow (11x) + (-2x - 2y)i = 11 + 0i$$

$$11x = 11 \Rightarrow x = 1, -2x - 2y = 0 \Rightarrow -x - y = 0 \Rightarrow -1 - y = 0 \Rightarrow y = -1$$

تلميح || هناك طرق اخرى لحل السؤال كأن تضرب كل المعادلة في $(11+2i)$ للتخلص من المقامات او ان نجعل العدد 125 بالصورة التالية $125 = 121 + 4 = 121 - 4i^2 = (11+2i)(11-2i)$ ثم تختصر مع المقام.

علما ان السؤال بصيغته الحالية غير موجود نصا في الكتاب المدرسي

جد قيمتي $x, y \in \mathbb{R}$ اذا علمت ان $(x+2i)(x-i) = \frac{121+9y^2}{11+3yi}$

2016 دور 2

$$\text{sol: } (x^2 - xi + 2xi - 2i^2) = \frac{121-9y^2i^2}{11+3yi}$$

$$(x^2 + 2) + (-x + 2x)i = \frac{(11-3yi)(11+3yi)}{11+3yi}$$

$$(x^2 + 2) + (x)i = 11 - 3yi$$

$$x^2 + 2 = 11 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

$$x = -3y \Rightarrow x=3 \Rightarrow 3 = -3y \Rightarrow y = -1, x = -3 \Rightarrow -3 = -3y \Rightarrow y = 1$$

تأكيد || يمكن تبسيط الطرف الايمن من خلال الضرب بالعامل المرافق كما موضح ادناه

$$\frac{121+9y^2}{11+3yi} \cdot \frac{11-3yi}{11-3yi} = \frac{(121+9y^2)(11-3yi)}{(121+9y^2)} = 11 - 3yi$$

اذا كان $x = 3+2i, y = 1-i$ اثبت ان $\overline{x+y} = \bar{x} + \bar{y}$

2006 تمهيدي

$$\text{LHS: } \overline{x+y} = \overline{(3+2i) + (1-i)} = \overline{4+i} = 4-i$$

$$\text{RHS: } \bar{x} + \bar{y} = \overline{(3+2i)} + \overline{(1-i)} = (3-2i) + (1+i) = 4-i \Rightarrow \text{LHS} = \text{RHS}$$

إذا كان $C_1 = 7 - 4i$, $C_2 = 2 - 3i$ فتتحقق من : $\frac{\overline{C_1}}{C_2} = \frac{\overline{C_1}}{C_2}$

2014 تمهيدي

$$\text{LHS: } \frac{\overline{C_1}}{C_2} = \frac{\overline{7-4i}}{2-3i} = \frac{7-4i}{2-3i} \cdot \frac{2+3i}{2+3i} = \frac{(14+21i-8i+12)}{4+9} = \frac{(26+13i)}{13} = \overline{2+i} = 2-i$$

$$\text{RHS: } \frac{\overline{C_1}}{C_2} = \frac{\overline{7-4i}}{2-3i} = \frac{7+4i}{2+3i} = \frac{7+4i}{2+3i} \cdot \frac{2-3i}{2-3i} = \frac{14-21i+8i+12}{4+9} = \frac{26-13i}{13} = 2-i$$

إذا كان $c, d \in \mathbb{R}$ وكان $c + di = \frac{7-4i}{2+i}$ جد $\sqrt{2c-d}i$

1997 دور 1

sol: $c + di = \frac{7-4i}{2+i} \cdot \frac{2-i}{2-i} = \frac{14-7i-8i-4}{4+1} = \frac{10-15i}{5} = 2-3i \Rightarrow c = 2, d = -3$

$$\sqrt{2c-d}i = \sqrt{4+3}i$$

$$\sqrt{4+3}i = x + yi$$

$$4 + 3i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = 4 \dots\dots(1), 2xy = 3 \dots\dots(2), y = \frac{3}{2x} \dots\dots(3) \text{ in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{3}{2x}\right)^2 = 4 \Rightarrow \left[x^2 - \frac{9}{4x^2} = 4\right] \cdot x^2 \Rightarrow 4x^4 - 9 = 16x^2 \Rightarrow 4x^4 - 16x^2 - 9 = 0 \Rightarrow (2x^2 - 9)(2x^2 + 1) = 0$$

يهمل (مجموع مربعين ليس له حل في الاعداد الحقيقية) $2x^2 + 1 = 0$

$$\text{OR } 2x^2 - 9 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}} \Rightarrow y = \left(\frac{3}{\pm 2(\frac{3}{\sqrt{2}})}\right) \Rightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ans: $\sqrt{4+3}i = \left\{ \pm \left(\frac{3}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \right\}$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

9

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد الجذران التربيعيان للعدد المركب $3 + 4i$

2007 دور 1

بتربيع الطرفين $\sqrt{3 + 4i} = x + yi$

$$3 + 4i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = 3 \dots\dots(1) , 2xy = 4 \dots\dots(2) , y = \frac{4}{2x} = \frac{2}{x} \dots\dots(3) \text{ in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{2}{x}\right)^2 = 3 \Rightarrow [x^2 - \frac{4}{x^2} = 3] \cdot x^2 \Rightarrow x^4 - 4 = 3x^2 \Rightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow$$

يهمل (مجموع مربعين ليس له حل في الاعداد الحقيقية) $x^2 + 1 = 0$ either $x^2 + 1 = 0$

$$\text{OR } x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \Rightarrow y = \left(\frac{2}{\pm 2}\right) \Rightarrow y = \pm 1$$

$$\sqrt{3 + 4i} = \{ \pm(2 + i) \}$$

جد الجذران التربيعيان للعدد المركب $\frac{14+2i}{1+i}$

2009 دور 2

$$\text{sol: } \frac{14+2i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{14-14i+2i-2i^2}{2} = \frac{16-12i}{2} = 8 - 6i$$

بتربيع الطرفين $\sqrt{8 - 6i} = x + yi$

$$8 - 6i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = 8 \dots\dots(1) , 2xy = -6 \dots\dots(2) , y = \frac{-6}{2x} = \frac{-3}{x} \dots\dots(3) \text{ in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{-3}{x}\right)^2 = 8 \Rightarrow [x^2 - \frac{9}{x^2} = 8] \cdot x^2 \Rightarrow x^4 - 9 = 8x^2 \Rightarrow x^4 - 8x^2 - 9 = 0 \Rightarrow$$

$$(x^2 - 9)(x^2 + 1) = 0$$

يهمل (مجموع مربعين ليس له حل في الاعداد الحقيقية) $x^2 + 1 = 0$

$$\text{OR } x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \Rightarrow y = \left(\frac{-3}{\pm 3}\right) \Rightarrow y = \mp 1$$

$$\text{ans: } \sqrt{8 - 6i} = \{ \pm(3 - i) \}$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

10

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد الجذور التربيعية للعدد المركب $(-1 + 7i)(1 + i)$

2010 دور 2

$$\text{sol : } (-1 + 7i)(1 + i) = -1 - i + 7i + 7i^2 = -8 + 6i$$

$$\sqrt{-8 + 6i} = x + yi \quad \text{بتربيع الطرفين}$$

$$-8 + 6i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = -8 \dots\dots(1) \quad , \quad 2xy = 6 \dots\dots\dots(2) \quad , \quad y = \frac{6}{2x} = \frac{3}{x} \dots\dots\dots(3) \quad \text{in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{3}{x}\right)^2 = -8 \Rightarrow \left[x^2 - \frac{9}{x^2} = -8\right] \cdot x^2 \Rightarrow x^4 - 9 = -8x^2 \Rightarrow x^4 + 8x^2 - 9 = 0 \Rightarrow (x^2 + 9)(x^2 - 1) = 0$$

$$x^2 + 9 = 0 \quad \text{يهمل (مجموع مربعين ليس له حل في الاعداد الحقيقية)}$$

$$\text{OR } x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow y = \left(\frac{3}{\pm 1}\right) \Rightarrow y = \pm 3$$

$$\text{ans : } \sqrt{-8 + 6i} = \{ \pm(1 + 3i) \}$$

جد الجذور التربيعية للعدد المركب $\frac{7+\omega i+\omega^2 i}{1-\omega i-\omega^2 i}$

1998 دور 1

$$\text{sol : } \frac{7+\omega i+\omega^2 i}{1-\omega i-\omega^2 i} = \frac{7+i(\omega+\omega^2)}{1-i(\omega+\omega^2)} = \frac{7-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{7-7i-i+i^2}{2} = \frac{6-8i}{2} = 3 - 4i$$

$$\sqrt{3 - 4i} = x + yi \quad \text{بتربيع الطرفين}$$

$$3 - 4i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = 3 \dots\dots\dots(1) \quad , \quad 2xy = -4 \dots\dots\dots(2) \quad , \quad y = \frac{-4}{2x} = -\frac{2}{x} \dots\dots\dots(3) \quad \text{in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{-2}{x}\right)^2 = 3 \Rightarrow \left[x^2 - \frac{4}{x^2} = 3\right] \cdot x^2 \Rightarrow x^4 - 4 = 3x^2 \Rightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow$$

$$(x^2 - 4)(x^2 + 1) = 0 \quad \text{either } x^2 + 1 = 0 \quad \text{يهمل (مجموع مربعين ليس له حل في الاعداد الحقيقية)}$$

$$\text{OR } x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \Rightarrow y = \left(\frac{-2}{\pm 2}\right) \Rightarrow y = \mp 1$$

$$\sqrt{3 - 4i} = \{ \pm(2 - i) \}$$

2005 دور 2

جد الجذور التربيعية للعدد المركب $\frac{1+\omega i+\omega^2 i}{1-\omega i-\omega^2 i}$

$$\text{sol : } \frac{1+\omega i+\omega^2 i}{1-\omega i-\omega^2 i} = \frac{1+i(\omega+\omega^2)}{1-i(\omega+\omega^2)} = \frac{1-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i-i+i^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

بتربيع الطرفين $\sqrt{-i} = x + yi$

$$-i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = 0 \dots\dots(1) , 2xy = -1 \dots\dots(2) , y = \frac{-1}{2x} \dots\dots(3) \text{ in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{-1}{2x}\right)^2 = 0 \Rightarrow [x^2 - \frac{1}{4x^2} = 0] \cdot 4x^2 \Rightarrow 4x^4 - 1 = 0 \Rightarrow (2x^2 - 1)(2x^2 + 1) = 0$$

$$2x^2 - 1 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow y = \frac{-1}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} , x = \frac{-1}{\sqrt{2}} \Rightarrow y = \frac{-1}{2 \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{ans : } \left\{ \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \right\}$$

جد الجذور التكعيبية للعدد 27 ((تلميح في وقتها لم تكن مبرهنة ديموافر موجودة في المنهج)

2001 دور 2

$$\text{sol : let } z = \sqrt[3]{27} \Rightarrow z^3 = 27 \Rightarrow z^3 - 27 = 0$$

$$(z - 3)(z^2 + 3z + 9) = 0$$

$$z = 3 \text{ OR } z^2 + 3z + 9 = 0 \quad a=1, b=3, c=9$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(3) \pm \sqrt{(3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 36}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{-29}}{2}$$

$$= \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{2} = \frac{-3}{2} \pm \frac{3\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow \text{ans : } \left\{ 3, \frac{-3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i, \frac{-3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i \right\}$$

تلميح || اذا لم تحدد طريقة الحل فيمكن للطالب اختيار هذه الطريقة او طريقة ديموافر

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

12

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2015 دور 1

جد الجذور التكعيبية للعدد i 125 باستخدام مبرهنة دي موافر

sol : $z = 125i = 125 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$

$$z^{\frac{1}{3}} = [125(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})]^{\frac{1}{3}}$$

$$\therefore r = 125, \quad \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow z^{\frac{1}{3}} = (125)^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right); k = 0, 1, 2$$

$$\text{if } k=0 \Rightarrow z^{\frac{1}{3}} = 5 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 5 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5}{2}i$$

$$\text{if } k=1 \Rightarrow z^{\frac{1}{3}} = 5 \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi}{3} \right) = 5 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$= 5 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = -\frac{5\sqrt{3}}{2} + \frac{5}{2}i$$

$$\text{if } k=2 \Rightarrow z^{\frac{1}{3}} = 5 \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 4\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 4\pi}{3} \right) = 5 \left(\cos \frac{9\pi}{6} + i \sin \frac{9\pi}{6} \right) =$$

$$= 5 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = 5 (0 - i) = -5i$$

برهن ان $3(\omega^{14} + \omega^7 - 1) = 2(\omega^{10} + \omega^5 - 2)$

sol : $3(\omega^{14} + \omega^7 - 1) = 3(\omega^2 + \omega - 1) = 3(-1 - 1) = -6$

$$2(\omega^{10} + \omega^5 - 2) = 2(\omega + \omega^2 - 2) = 2(-1 - 2) = -6$$

اذا كان $x = 2 + \sqrt{3}i$, $y = 2 - \sqrt{3}i$ جد قيمة $x^2 \omega + y^2 \omega^2$

sol : $x^2 = (2 + \sqrt{3}i)^2 = 4 + 4\sqrt{3}i + 3i^2 = 1 + 4\sqrt{3}i$

$$y^2 = (2 - \sqrt{3}i)^2 = 4 - 4\sqrt{3}i + 3i^2 = 1 - 4\sqrt{3}i$$

$$x^2 \omega + y^2 \omega^2 = (1 + 4\sqrt{3}i)\omega + (1 - 4\sqrt{3}i)\omega^2$$

$$= (\omega + 4\omega\sqrt{3}i) + (\omega^2 - 4\omega^2\sqrt{3}i)$$

$$= (\omega + \omega^2) + 4\sqrt{3}i(\omega - \omega^2)$$

$$= -1 + 4\sqrt{3}i(\omega - \omega^2)$$

$$= -1 + 4\sqrt{3}i(\pm\sqrt{3}i)$$

$$= -1 \pm 12i^2 = -1 \mp 12 = \{-13, 11\}$$

$$\text{let } z = \omega - \omega^2 \Rightarrow z^2 = (\omega - \omega^2)^2$$

$$z^2 = \omega^2 - 2\omega^3 + \omega^4$$

$$= \omega^2 - 2 + \omega = -3$$

$$z = \pm\sqrt{3}i$$

$$\therefore \omega - \omega^2 = \pm\sqrt{3}i$$

1997 دور 1

1999 دور 2

جد قيمة $(\frac{1}{1+\omega^2} - \frac{1}{1+\omega})^2$

2000 دور 1

sol: $(\frac{1}{1+\omega^2} - \frac{1}{1+\omega})^2 = (\frac{1}{-\omega} - \frac{1}{-\omega^2})^2 = (\frac{\omega^3}{-\omega} - \frac{\omega^3}{-\omega^2})^2 = (-\omega^2 + \omega)^2$
 $= \omega^4 - 2\omega^3 + \omega^2 = \omega - 2 + \omega^2 = -1 - 2 = -3$

جد قيمة $(\frac{1}{2+\omega^2} - \frac{1}{2+\omega})^2$

2011 دور 1

sol: $(\frac{1}{2+\omega} - \frac{1}{2+\omega^2})^2 = (\frac{(2+\omega^2)-(2+\omega)}{(2+\omega^2)(2+\omega)})^2 = (\frac{2+\omega^2-2-\omega}{4+2\omega+2\omega^2+\omega^3})^2 = (\frac{\omega^2-\omega}{4+2(\omega+\omega^2)+1})^2$
 $= (\frac{\omega^2-\omega}{5-2})^2 = \frac{(\omega^2-\omega)^2}{(3)^2} = \frac{\omega^4 - 2\omega^3 + \omega^2}{9} = \frac{\omega - 2 + \omega^2}{9} = \frac{-1-2}{9} = \frac{-3}{9} = \frac{-1}{3}$

جد قيمة $(2 + 3\omega^2 + \omega)^2$

2000 دور 2

sol: $(2 + 3\omega^2 + \omega) = [1 + 1 + \omega^2 + 2\omega^2 + \omega]^2 = (1 + 2\omega^2)^2$
 $= 1 + 4\omega^2 + 4\omega^4 = 1 + 4(\omega^2 + \omega) = 1 - 4 = -3$

جد قيمة المقدار $(3 - 2\omega)^2 + (3 - 2\omega^2)^2$

2001 دور 1

sol: $(3 - 2\omega)^2 + (3 - 2\omega^2)^2 = 9 - 12\omega + 4\omega^2 + 9 - 12\omega^2 + 4\omega^4$
 $= 9 - 12\omega + 4\omega^2 + 9 - 12\omega^2 + 4\omega = 18 - 8\omega - 8\omega^2$
 $= 18 - 8(\omega + \omega^2) = 18 + 8 = 26$

جد قيمة $(-1 + 3\omega - \omega^2)(2 + 3\omega^2 + 2\omega)$

2002 دور 2

sol: $(-1 + 3\omega - \omega^2)(2 + 3\omega^2 + 2\omega) = (\omega + 3\omega)[2(1+\omega) + 3\omega^2]$
 $= (4\omega)(-2\omega^2 + 3\omega^2) = (4\omega)(\omega^2) = 4\omega^3 = 4$

جد قيمة المقدار $\frac{1}{3+4\omega+5\omega^2} + \frac{1}{3+5\omega+4\omega^2}$

2003 دور 2

sol: $\frac{1}{3+4\omega+5\omega^2} + \frac{1}{3+5\omega+4\omega^2} = \frac{1}{3+3\omega+\omega+2\omega^2+3\omega^2} + \frac{1}{3+2\omega+3\omega+\omega^2+3\omega^2}$
 $= \frac{1}{\omega+2\omega^2} + \frac{1}{2\omega+\omega^2} = \frac{(2\omega+\omega^2)+(\omega+2\omega^2)}{(\omega+2\omega^2)(2\omega+\omega^2)} = \frac{(3\omega+3\omega^2)}{(2\omega^2+\omega^3+4\omega^3+2\omega^4)}$
 $= \frac{3(\omega+\omega^2)}{[2(\omega^2+\omega)+5]} = \frac{-3}{5-2} = -1$

جد قيمة المقدار $(2 + \omega^2) + (2 + \omega)$

2004 دور 2

$$\text{sol : } (2 + \omega^2) + (2 + \omega) = 4 + \omega + \omega^2 = 4 - 1 = 3$$

برهن ان $(1 + \omega^2)^3 + (1 + \omega)^3 = -2$

2005 تمهيدي

$$\text{sol : } (1 + \omega^2)^3 + (1 + \omega)^3 = (-\omega)^3 + (-\omega^2)^3 = -\omega^3 - \omega^6 = -1 - 1 = -2$$

جد قيمة المقدار $(1 - \frac{1}{\omega} + \omega)(1 - \frac{1}{\omega^2} + \omega^2)$

2007 دور 1

$$\begin{aligned} \text{sol : } (1 - \frac{1}{\omega} + \omega)(1 - \frac{1}{\omega^2} + \omega^2) &= (1 - \frac{\omega^3}{\omega} + \omega)(1 - \frac{\omega^3}{\omega^2} + \omega^2) \\ &= (-\omega^2 - \omega^2)(-\omega - \omega)(-2\omega^2)(-2\omega) = 4\omega^3 = 4 \end{aligned}$$

جد قيمة $(4 + 5\omega + 4\omega^2)^6$

2008 تمهيدي

$$\text{sol : } (4 + 5\omega + 4\omega^2)^6 = [4(1 + \omega^2) + 5\omega]^6 = (-4\omega + 5\omega)^6 = \omega^6 = 1$$

جد قيمة المقدار $(4 + \frac{3}{\omega} + \omega^2)(3 + \frac{2}{\omega^2} + \omega)$

2009 تمهيدي

$$\begin{aligned} \text{sol : } (4 + \frac{3}{\omega} + \omega^2)(3 + \frac{2}{\omega^2} + \omega) &= (4 + \frac{3\omega^3}{\omega} + \omega^2)(3 + \frac{2\omega^3}{\omega^2} + \omega) \\ &= (4 + 3\omega^2 + \omega^2)(3 + 2\omega + \omega) = (4 + 4\omega^2)(3 + 3\omega) \\ &= [4(1 + \omega^2)][3(1 + \omega)] = (-4\omega)(-3\omega^2) = 12\omega^3 = 12 \end{aligned}$$

اثبت ان $(\frac{1}{1+i} - \frac{1}{1-i})^{100} = \frac{-1}{8} (1 - \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega})^3$

2014 تمهيدي

$$\text{LHS : } (\frac{1}{1+i} - \frac{1}{1-i})^{100} = (\frac{(1-i) - (1+i)}{(1+i)(1-i)})^{100} = (\frac{1-i-1-i}{1+1})^{100} = (\frac{-2i}{2})^{100} = i^{100} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{RHS : } \frac{-1}{8} (1 - \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega})^3 &= \frac{-1}{8} (1 - \frac{\omega^3}{\omega^2} + \frac{\omega^3}{\omega})^3 = \frac{-1}{8} (1 - \omega + \omega^2)^3 \\ &= \frac{-1}{8} (-\omega - \omega)^3 = \frac{-1}{8} (-2\omega)^3 = \frac{-1}{8} (-8\omega^3) = 1 \end{aligned}$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

15

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

$$\omega(1+i)^4 - (5+3\omega+5\omega^2)^2$$

بد بابت صورة

2009 دور 1

sol: $\omega(1+i)^4 - (5+3\omega+5\omega^2)^2$

$$= \omega [(1+i)^2]^2 - [3\omega+5(1+\omega^2)]^2$$

$$= \omega (1+2i+i^2)^2 - (3\omega-5\omega)^2 = \omega(2i)^2 - (-2\omega)^2 = -4\omega - 4\omega^2$$

$$= -4(\omega + \omega^2) = 4$$

2014 خارج القطر

$$(2 + \frac{3}{\omega} + 2\omega)^2 (5 + \frac{2}{\omega^2} + 5\omega^2)^2$$

جد قيمة المقدار

2009 دور 2

sol : $(2 + \frac{3}{\omega} + 2\omega)^2 (5 + \frac{2}{\omega^2} + 5\omega^2)^2 = (2 + \frac{3\omega^3}{\omega} + 2\omega)^2 (5 + \frac{2\omega^3}{\omega^2} + 5\omega^2)^2$

$$= [2(1+\omega) + 3\omega^2]^2 [5(1+\omega^2) + 2\omega]^2 = (-2\omega^2 + 3\omega^2)^2 (-5\omega + 2\omega)^2$$

$$= (\omega^2)^2 (-3\omega)^2 = (\omega^4)(9\omega^2) = 9\omega^6 = 9$$

$$(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{\omega} + 3\sqrt{2}\omega)^2 (1 + \frac{1}{\omega} + 4\omega)$$

جد قيمة المقدار

2010 دور 1

sol: $(\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{\omega} + 3\sqrt{2}\omega)^2 (1 + \frac{1}{\omega} + 4\omega)$

$$= (\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}\omega^3}{\omega} + 3\sqrt{2}\omega)^2 (1 + \frac{\omega^3}{\omega} + 4\omega)$$

$$= (\sqrt{2} + \sqrt{2}\omega^2 + 3\sqrt{2}\omega)^2 (1 + \omega^2 + 4\omega)$$

$$= [\sqrt{2}(1 + \omega^2) + 3\sqrt{2}\omega]^2 [-\omega + 4\omega]$$

$$= (-\sqrt{2}\omega + 3\sqrt{2}\omega)^2 (3\omega) = (2\sqrt{2}\omega)^2 (3\omega) = (8\omega^2)(3\omega) = 24\omega^3 = 24$$

$$(1 - \frac{2}{\omega^2} + \omega^2)(1 + \omega - \frac{5}{\omega}) = 18$$

ثبت ان

2014 دور 1

sol : $(1 - \frac{2}{\omega^2} + \omega^2)(1 + \omega - \frac{5}{\omega}) = (1 - \frac{2\omega^3}{\omega^2} + \omega^2)(1 + \omega - \frac{5\omega^3}{\omega})$

$$= (1 - 2\omega + \omega^2)(1 + \omega - 5\omega^2) = (-\omega - 2\omega)(-\omega^2 - 5\omega^2)$$

$$= (-3\omega)(-6\omega^2) = 18\omega^3 = 18$$

2014 دور 2

اثبت ان $(\frac{5\omega^2 i - 1}{5 + i\omega})^6 = -1$

$$\text{sol: } (\frac{5\omega^2 i - 1}{5 + i\omega})^6 = (\frac{5\omega^2 i - 1(-i^2 \cdot \omega^3)}{5 + i\omega})^6 = (\frac{5\omega^2 i + i^2 \cdot \omega^3}{5 + i\omega})^6 = (\frac{\omega^2 i(5 + i\omega)}{5 + i\omega})^6 \\ = (\omega^2 i)^6 = \omega^{12} \cdot i^6 = -1$$

2014 تمهيد

اثبت ان $(\frac{1}{1+i} - \frac{1}{1-i})^{100} = \frac{-1}{8} (1 - \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega})^3$

$$\text{LHS: } (\frac{1}{1+i} - \frac{1}{1-i})^{100} = (\frac{(1-i) - (1+i)}{(1+i)(1-i)})^{100} = (\frac{1-i-1-i}{1+1})^{100} = (\frac{-2i}{2})^{100} = i^{100} = 1$$

$$\text{RHS: } \frac{-1}{8} (1 - \frac{1}{\omega^2} + \frac{1}{\omega})^3 = \frac{-1}{8} (1 - \frac{\omega^3}{\omega^2} + \frac{\omega^3}{\omega})^3 = \frac{-1}{8} (1 - \omega + \omega^2)^3 \\ = \frac{-1}{8} (-\omega - \omega)^3 = \frac{-1}{8} (-2\omega)^3 = \frac{-1}{8} (-8\omega^3) = 1$$

2014 نازحين

جد ناتج $(3\omega^{9n} + \frac{5}{\omega^5} + \frac{4}{\omega^4})^6$

$$\text{Sol: } (3\omega^{9n} + \frac{5}{\omega^5} + \frac{4}{\omega^4})^6 = (3(\omega^9)^n + \frac{5\omega^3}{\omega^2} + \frac{4\omega^3}{\omega})^6 = (3 + 5\omega + 4\omega^2)^6 \\ = [3 + 5\omega + 4(-1 - \omega)]^6 = (3 + 5\omega - 4 - 4\omega)^6 \\ = [-1 + \omega]^6 = [(-1 + \omega)^2]^3 = (1 - 2\omega + \omega^2)^3 = (-\omega - 2\omega)^3 = (-3\omega)^3 = -27$$

2015 دور 3

جد ناتج $(3\omega^{12n} + \frac{5}{\omega^8} + \frac{4}{\omega^{10}})^6$ نفس الجواب السابق

2015 نازحين 1

اثبت ان $(\frac{1}{1+3\omega^2} - \frac{1}{1+3\omega^4})^2 = \frac{-27}{49}$

$$\text{sol: } (\frac{1}{1+3\omega^2} - \frac{1}{1+3\omega^4})^2 = (\frac{1}{1+3\omega^2} - \frac{1}{1+3\omega})^2 = (\frac{(1+3\omega) - (1+3\omega^2)}{(1+3\omega^2)(1+3\omega)})^2 \\ = (\frac{1+3\omega-1-3\omega^2}{1+3\omega+3\omega^2+9\omega^3})^2 = (\frac{3\omega-3\omega^2}{10+3(\omega+\omega^2)})^2 = \frac{(3\omega^2-3\omega)^2}{(7)^2} \\ = \frac{9\omega^4 - 18\omega^3 + 9\omega^2}{49} = \frac{9\omega - 18 + 9\omega^2}{49} = \frac{9(\omega + \omega^2) - 18}{49} = \frac{-27}{49}$$

$$\text{اثبت ان } \left(5 - \frac{5}{\omega^2+1} + \frac{3}{\omega^2}\right)^6 = 64$$

2016 دور 1

$$\begin{aligned} \text{sol : } \left(5 - \frac{5}{\omega^2+1} + \frac{3}{\omega^2}\right)^6 &= \left(5 - \frac{5\omega^3}{-\omega} + \frac{3\omega^3}{\omega^2}\right)^6 = (5 + 5\omega^2 + 3\omega)^6 \\ &= (5 + 5\omega^2 + 5\omega - 2\omega)^6 = [5(1 + \omega^2 + \omega) - 2\omega]^6 \\ &= [-2\omega]^6 = 64(\omega)^6 = 64 \end{aligned}$$

طريقة اخرى للحل

$$\begin{aligned} \left(5 - \frac{5}{\omega^2+1} + \frac{3}{\omega^2}\right)^6 &= \left(5 - \frac{5\omega^3}{-\omega} + \frac{3\omega^3}{\omega^2}\right)^6 = (5 + 5\omega^2 + 3\omega)^6 \\ &= [5(1 + \omega^2) + 3\omega]^6 = [5(-\omega) + 3\omega]^6 \\ &= [-2\omega]^6 = 64(\omega)^6 = 64 \end{aligned}$$

السؤال منهجي رغم عدم وجوده نصا في الكتاب ويمكن حله بطرق اخرى منها توحيد المقامات

$$\text{اثبت ان : } (2\omega + \frac{3}{\omega} + 2)^2 \cdot (5 + \frac{2}{\omega^2} + 5\omega^2)^2 = 9$$

2016 دور 2 خارج

$$\begin{aligned} \text{sol : } (2\omega + \frac{3}{\omega} + 2)^2 \cdot (5 + \frac{2}{\omega^2} + 5\omega^2)^2 &= [2(\omega + 1) + \frac{3\omega^3}{\omega}]^2 \cdot [5(1 + \omega^2) + \frac{2\omega^3}{\omega^2}]^2 \\ &= [-2\omega^2 + 3\omega^2]^2 \cdot [-5\omega + 2\omega]^2 = [\omega^2]^2 [-3\omega]^2 = \omega^4 \cdot 9\omega^2 = 9\omega^6 = 9 \end{aligned}$$

التقييم | السؤال منهجي ويعد من الاسئلة السهلة وفكرته مباشرة .

$$\text{جد المعادلة التربيعية التي جذراها } (2\omega + 2\omega^2 - 1)^2, (2 - 2\omega - 2\omega^2)^2$$

1997 دور 2

$$\begin{aligned} \text{sol: } h &= (2 - 2\omega - 2\omega^2)^2 = [2 - 2(\omega + \omega^2)]^2 = (2-2)^2 = 16 \\ k &= (2\omega + 2\omega^2 - 1)^2 = [2(\omega + \omega^2) - 1]^2 = (-2 - 1)^2 = 9 \\ h + k &= 25, \quad hk = 144 \Rightarrow x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - 25x + 144 = 0 \end{aligned}$$

برنامج رحلتي في السادس

اكتب المعادلة التربيعية التي جذراها $(2i\omega^2 - \omega)$, $(2i\omega - \omega^2)$

1998 دور 2

sol : $h = 2i\omega^2 - \omega$, $k = 2i\omega - \omega^2$

$$h + k = (2i\omega^2 - \omega) + (2i\omega - \omega^2) = 2i(\omega^2 + \omega) + (-\omega - \omega^2) = 1$$

$$h \cdot k = (2i\omega^2 - \omega)(2i\omega - \omega^2) = 4i^2\omega^3 - 2i\omega^4 - 2i\omega^2 + \omega^3$$
$$= -4 - 2i(\omega + \omega^2) + 1 = -3 + 2i$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (1 - 2i)x + (-3 + 2i) = 0$$

2015 تاريخ 1

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(2\omega^2 i - \frac{2\omega}{i})$, $(2\omega i - \frac{2\omega^2}{i})$

1999 دور 1

sol : $h = (2\omega^2 i - \frac{2\omega}{i}) = (2\omega^2 i - \frac{2\omega}{i} \cdot \frac{-i}{-i}) = (2\omega^2 i + 2\omega i) = 2i(\omega^2 + \omega) = -2i$

$$k = (2\omega i - \frac{2\omega^2}{i}) = (2\omega i - \frac{2\omega^2}{i} \cdot \frac{-i}{-i}) = (2\omega i + 2\omega^2 i) = 2i(\omega + \omega^2) = -2i$$

$$(h + k) = (-2i) + (-2i) = -4i$$

$$h \cdot k = (-2i) \cdot (-2i) = 4i^2 = -4$$

$$x^2 - (-4i)x + (-4) = 0 \Rightarrow x^2 + 4ix - 4 = 0 \text{ المعادلة هي}$$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(3\omega^2 - 2i)$, $(3\omega - 2i)$

2001 دور 2

sol : $h = (3\omega^2 - 2i)$, $k = (3\omega - 2i)$

$$h + k = (3\omega^2 - 2i) + (3\omega - 2i) = 3(\omega^2 + \omega) + -4i = -3 - 4i$$

$$h \cdot k = (3\omega^2 - 2i)(3\omega - 2i) = 9\omega^3 - 6\omega^2 i - 6\omega i + 4i^2$$
$$= 5 - 6i(\omega + \omega^2) = 5 + 6i$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (-3 - 4i)x + (5 + 6i) = 0$$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(2 - 3i\omega)$, $(2 - 3i\omega^2)$

2001 دور 1

sol : $h = (2 - 3i\omega)$, $k = (2 - 3i\omega^2)$

$$h + k = (2 - 3i\omega) + (2 - 3i\omega^2) = 4 - 3i(\omega^2 + \omega) = 4 + 3i$$

$$h \cdot k = (2 - 3i\omega)(2 - 3i\omega^2) = 4 - 6\omega^2 i - 6\omega i + 9i^2\omega^3$$
$$= -5 - 6i(\omega + \omega^2) = -5 + 6i$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (4+3i)x + (-5 + 6i) = 0$$

2007 تمهيدي

برنامج رحلتي في السادس

2004 دور 1

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(5 - \frac{i}{\omega})$, $(5 - \frac{i}{\omega^2})$

$$\text{sol : } h = \left(5 - \frac{i}{\omega}\right) = \left(5 - \frac{i\omega^3}{\omega}\right) = 5 - i\omega^2$$

$$k = \left(5 - \frac{i}{\omega^2}\right) = \left(5 - \frac{i\omega^3}{\omega^2}\right) = 5 - i\omega$$

$$h + k = (5 - i\omega^2) + (5 - i\omega) = 10 - i(\omega^2 + \omega) = 10 + i$$

$$h \cdot k = (5 - i\omega^2)(5 - i\omega) = 25 - 5\omega^2 i - 5\omega i + i^2\omega^3$$

$$= 24 - 5i(\omega + \omega^2) = 24 + 5i$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (10 + i)x + (24 + 5i) = 0$$

2005 دور 1

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(i - \frac{3}{\omega})$, $(i - \frac{3}{\omega^2})$

$$\text{sol : } h = \left(i - \frac{3}{\omega}\right) = \left(i - \frac{3\omega^3}{\omega}\right) = -3\omega^2 + i$$

$$k = \left(i - \frac{3}{\omega^2}\right) = \left(i - \frac{3\omega^3}{\omega^2}\right) = -3\omega + i$$

$$h + k = (-3\omega^2 + i) + (-3\omega + i) = -3(\omega^2 + \omega) + 2i = 3 + 2i$$

$$h \cdot k = (-3\omega^2 + i)(-3\omega + i) = 9\omega^3 - 3\omega^2 i - 3\omega i + i^2$$

$$= 8 - 3i(\omega + \omega^2) = 8 + 3i$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (3 + 2i)x + (8 + 3i) = 0$$

2006 دور 1

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(3 - 2i\omega)$, $(3 - 2i\omega^2)$

$$\text{sol : } h = (3 - 2i\omega) , k = (3 - 2i\omega^2)$$

$$h + k = (3 - 2i\omega) + (3 - 2i\omega^2) = 6 - 2i(\omega^2 + \omega) = 6 + 2i$$

$$h \cdot k = (3 - 2i\omega)(3 - 2i\omega^2) = 9 - 6\omega^2 i - 6\omega i + 4i^2\omega^3$$

$$= 5 - 6i(\omega + \omega^2) = 5 + 6i$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (6 + 2i)x + (5 + 6i) = 0$$

2006 تمهيدي

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(3 + 2i\omega)$, $(3 + 2i\omega^2)$

$$\text{sol : } h = (3 + 2i\omega) , k = (3 + 2i\omega^2)$$

$$h + k = (3 + 2i\omega) + (3 + 2i\omega^2) = 6 + 2i(\omega^2 + \omega) = 6 - 2i$$

$$h \cdot k = (3 + 2i\omega)(3 + 2i\omega^2) = 9 + 6\omega^2 i + 6\omega i + 4i^2\omega^3$$

$$= 5 + 6i(\omega + \omega^2) = 5 - 6i$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (6 - 2i)x + (5 - 6i) = 0$$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $1 + \omega$, $1 + \omega^2$

2007 دور 2

sol : $h = 1 + \omega = -\omega^2$

$k = 1 + \omega^2 = -\omega$

$(h + k) = (-\omega) + (-\omega^2) = 1$

$h \cdot k = (-\omega)(-\omega^2) = \omega^3 = 1 \Rightarrow x^2 - x + 1 = 0$

المعادلة هي

2014 دور 4 انبار

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $\frac{3i}{\omega^2}$, $\frac{-3\omega^2}{i}$

2011 دور 2

2014 دور 3

2015 تاريخي ح 1

2015 ح 4 راحة

sol : $h = \frac{3i}{\omega^2} = \frac{3\omega^3 i}{\omega^2} = 3\omega i$, $k = \frac{-3\omega^2}{i} = \frac{-3\omega^2}{i} \cdot \frac{-i}{-i} = 3\omega^2 i$

$(h + k) = (3\omega i) + (3\omega^2 i) = 3i(\omega + \omega^2) = -3i$

$h \cdot k = (3\omega i)(3\omega^2 i) = 9\omega^3 i^2 = -9$

$x^2 + 3i x - 9 = 0$ المعادلة هي

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $3\omega^2 + \frac{i}{\omega}$, $3\omega + \frac{i}{\omega^2}$

2008 دور 1

sol : $h = \left(3\omega^2 + \frac{i}{\omega}\right) = \left(3\omega^2 + \frac{i\omega^3}{\omega}\right) = 3\omega^2 + i\omega^2$

$k = \left(3\omega + \frac{i}{\omega^2}\right) = \left(3\omega^2 + \frac{i\omega^3}{\omega^2}\right) = 3\omega + i\omega$

$h + k = (3\omega^2 + i\omega^2) + (3\omega + i\omega) = 3(\omega^2 + \omega) + i(\omega^2 + \omega) = -3 - i$

$h \cdot k = (3\omega^2 + i\omega^2)(3\omega + i\omega) = 9\omega^3 + 3\omega^3 i + 3\omega^3 i + i^2 \omega^3$
 $= 9 + 6i - 1 = 8 + 6i$

$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - (-3 - i)x + (8 + 6i) = 0$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $\frac{\omega}{1+3\omega}$, $\frac{\omega^2}{1+3\omega^2}$

2008 خارج القطر

sol : $h + k = \frac{\omega}{1+3\omega} + \frac{\omega^2}{1+3\omega^2} = \frac{\omega(1+3\omega^2) + \omega^2(1+3\omega)}{(1+3\omega)(1+3\omega^2)} = \frac{\omega + 3\omega^3 + \omega^2 + 3\omega^3}{1+3\omega^2 + 3\omega + 9\omega^3}$
 $= \frac{\omega + \omega^2 + 6}{10 + 3(\omega^2 + \omega)} = \frac{-1+6}{10-3} = \frac{5}{7}$

$h \cdot k = \frac{\omega}{1+3\omega} \cdot \frac{\omega^2}{1+3\omega^2} = \frac{\omega^3}{(1+3\omega)(1+3\omega^2)} = \frac{1}{1+3\omega^2 + 3\omega + 9\omega^3} = \frac{1}{7}$

$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - \left(\frac{5}{7}\right)x + \left(\frac{1}{7}\right) = 0$

2010 دور 2

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $\frac{\omega}{1+2\omega}$ ، $\frac{\omega^2}{1+2\omega^2}$

$$\text{sol : } h + k = \frac{\omega}{1+2\omega} + \frac{\omega^2}{1+2\omega^2} = \frac{\omega(1+2\omega^2) + \omega^2(1+2\omega)}{(1+2\omega)(1+2\omega^2)} = \frac{\omega + 2\omega^3 + \omega^2 + 2\omega^3}{1+2\omega^2 + 2\omega + 4\omega^3}$$

$$= \frac{\omega + \omega^2 + 4}{5 + 2(\omega^2 + \omega)} = \frac{-1+4}{5-2} = \frac{3}{3} = 1$$

$$h \cdot k = \frac{\omega}{1+2\omega} \cdot \frac{\omega^2}{1+2\omega^2} = \frac{\omega^3}{1+2\omega^2 + 2\omega + 4\omega^3} = \frac{1}{5 + 2(\omega^2 + \omega)} = \frac{1}{3}$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \Rightarrow x^2 - x + \left(\frac{1}{3}\right) = 0$$

2011 دور 1

إذا كان $3 + i$ هو احد جذري المعادلة $x^2 - ax + (5 + 5i) = 0$ فما قيمة a وما هو الجذر الآخر .

$$(3+i)^2 - a(3+i) + (5+5i) = 0 \Rightarrow (9 + 6i + i^2) + (5 + 5i) = a \cdot (3+i)$$

$$(8 + 6i) + (5 + 5i) = a \cdot (3+i) \Rightarrow (13 + 11i) = a \cdot (3+i)$$

$$a = \frac{13+11i}{3+i} \Rightarrow a = \frac{13+11i}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i} \Rightarrow a = \frac{(39+11) + (-13+33)i}{10} = 5 + 2i$$

إذا كان $h = 3 + i$ هو احد الجذرين فنفرض ان الجذر الآخر هو K

$$x^2 - (5 + 2i)x + (5 + 5i) = 0$$

$$x^2 - (h + k)x + hk = 0 \Rightarrow h + K = 5 + 2i$$

$$(3 + i) + K = 5 + 2i \Rightarrow K = (5 + 2i) - (3 + i) \Rightarrow K = (5 + 2i) + (-3 - i) \Rightarrow K = 2 + i$$

نلاحظ ان اي جذر من جذور المعادلة يحقق تلك المعادلة ، ويمكن حل السؤال بالطريقة ادناه حيث يتم المقارنة بالصورة القياسية حيث ان احد الجذرين معلوما نقوم بفرض الجذر الآخر ثم نستخدم اسلوب المقارنة .

الحل بطريقة اخرى || اذا كان $h = 3 + i$ هو احد الجذرين فنفرض ان الجذر الآخر هو K

$$x^2 - a x + (5 + 5i) = 0$$

$$x^2 - (h + k)x + hk = 0$$

عند المقارنة بالصورة القياسية يتضح ان $h + k = a$ ، $h \cdot k = 5 + 5i$ وعليه يفضل البدء بالمعوم والانتهاء بالمجهول .

$$K(3+i) = 5+5i \Rightarrow K = \frac{5+5i}{3+i} \Rightarrow K = \frac{5+5i}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i} \Rightarrow K = \frac{(15+5) + (-5+15)i}{9+1} = 2 + i$$

$$K + (3 + i) = a \Rightarrow (2 + i) + (3 + i) = a \Rightarrow a = 5 + 2i$$

تنبيه !!! لو كان السؤال بالصورة $x^2 - (5 + 5i)x + a = 0$ بين سوف تبدأ وبين تنتهي ؟ جرب بنفسك !!

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $\frac{3}{1-\omega}$, $\frac{3}{1-\omega^2}$

2012 تمهيدي

sol : $h = \frac{3}{1-\omega^2}$, $k = \frac{3}{1-\omega}$

$$(h + k) = \left(\frac{3}{1-\omega^2}\right) + \left(\frac{3}{1-\omega}\right) = \frac{3(1-\omega) + 3(1-\omega^2)}{(1-\omega)(1-\omega^2)}$$

$$= \frac{3-3\omega + 3-3\omega^2}{1-\omega^2-\omega+\omega^3} = \frac{6-3(\omega+\omega^2)}{2-\omega^2-\omega} = \frac{6+3}{2+1} = 3$$

$$h \cdot k = \left(\frac{3}{1-\omega^2}\right) \left(\frac{3}{1-\omega}\right) = \frac{9}{1-\omega^2-\omega+\omega^3} = \frac{9}{3} = 3$$

المعادلة هي $x^2 - 3x + 3 = 0$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $(1-i\omega)$, $(1-i\omega^2)$

2012 دور 3

sol : $h = (1 - \omega^2 i)$, $k = (1 - \omega i)$

$$(h + k) = (1 - \omega^2 i) + (1 - \omega i) = (1 + 1) + (-\omega^2 - \omega) i = 2 + i$$

$$h \cdot k = (1 - \omega^2 i) (1 - \omega i) = (1 - \omega^3) + (-\omega^2 - \omega) i = i$$

المعادلة هي $x^2 - (2 + i)x + i = 0$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $\frac{\omega^2}{3-\omega}$, $\frac{\omega}{3-\omega^2}$

2014 تمهيدي

sol : $h = \frac{\omega}{3-\omega^2}$, $k = \frac{\omega^2}{3-\omega}$

$$(h + k) = \left(\frac{\omega}{3-\omega^2}\right) + \left(\frac{\omega^2}{3-\omega}\right) = \frac{\omega(3-\omega) + \omega^2(3-\omega^2)}{(3-\omega)(3-\omega^2)}$$

$$= \frac{3\omega - \omega^2 + 3\omega^2 - \omega^4}{9-3\omega^2-3\omega+\omega^3} = \frac{3\omega - \omega^2 + 3\omega^2 - \omega}{9-3\omega^2-3\omega+1} = \frac{2(\omega + \omega^2)}{10-3(\omega^2 + \omega)} = \frac{-2}{13}$$

$$h \cdot k = \left(\frac{\omega}{3-\omega^2}\right) \left(\frac{\omega^2}{3-\omega}\right) = \frac{\omega^3}{(3-\omega)(3-\omega^2)}$$

$$= \frac{1}{9-3\omega^2-3\omega+\omega^3} = \frac{1}{9-3\omega^2-3\omega+1} = \frac{1}{10-3(\omega^2 + \omega)} = \frac{1}{13}$$

المعادلة هي $x^2 + \frac{2}{13}x + \frac{1}{13} = 0$

كون المعادلة التربيعية ذات المعاملات الحقيقية واحد جذريها هو $\frac{7+i\omega+i\omega^2}{2+i\omega^4+i\omega^5}$

2016 دور 1 في

$$\text{sol: } h = \frac{7+i\omega+i\omega^2}{2+i\omega^4+i\omega^5} = \frac{7+i(\omega+\omega^2)}{2+i(\omega+\omega^2)} = \frac{7-i}{2-i} = \frac{7-i}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} = \frac{14+7i-2i-i^2}{4+1} = \frac{15+5i}{5} = 3+i$$

بما ان المعادلة التربيعية ذات معاملات حقيقية فإن الجذران مترافقان $h = 3+i, k = 3-i$

$$h+k = (3+i) + (3-i) = 6$$

$$h.k = (3+i)(3-i) = 9+1 = 10$$

$$x^2 - (h+k)x + h.k = 0 \Rightarrow x^2 - 6x + 10 = 0 \text{ المعادلة التربيعية المطلوبة}$$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $\left(\frac{5}{\omega} - i\right), \left(\frac{5}{\omega^2} + i\right)$

2015 دور 2 في

$$\text{sol: } h = \left(\frac{5}{\omega} - i\right) = \left(\frac{5\omega^3}{\omega} - i\right) = (5\omega^2 - i)$$

$$k = \left(\frac{5}{\omega^2} + i\right) = \left(\frac{5\omega^3}{\omega^2} + i\right) = (5\omega + i)$$

$$h+k = (5\omega^2 - i) + (5\omega + i) = 5(\omega + \omega^2) = -5$$

$$h.k = (5\omega^2 - i)(5\omega + i) = 25\omega^3 + 5\omega^2 i - 5\omega i - i^2$$

$$= 26 + 5i(\omega^2 - \omega) = 26 + 5i(\pm\sqrt{3}i) = 26 \pm 5\sqrt{3}i^2 = 26 \mp 5\sqrt{3}$$

$$x^2 - (h+k)x + hk = 0 \text{ المعادلة التربيعية}$$

$$x^2 + 5x + 26 + 5\sqrt{3} = 0 \text{ OR } x^2 + 5x + 26 - 5\sqrt{3} = 0 \text{ المعادلة المطلوبة}$$

كان موجود في الكتاب في الطبعة 2011 وتم حذفه من المنهج لاسباب $\omega^2 - \omega = \pm\sqrt{3}i$ لتلميح ١١ القانون مجهولة رغم وجودها في كل مناهج العالم ويجب على الطالب حفظ هذا القانون او استنتاجه من خلال التعويض وانصح طلبتنا الاعزاء بعدم استخدامه الا في هذه الحالة اما اذا كان القوس تربيع فيفضل استخدام قانون مربع الحداية .

2014 تمميدي

ضع في ابسط صورة المقدار $\frac{(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)^5}{(\cos 5\theta + i \sin 5\theta)^2}$

$$\text{sol: } \frac{(\cos 2\theta + i \sin 2\theta)^5}{(\cos 5\theta + i \sin 5\theta)^2} = \frac{[(\cos \theta + i \sin \theta)^2]^5}{[(\cos \theta + i \sin \theta)^5]^2} = \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^{10}}{(\cos \theta + i \sin \theta)^{10}} = 1$$

2013 دور 2

بسط مايتي $\frac{(\cos 5\theta + i \sin 5\theta)^2}{(\cos 3\theta + i \sin 3\theta)^3}$

$$\text{sol: } \frac{(\cos 5\theta + i \sin 5\theta)^2}{(\cos 3\theta + i \sin 3\theta)^3} = \frac{[(\cos \theta + i \sin \theta)^5]^2}{[(\cos \theta + i \sin \theta)^3]^3} = \frac{(\cos \theta + i \sin \theta)^{10}}{(\cos \theta + i \sin \theta)^9} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \text{OR } & \frac{(\cos 5\theta + i \sin 5\theta)^2}{(\cos 3\theta + i \sin 3\theta)^3} = \frac{(\cos 10\theta + i \sin 10\theta)}{(\cos 9\theta + i \sin 9\theta)} \\ & = (\cos 10\theta + i \sin 10\theta) \cdot (\cos 9\theta + i \sin 9\theta)^{-1} = (\cos 10\theta + i \sin 10\theta)(\cos 9\theta - i \sin 9\theta) \\ & = [\cos 10\theta \cdot \cos 9\theta + \sin 10\theta \cdot \sin 9\theta] + [\sin 10\theta \cdot \cos 9\theta - \cos 10\theta \cdot \sin 9\theta]i \\ & = \cos(10\theta - 9\theta) + i \sin(10\theta - 9\theta) = \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

2001 دور 1

ضع المقدار $\frac{7+\sqrt{3}i}{1+2\sqrt{3}i}$ بالصيغة العادية للعدد المركب ثم جد مقياسه وسعته الاساسية .

$$\text{sol: } z = \frac{7+\sqrt{3}i}{1+2\sqrt{3}i} \cdot \frac{1-2\sqrt{3}i}{1-2\sqrt{3}i} = \frac{7-14\sqrt{3}i+\sqrt{3}i+6}{1+12} = \frac{13-13\sqrt{3}i}{13} = 1 - \sqrt{3}i$$

$$\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3} \text{ زاوية الاسناد}$$

$$\theta = \frac{5\pi}{3} \text{ لان السعة تقع بالربع الرابع}$$

2002 دور 2

اذا كان $z = (-\sqrt{3}, 1)$ عدا مركبا اكتب الشكل الجبري له ثم جد مقياسه والقيمة الاساسية للسعة

$$\text{sol: } z = -\sqrt{3} + i$$

$$\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (1)^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{-\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{6} \text{ زاوية الاسناد}$$

$$\theta = \frac{5\pi}{6} \text{ لان السعة تقع بالربع الثاني}$$

Mob: 07902162268

25

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

2006 دور 2

إذا كان $z = (1 + \sqrt{3}i)$ عددا مركبا اكتب الشكل الديكارتي له ثم جد مقياسه والقيمة الاساسية للسعة

sol : $z = (1, \sqrt{3})$

$$\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3} \text{ زاوية الاسناد}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ لان السعة تقع بالربع الاول}$$

2008 خارج القطر

إذا كان $z = (-1 + \sqrt{3}i)$ عددا مركبا جد مقياسه والقيمة الاساسية للسعة

sol : $\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{-1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{2\pi}{3} \text{ زاوية الاسناد}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \text{ لان السعة تقع بالربع الثاني}$$

2003 دور 2

إذا كان z عددا مركبا مقياسه 3 وسعته $\frac{\pi}{3}$ جد الشكل الديكارتي (ارجاند) والشكل الجبري له .

sol : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 3 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 3 \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$

$$= \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right)$$

2006 دور 1

إذا كان z عدد مركبا مقياسه 4 وسعته $\frac{5\pi}{6}$ جد كلا من الشكل الديكارتي والجبري له .

sol : $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = 4 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 4 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right)$

$$= -2\sqrt{3} + 2i = (-2\sqrt{3}, 2)$$

2007 دور 2

جد المقياس والقيمة الاساسية للسعة للعدد المركب $\frac{2i}{1+i}$

sol : $\frac{2i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{2i-2i^2}{2} = \frac{2+2i}{2} = 1+i$

sol : $\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\pi}{4} \text{ زاوية الاسناد}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ لان السعة تقع بالربع الاول}$$

جد المقياس والقيمة الاساسية للسعة للعدد المركب $(1 + \sqrt{3} i)^2$

2008 دور 1

$$\text{sol : } z = 1 + 2\sqrt{3} i + 3 i^2 = -2 + 2\sqrt{3} i$$

$$\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\arg(z) = \theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \quad \theta \text{ تقع بالربع الثاني} \quad \frac{\pi}{3} \text{ السعة}$$

جد المقياس والقيمة الاساسية للسعة للعدد المركب $\frac{4}{1 - \sqrt{3} i}$

2008 دور 2

$$\text{sol : } \frac{4}{1 - \sqrt{3} i} \cdot \frac{1 + \sqrt{3} i}{1 + \sqrt{3} i} = \frac{4(1 + \sqrt{3} i)}{4} = 1 + \sqrt{3} i$$

$$\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3} \text{ زاوية الاسناد}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ لان السعة تقع بالربع الاول}$$

جد باستخدام مبرهنة دي موافر $(1 + i)^{11}$

2011 دور 2

$$\text{sol : } z = 1 + i \Rightarrow \text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\arg(z) = \theta = \frac{\pi}{4} \text{ السعة تساوي زاوية الاسناد لان العدد المركب يقع بالربع الاول}$$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \Rightarrow z^{11} = [\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)]^{11}$$

$$z^{11} = [(\sqrt{2})^{11} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^{11}] = 32 \sqrt{2} \left(\cos \frac{11\pi}{4} + i \sin \frac{11\pi}{4} \right)$$

$$32 \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = 32 \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$= 32 \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 32 (-1 + i) = -32 + 32i$$

باستخدام مبرهنة دي موافر احسب قيمة $(1 - i)^7$

2012 دور 1

2013 تمهيدي

$$\text{let } z = 1 - i \Rightarrow \text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \text{ الربع الرابع}$$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)$$

$$\Rightarrow z^7 = [\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right)]^7 = (\sqrt{2})^7 \left(\cos \frac{49\pi}{4} + i \sin \frac{49\pi}{4} \right)$$

$$= 8\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 8\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = 8 + 8i$$

$$\frac{49\pi}{4} = \frac{49\pi}{4} - 12\pi = \frac{\pi}{4}$$

عبر عن العدد المركب بالصيغة القطبية $2\sqrt{3} - 2i$

2012 دور 1

2013 خارج القطر

2014 نازحين

$$\text{sol : Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} \\ = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2}$$

$$\arg(z) = \theta = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \text{ زاوية الاسناد هي } \frac{\pi}{6} \text{ والسعة } \theta \text{ تقع بالربع الرابع}$$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow z = 4 \left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6} \right) \text{ الصورة القطبية}$$

عبر عن العدد المركب بالصيغة القطبية $2 - 2\sqrt{3}i$

2015

$$\text{sol : Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(2)^2 + (-2\sqrt{3})^2} \\ = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{-2\sqrt{3}}{4} = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

$$\arg(z) = \theta = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \text{ زاوية الاسناد هي } \frac{\pi}{3} \text{ والسعة } \theta \text{ تقع بالربع الرابع}$$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow z = 4 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \text{ الصورة القطبية}$$

2015 دور 3

اكتب الصيغة القطبية للعدد المركب $3 - 3\sqrt{3}i$

$$\text{sol: Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(3)^2 + (-3\sqrt{3})^2}$$

$$= \sqrt{9 + 27} = \sqrt{36} = 6$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{-3\sqrt{3}}{6} = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

تقع بالربع الرابع θ والسعة $\frac{\pi}{3}$ زاوية الاسناد هي

$$\arg(z) = \theta = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow z = 6 (\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}) \quad \text{الصورة القطبية}$$

2012 تمهيدي

احسب ما يأتي $[\cos \frac{5}{24}\pi + i \sin \frac{5}{24}\pi]^4$

$$\text{sol: } [\cos \frac{5}{24}\pi + i \sin \frac{5}{24}\pi]^4 = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}$$

$$= -\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

2016 تمهيدي

جد المقياس والقيمة الاساسية للسعة للعدد المركب $Z = \frac{4+2i\omega+2i\omega^2}{3-i\omega^2-i\omega}$

$$\text{sol: } Z = \frac{4+2i\omega+2i\omega^2}{3-i\omega^2-i\omega} = \frac{4+2i(\omega+\omega^2)}{3-i(\omega^2+\omega)} = \frac{4-2i}{3+i} \cdot \frac{3-i}{3-i} = \frac{12-4i-6i+2i^2}{9+1} = \frac{10-10i}{10} = 1-i$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\pi}{4} \text{ زاوية الاسناد}$$

$$\theta = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \text{ لان السعة تقع بالربع الرابع}$$

2013 دور 3


اذا كان $z_1 = 3 + 4i$, $z_2 = 5 + 2i$ وضح على شكل ارچاند $z_1 + z_2$

$$\text{sol: } z_1 = 3+4i \Rightarrow p(z_1) = (3,4)$$

$$z_2 = 5 + 2i \Rightarrow p(z_2) = (5,2)$$

$$z_1 + z_2 = z_3 = (3+4i) + (5+2i)$$

$$= 8 + 6i \Rightarrow p(z_1+z_2) = (8,6)$$



حل المعادلة $x^3 - 8i = 0$ في C

2005 تمهيدي

$$\text{sol : } x^3 + 8i^3 = 0 \Rightarrow (x+2i)(x^2 - 2ix + 4i^2) = 0$$

$$x = -2i \quad \text{OR} \quad x^2 - 2ix - 4 = 0$$

$$a=1, b=-2i, c=-4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-2i) \pm \sqrt{(-2i)^2 - 4.1.(-4)}}{2.1}$$

$$= \frac{2i \pm \sqrt{-4+16}}{2} = \frac{2i \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\pm 2\sqrt{3} + 2i}{2} = \pm \sqrt{3} + i$$

$$\text{ans : } \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i, -2i \}$$

حل المعادلة $x^3 + 8i = 0$ في C

2005 دور 1

$$\text{sol : } x^3 - 8i^3 = 0 \Rightarrow (x-2i)(x^2 + 2ix + 4i^2) = 0$$

$$x = 2i \quad \text{OR} \quad x^2 + 2ix - 4 = 0$$

$$a=1, b=2i, c=-4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(2i) \pm \sqrt{(2i)^2 - 4.1.(-4)}}{2.1}$$

$$= \frac{-2i \pm \sqrt{-4+16}}{2} = \frac{-2i \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-2i \pm 2\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\pm 2\sqrt{3} - 2i}{2} = \pm \sqrt{3} - i$$

$$\text{ans : } \{ \sqrt{3} - i, -\sqrt{3} - i, 2i \}$$

(8)

2011 خارج القطر

$$\text{sol : } \sqrt{8i} = x + yi \quad \text{بتربيع الطرفين}$$

$$8i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = 0 \dots\dots(1), \quad 2xy = 8 \dots\dots\dots(2), \quad y = \frac{8}{2x} = \frac{4}{x} \dots\dots\dots(3) \quad \text{in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{4}{x}\right)^2 = 0 \Rightarrow [x^2 - \frac{16}{x^2} = 0] \cdot x^2 \Rightarrow x^4 - 16 = 0 \Rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0$$

$$x^2 + 4 = 0 \quad \text{يهمل (مجموع مربعين ليس له حل في الاعداد الحقيقية)}$$

$$\text{OR} \quad x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \Rightarrow y = \left(\frac{4}{\pm 2}\right) \Rightarrow y = \pm 2$$

$$\text{ans : } \{ \pm (2 + 2i) \}$$

ملاحظة || يمكن حل هذا السؤال باستخدام مبرهنة دي موافر $(8i)^{\frac{1}{2}}$

$$\text{sol : } z = 8i = 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{8} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2} \right) ; k = 0, 1$$

$$\text{if } k = 0 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{8} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2 + 2i$$

$$\text{if } k = 1 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{8} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -2 - 2i$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

30

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2013 تمهيدي

جد الجذور التربيعية للعدد المركب $(-8i)$ sol : $\sqrt{-8i} = x + yi$ بتربيع الطرفين

$$-8i = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$x^2 - y^2 = 0 \dots\dots(1) \quad , \quad 2xy = -8 \dots\dots(2) \quad , \quad y = \frac{-8}{2x} = \frac{-4}{x} \dots\dots(3) \quad \text{in (1)}$$

$$x^2 - \left(\frac{4}{x}\right)^2 = 0 \Rightarrow [x^2 - \frac{16}{x^2} = 0] \cdot x^2 \Rightarrow x^4 - 16 = 0 \Rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0$$

يهمل (مجموع مربعين ليس له حل في الاعداد الحقيقية) $x^2 + 4 = 0$

$$\text{OR } x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \Rightarrow y = \mp 2$$

$$\text{ans : } \{ \pm (2 - 2i) \}$$

ملاحظة || يمكن حل هذا السؤال باستخدام مبرهنة دي موافر $(8i)^{\frac{1}{2}}$

$$\text{sol : } z = -8i = 8 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right)$$

$$z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{8} \left(\cos \frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{2} \right) ; k = 0, 1$$

$$\text{if } k = 0 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{8} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -2 + 2i$$

$$\text{if } k = 1 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{8} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2 - 2i$$

باستخدام مبرهنة دي موافر جد الجذور التكعيبية للعدد المركب $(8i)$

نابحين 2015 دور 1

2016 دور 1

$$\text{sol : } z = 8i = 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$z^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) ; k = 0, 1, 2$$

$$\text{if } k = 0 \Rightarrow z^{\frac{1}{3}} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{3} + i$$

$$\text{if } k = 1 \Rightarrow z^{\frac{1}{3}} = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = -\sqrt{3} + i$$

$$\text{if } k = 2 \Rightarrow z^{\frac{1}{3}} = 2 \left(\cos \frac{9\pi}{6} + i \sin \frac{9\pi}{6} \right) = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = 2(0 - i) = -2i$$

د مجموعة حل المعادلة في مجموعة الاعداد المركبة باستخدام مبرهنة دي موافر : $x^3 - 8i = 0$

2015 4

$$\text{sol : } x^3 = 8i = 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = \sqrt[3]{8} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) ; k = 0, 1, 2$$

ثم نكمل بنفس الاسلوب السابق

2011 خارج القطر

إذا كان $z = -2 + 2i$ عبر عن z بالصيغة القطبية

2013 دور 1

sol : $\text{Mod } z = ||z|| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-2)^2 + (2)^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

زاوية الاسناد هي $\frac{\pi}{4}$ والسعة θ تقع بالربع الثاني

$$\arg(z) = \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$z = r (\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \quad \text{الصورة القطبية}$$

جد ببسط صورة

خارج 2015 دور 1

a) $\left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)^{-3} = \left(\cos \frac{21\pi}{12} - i \sin \frac{21\pi}{12} \right) = \left(\cos \frac{7\pi}{4} - i \sin \frac{7\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i$

b) $(\cos \theta + i \sin \theta)^8 \cdot (\cos \theta - i \sin \theta)^4$

sol : $(\cos \theta + i \sin \theta)^8 \cdot (\cos \theta - i \sin \theta)^4 = (\cos \theta + i \sin \theta)^8 \cdot (\cos \theta + i \sin \theta)^{-4}$
 $= (\cos \theta + i \sin \theta)^4 = \cos 4\theta + i \sin 4\theta$

OR $(\cos \theta + i \sin \theta)^8 \cdot (\cos \theta - i \sin \theta)^4$

$$= (\cos \theta + i \sin \theta)^4 \cdot (\cos \theta + i \sin \theta)^4 \cdot (\cos \theta - i \sin \theta)^4$$

$$= (\cos \theta + i \sin \theta)^4 [(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta - i \sin \theta)]^4$$

$$= (\cos 4\theta + i \sin 4\theta)(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^4 = (\cos 4\theta + i \sin 4\theta)$$

برنامج رحلتي في السادس

2016 دور 1 في

اكتب العدد $Z = (1 + \sqrt{3} i)^2$ بالصيغة القطبية

sol: $C = 1 + \sqrt{3} i \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$

الطريقة الاولى //

لان السعة تقع بالربع الاول $\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$ $\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$C = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$Z = C^2 = 2^2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)^2 = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$Z = (1 + \sqrt{3} i)^2 = 1 + 2\sqrt{3} i + 3i^2 = -2 + 2\sqrt{3} i$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

الطريقة الثانية //

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2} , \sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

لان السعة تقع بالربع الثاني $\Rightarrow \theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$

$$Z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow Z = 4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

تقييم // على الرغم من ان السؤال غير موجود نصا في الكتاب المنهجي الا ان فكرته منهجية وطريقتي الحل مقبولة وزاريا بصيغتها الحالية وتكون الصيغة الاولى ملزمة للطالب اذا كان المطلوب في السؤال باستخدام مبرهنة دي موافر جد بالصيغة القطبية واذا كانت صيغة السؤال باستخدام مبرهنة دي موافر جد قيمة $(1 + \sqrt{3} i)^2$ قيمة $4 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$ من دون ذكر عبارة الصيغة القطبية فيجب تحويل الناتج النهائي الى الصيغة الجبرية كما في ادناه

$$i \sin \frac{2\pi}{3} = 4 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = -2 + 2\sqrt{3} i$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

33

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد الصيغة القطبية للجذور الخمسة للعدد المركب $(\sqrt{3} + i)^2$

sol : $z = \sqrt{3} + i \Rightarrow \text{Mod } z = |z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$

$\cos \theta = \frac{x}{|z|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = \frac{y}{|z|} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$ لان السعة تقع بالربع الاول

$$z = 2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$$

$$z^{\frac{2}{5}} = (z^2)^{\frac{1}{5}} = [2^2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})^2]^{\frac{1}{5}} = [4(\cos \frac{2\pi}{6} + i \sin \frac{2\pi}{6})]^{\frac{1}{5}}$$

$$= [4(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})]^{\frac{1}{5}}$$

$$z^{\frac{2}{5}} = 4^{\frac{1}{5}} (\cos \frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{5} + i \sin \frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{5}) ; k = 0, 1, 2, 3, 4$$

if $k=0 \Rightarrow z^{\frac{2}{5}} = 4^{\frac{1}{5}} (\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5}) = \sqrt[5]{4}(\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5})$

if $k=1 \Rightarrow z^{\frac{2}{5}} = 4^{\frac{1}{5}} (\cos \frac{\pi+2\pi}{5} + i \sin \frac{\pi+2\pi}{5}) = \sqrt[5]{4}(\cos \frac{7\pi}{5} + i \sin \frac{7\pi}{5})$

if $k=2 \Rightarrow z^{\frac{2}{5}} = 4^{\frac{1}{5}} (\cos \frac{\pi+4\pi}{5} + i \sin \frac{\pi+4\pi}{5}) = \sqrt[5]{4}(\cos \frac{13\pi}{5} + i \sin \frac{13\pi}{5})$

if $k=3 \Rightarrow z^{\frac{2}{5}} = 4^{\frac{1}{5}} (\cos \frac{\pi+6\pi}{5} + i \sin \frac{\pi+6\pi}{5}) = \sqrt[5]{4}(\cos \frac{19\pi}{5} + i \sin \frac{19\pi}{5})$

if $k=4 \Rightarrow z^{\frac{2}{5}} = 4^{\frac{1}{5}} (\cos \frac{\pi+8\pi}{5} + i \sin \frac{\pi+8\pi}{5}) = \sqrt[5]{4}(\cos \frac{25\pi}{5} + i \sin \frac{25\pi}{5})$

$$= \sqrt[5]{4}(\cos \frac{5\pi}{5} + i \sin \frac{5\pi}{5})$$

برنامج رحلتي في السادس

باستخدام مبرهنة دي موافر جد $(\sqrt{3} + i)^{-9}$

2014 دور 2

sol : let : $z = \sqrt{3} + i \Rightarrow \text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$ $\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$ لأن السعة تقع بالربع الاول

2012 خارج القطر

$$z = 2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$$

$$z^{-9} = [2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})]^{-9} = (2)^{-9}(\cos \frac{9\pi}{6} - i \sin \frac{9\pi}{6})$$

$$= \frac{1}{512}(\cos \frac{3\pi}{2} - i \sin \frac{3\pi}{2}) = \frac{1}{512}(0 + i) = \frac{1}{512}i$$

جد الصيغة القطبية للعدد المركب $5 - 5i$

2014 دور 3

sol : $\text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{25 + 25} = 5\sqrt{2}$ $\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{-5}{5\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$ الربع الرابع

$$z = 5\sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4})$$

باستخدام مبرهنة دي موافر جد الجذور التربيعية للعدد المركب $-1 + \sqrt{3}i$

2014 خارج القطر

sol : $z = -1 + \sqrt{3}i \Rightarrow \text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$ $\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{-1}{2}$, $\sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3}$ لأن السعة تقع بالربع الثاني

$$z = 2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}) \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = [2(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3})]^{\frac{1}{2}}$$

$$z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}(\cos \frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{2}) ; k = 0, 1$$

$$\text{if } k = 0 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = \sqrt{2}(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}i$$

$$\text{if } k = 1 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}) = \sqrt{2}(\frac{-1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) = \frac{-1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}i$$

كون المعادلة التربيعية التي جذراها $\left(\frac{5}{\omega} - i\right)$, $\left(\frac{5}{\omega^2} + i\right)$

2015 دور 2 خارج

$$\text{sol: } h = \left(\frac{5}{\omega} - i\right) = \left(\frac{5\omega^3}{\omega} - i\right) = (5\omega^2 - i)$$

$$k = \left(\frac{5}{\omega^2} + i\right) = \left(\frac{5\omega^3}{\omega^2} + i\right) = (5\omega + i)$$

$$h + k = (5\omega^2 - i) + (5\omega + i) = 5(\omega + \omega^2) = -5$$

$$h \cdot k = (5\omega^2 - i)(5\omega + i) = 25\omega^3 + 5\omega^2 i - 5\omega i - i^2$$

$$= 26 + 5i(\omega^2 - \omega) = 26 + 5i(\pm \sqrt{3}i) = 26 \pm 5\sqrt{3}i^2 = 26 \mp 5\sqrt{3}$$

$$x^2 - (h + k)x + hk = 0 \quad \text{المعادلة التربيعية}$$

$$x^2 + 5x + 26 + 5\sqrt{3} = 0 \quad \text{OR} \quad x^2 + 5x + 26 - 5\sqrt{3} = 0 \quad \text{المعادلة المطلوبة}$$

تلميح || القانون $\omega^2 - \omega = \pm \sqrt{3}i$ كان موجود في الكتاب في الطبعة 2011 وتم حذفه من المنهج لاسباب مجهولة رغم وجودها في كل مناهج العالم ويجب على الطالب حفظ هذا القانون او استنتاجه من خلال التعويض وانصح طلبتنا الاعزاء بعدم استخدامه الا في هذه الحالة اما اذا كان القوس تربيع فيفضل استخدام قانون مربع الحادية .

اذا كان $2-4i$ هو احد جذري المعادلة $2x^2 - x - bx + c - 6 = 0$ ،

معاملاتها حقيقية ، جد قيمتي $b, c \in \mathbb{R}$

الحل || بما ان المعاملات حقيقية فان الجذران مترافقان

2015 دور 2

$$h = 2 - 4i , k = 2 + 4i$$

$$h+k = (2 - 4i) + (2 + 4i) = 4 , h.k = (2 - 4i)(2 + 4i) = 4 + 16 = 20$$

$$x^2 - (h + k)x + hk = 0$$

$$x^2 - 4x + 20 = 0 \Rightarrow 2x^2 - 8x + 40 = 0 , 2x^2 - (1 + b)x + (c - 6) = 0$$

$$1 + b = 8 \Rightarrow b = 7 , c - 6 = 40 \Rightarrow c = 46$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

36

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

عبر عن العدد بالصيغة القطبية $\frac{1-3i^2}{1-\omega i-\omega^2 i}$

2015 دور 2

$$\text{sol: } Z = \frac{1-3i^2}{1-\omega i-\omega^2 i} = \frac{1+3}{1-i(\omega+\omega^2)} = \frac{4}{1+i} = \frac{4}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{4-4i}{2} = 2-2i$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = \frac{-1}{\sqrt{2}}$$

زاوية الاسناد هي $\frac{\pi}{4}$ والسعة θ تقع بالربع الرابع

$$\arg(z) = \theta = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) \text{ الصورة القطبية}$$

جد الجذور التكعيبية للعدد المركب $(1+i)^2$ على وفق مبرهنة ديموافر .

2015 دور 2 خارج

الطريقة الاولى

$$z = 1+i \Rightarrow \text{Mod } z = ||z|| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{||z||} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \theta = \frac{y}{||z||} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

السعة تساوي زاوية الاسناد لان العدد المركب يقع بالربع الاول $\arg(z) = \theta = \frac{\pi}{4}$

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \Rightarrow z^2 = [\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)]^2$$

$$z^2 = [(\sqrt{2})^2 (\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})^2] = 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(z^2)^{\frac{1}{3}} = \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \right]^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right); k = 0, 1, 2$$

$$k = 0 \Rightarrow (z^2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2(0)\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2(0)\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$= \sqrt[3]{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right)$$

$$k = 1 \Rightarrow (z^2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2(1)\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2(1)\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$= \sqrt[3]{2} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right)$$

$$k = 2 \Rightarrow (z^2)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2(2)\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2(2)\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{6} + i \sin \frac{9\pi}{6} \right)$$

$$= \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = \sqrt[3]{2} (0 - i)$$

الطريقة الثانية

$$z = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(z)^{\frac{1}{3}} = \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \right]^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{3}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) ; k = 0, 1, 2$$

$$k = 0 \Rightarrow (z)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2(0)\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2(0)\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$= \sqrt[3]{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right)$$

$$k = 1 \Rightarrow (z)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2(1)\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2(1)\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$= \sqrt[3]{2} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right)$$

$$k = 2 \Rightarrow (z)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2(2)\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2(2)\pi}{3} \right) = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{6} + i \sin \frac{9\pi}{6} \right)$$

$$= \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = \sqrt[3]{2} (0 - i)$$

تلميح || لو كانت صيغة السؤال ((باستخدام مبرهنة دي موافر جد $(1 + i)^2$ ثم جد الجذور الثلاثة له كانت الطريقة الاولى هي الطريقة الاكثر قبولا اما السؤال في صيغته الحالية فتكون الطريقتين مقبولة .

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

38

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

هل ان : $\frac{(cos2\theta+i sin2\theta)^5}{(cos4\theta+i sin4\theta)^2} - (cos\theta + i sin\theta)^2 = 0$ اثبت ذلك .

2016 دور 2 خارج

$$\begin{aligned} \text{sol : } \frac{(cos2\theta+i sin2\theta)^5}{(cos4\theta+i sin4\theta)^2} - (cos\theta + i sin\theta)^2 &= \frac{[(cos\theta+i sin\theta)^2]^5}{[(cos\theta+i sin\theta)^4]^2} - (cos\theta + i sin\theta)^2 \\ &= \frac{(cos\theta+i sin\theta)^{10}}{(cos\theta+i sin\theta)^8} - (cos\theta + i sin\theta)^2 = (cos\theta + i sin\theta)^2 - (cos\theta + i sin\theta)^2 = 0 \end{aligned}$$

التقييم | السؤال منهجي جدا رغم عدم وجوده بهذا النص في الكتاب المقرر الا ان فكرته سهلة نسبيا وبما ان هل الاستفهامية يتحقق الجواب فيها بـ (نعم او كلا) فان ورود كلمة اثبت ذلك في نهاية السؤال تشير الى وجوب اثبات التحقق من عدمه اما اذا وردت كلمة اثبت في بداية السؤال فانها تدل على وجوب تحققها .

باستخدام مبرهنة دي موافر جد الجذران التربيعيان للعدد المركب $\frac{1+\omega i+\omega^2 i}{1-\omega i-\omega^2 i}$

2016 دور 2

$$\text{sol : } Z = \frac{1+\omega i+\omega^2 i}{1-\omega i-\omega^2 i} = \frac{1+i(\omega+\omega^2)}{1-i(\omega+\omega^2)} = \frac{1-i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i-i+i^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

$$Z = \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} = \left(\cos \frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{3\pi}{2}+2k\pi}{2} \right) ; k = 0, 1$$

$$\begin{aligned} \text{if } k = 0 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} &= \left(\cos \frac{\frac{3\pi}{2}}{2} + i \sin \frac{\frac{3\pi}{2}}{2} \right) = \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= \left(-\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{if } k=1 \Rightarrow z^{\frac{1}{2}} &= \left(\cos \frac{\frac{3\pi}{2}+2\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{3\pi}{2}+2\pi}{2} \right) = \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right) \\ &= \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} i \end{aligned}$$

التقييم || السؤال متوسط الصعوبة وغير موجود في الكتاب المقرر وفكرته منهجية وقد ورد عام 2005 نصا وكان حينها مبرهنة دي موافر غير موجودة في المنهج المقرر وفي عام 1998 تكررت فكرة السؤال بصورة مقاربة .

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

39

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

حلول الاسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثاني (القطوع الخروطية)

قطع زائد طول محوره الحقيقي (6) وحدات واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل ويمر بالنقطتين $(1, -2\sqrt{5})$, $(1, 2\sqrt{5})$ جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل ومعادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الاصل .

الحل :- في القطع المكافئ بما انه مار بنقطتين تقعان بالربعين الاول والرابع فان بؤرتيه تقع على الاحداثي السيني الموجب وكلتا النقطتين تحقق معادلته أي ان معادلته $y^2 = 4Px$

$$\text{معادلة القطع المكافئ } y^2 = 20x \Rightarrow \text{بؤرة القطع المكافئ } (5, 0) , 20 = 4P \Rightarrow P = 5$$

$$2a = 6 \Rightarrow a = 3 , c = 5 \Rightarrow \text{بؤرتي القطع الزائد } (5, 0) , (-5, 0)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 25 = 9 + b^2 \Rightarrow b^2 = 16$$

$$\text{معادلة القطع الزائد } \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

1997 دور 1

2014 دور 1

2013 دور 2

2016 دور 1 في

قطع زائد مركزه نقطة الاصل ومعادلته $hx^2 - ky^2 = 90$ وطول محوره الحقيقي $(6\sqrt{2})$ وحدة وبؤرتاه تنطبقان على بؤرتي القطع الناقص الذي معادلته $9x^2 + 16y^2 = 576$ جد قيمتي كل من h, k الحقيقيتين .

$$\text{في القطع الناقص } \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{36} = 1 \Rightarrow [9x^2 + 16y^2 = 576] \div 576$$

$$a^2 = 64 , b^2 = 36 , a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 64 = 36 + c^2 \Rightarrow c^2 = 28 \Rightarrow c = \sqrt{28}$$

$$\text{بؤرتي القطع الناقص وهما بؤرتي القطع الزائد } (\sqrt{28}, 0), (-\sqrt{28}, 0)$$

$$\text{في القطع الزائد } 2a = 6\sqrt{2} \Rightarrow a = 3\sqrt{2} , c = \sqrt{28}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 28 = 18 + b^2 \Rightarrow b^2 = 10$$

$$\text{في القطع الزائد } \frac{x^2}{90} - \frac{y^2}{k} = 1 \Rightarrow [hx^2 - ky^2 = 90] \div 90$$

$$a^2 = \frac{90}{h} \Rightarrow 18 = \frac{90}{h} \Rightarrow h = 5 , b^2 = \frac{90}{k} \Rightarrow 10 = \frac{90}{k} \Rightarrow k = 9$$

1998 دور 1

2012 دور 2

2015 دور 2

قطع ناقص معادلته $hx^2 + ky^2 = 36$ مركزه نقطة الاصل ومجموع مربعي طوليه محوريه يساوي (60) واحدتي بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ الذي معادلته $y^2 = 4\sqrt{3}x$ ما قيمة كل من $h, k \in \mathbb{R}$

1998 دور 2

الحل :- في القطع المكافئ $y^2 = 4\sqrt{3}x$, $y^2 = 4Px \Rightarrow 4P = 4\sqrt{3} \Rightarrow P = \sqrt{3}$

$c = \sqrt{3} \Rightarrow$ بؤرتي القطع الناقص $(\sqrt{3}, 0)$, $(-\sqrt{3}, 0)$

$$(2a)^2 + (2b)^2 = 60 \Rightarrow [4a^2 + 4b^2 = 60] \div 4$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = 15 \Rightarrow a^2 = 15 - b^2 \dots (1)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots (2) \Rightarrow 15 - b^2 = b^2 + 3 \Rightarrow 2b^2 = 12 \Rightarrow b^2 = 6$$

$$a^2 = 15 - 6 \Rightarrow a^2 = 9$$

$$[hx^2 + ky^2 = 36] \div 36 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{36}{h}} + \frac{y^2}{\frac{36}{k}} = 1$$

$$\Rightarrow a^2 = \frac{36}{h} \Rightarrow 9 = \frac{36}{h} \Rightarrow h = 4, b^2 = \frac{36}{k} \Rightarrow 6 = \frac{36}{k} \Rightarrow k = 6$$

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطع الناقص $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$ واحد رأسيه بؤرة

1997 دور 2

القطع المكافئ $y^2 + 8x = 0$

الحل || في القطع الناقص $a^2 = 36$, $b^2 = 20$, $c^2 = a^2 - b^2 = 36 - 20 = 16 \Rightarrow c = 4$

$c = 4 \in x\text{-axis} \Rightarrow$ بؤرتي القطع الناقص وهما بؤرتي القطع الزائد $(\pm 4, 0)$

$$y^2 + 8x = 0 \Rightarrow y^2 = -8x, y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 8 \Rightarrow p = 2$$

في القطع الزائد $a = 2 \Rightarrow$ بؤرة القطع المكافئ وهي احد رأسي القطع الزائد $(-2, 0)$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 16 = 4 + b^2 \Rightarrow b^2 = 12$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$
 معادلة القطع الزائد

برنامج رحلتي في السادس

النقطة $P(6, L)$ تنتمي الى القطع الزائد الذي مركزه نقطة الاصل ومعادلته $x^2 - 3y^2 = 1$ جد كلا من قيمة L ثم جد طولي نصفي قطري البورتين المرسومين من تلك النقطة .

sol : أي نقطة تنتمي الى منحنى فانها تحقق معادلته

$$36 - 3L^2 = 12 \Rightarrow 3L^2 = 24 \Rightarrow L^2 = 8 \Rightarrow L = \pm \sqrt{8}$$

القطع الزائد $P_1(6, \sqrt{8})$, $P_2(6, -\sqrt{8})$

$$[x^2 - 3y^2 = 12] \div 12 \Rightarrow \frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$$

$$a^2 = 12, b^2 = 4, c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 12 + 4 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$$

$F_1(4, 0)$ هو طول النصف القطر البؤري من الجهة اليمنى \Rightarrow البؤرة اليمنى للقطع الزائد

$F_2(-4, 0)$ هو طول النصف القطر البؤري من الجهة اليسرى \Rightarrow البؤرة اليسرى للقطع الزائد

$$P_1 F_1 = \sqrt{(6 - 4)^2 + (\sqrt{8} - 0)^2} = \sqrt{4 + 8} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ وحدة طول}$$

$$P_1 F_2 = \sqrt{(6 + 4)^2 + (\sqrt{8} - 0)^2} = \sqrt{100 + 8} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \text{ وحدة طول}$$

1999 دور 1

2010 تمهيدي

النقطة $(\frac{1}{3}, 2)$ تنتمي الى القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل وبؤرته تنتمي الى محور السينات والتي هي احدى بؤرتي القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل و النسبة بين طولي محوريه $\frac{5}{4}$ جد معادلة كل من القطعين المكافئ والناقص .

1999 دور 2

sol : $\because (\frac{1}{3}, 2) \in \text{Parabola} \Rightarrow$ تحقق معادلته

$$y^2 = 4Px \Rightarrow 4 = 4P(\frac{1}{3}) \Rightarrow 12 = 4P \Rightarrow P = 3 \Rightarrow (3, 0) \text{ بؤرة القطع المكافئ}$$

$$y^2 = 12x \Rightarrow c = 3 \Rightarrow \text{بؤرتي القطع الناقص } (3, 0), (-3, 0) \Rightarrow \text{معادلة القطع المكافئ}$$

$$\frac{2a}{2b} = \frac{5}{4} \Rightarrow 4a = 5b \Rightarrow a = \frac{5b}{4} \dots\dots\dots (1)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots\dots\dots (2) \Rightarrow (\frac{5b}{4})^2 = b^2 + 9 \Rightarrow [\frac{25b^2}{16} = b^2 + 9] \cdot 16$$

$$25b^2 = 16b^2 + 144 \Rightarrow 9b^2 = 144 \Rightarrow b^2 = 16 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow a = \frac{5}{4} \cdot 4 \Rightarrow a = 5$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{ معادلة القطع الناقص}$$

((انتبه)) في السؤال السابق اذا كان النسبة بين طولي محوريه $\frac{4}{5}$ فيكون $\frac{2b}{2a} = \frac{4}{5}$.

Mob: 07902162268

42

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ الذي معادلته $y^2 + 8x = 0$ علما ان القطع الناقص يمر بالنقطة $(\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$.

2000 دور 1

2014 دور 2

الحل :- في القطع المكافئ $y^2 + 8x = 0 \Rightarrow y^2 = -8x$, $y^2 = -4Px \Rightarrow 4P = 8 \Rightarrow P = 2$

بؤرة القطع المكافئ هي $(-2, 0)$ أي ان بؤرتي القطع الناقص هي $(2, 0)$, $(-2, 0)$ أي ان $c = 2$

المعادلة القياسية للقطع الناقص هي $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\left[\frac{12}{a^2} + \frac{3}{b^2} = 1 \right] \cdot a^2 b^2 \Rightarrow 12b^2 + 3a^2 = a^2 b^2 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = b^2 + 4 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$12b^2 + 3(b^2 + 4) = (b^2 + 4)b^2 \Rightarrow 12b^2 + 3b^2 + 12 = b^4 + 4b^2$$

$$b^4 + 4b^2 - 12b^2 - 3b^2 - 12 = 0 \Rightarrow b^4 - 11b^2 - 12 = 0$$

$$(b^2 - 12)(b^2 + 1) = 0 \Rightarrow b^2 + 1 \neq 0 \quad , \quad b^2 - 12 = 0 \Rightarrow b^2 = 12$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 12 + 4 \Rightarrow a^2 = 16$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطع الزائد الذي معادلته $x^2 - 3y^2 = 12$ والنسبة بين طولي محوريه كنسبة $\frac{5}{3}$

2000 دور 2

2013 دور 3

2007 تمميدى

2008 دور 2 خارج

2014 دور 4 انهار

2015 نارحين 1

sol : في القطع الزائد $[x^2 - 3y^2 = 12] \div 12 \Rightarrow \frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

$$\Rightarrow a^2 = 12, b^2 = 4 \rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 12 + 4 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$$

القطع الناقص $c = 4 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الزائد وهما بؤرتي القطع الناقص $(4, 0)$, $(-4, 0)$

$$\frac{2a}{2b} = \frac{5}{3} \Rightarrow 3a = 5b \Rightarrow a = \frac{5b}{3} \quad \dots\dots\dots (1) \quad , \quad a^2 = b^2 + c^2 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$\left[\frac{25b^2}{9} = b^2 + 16 \right] \cdot 9 \Rightarrow 25b^2 = 9b^2 + 144 \Rightarrow 16b^2 = 144 \Rightarrow b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

$$a = \frac{5}{3} \cdot 3 \Rightarrow a = 5$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

2001 دور 1

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه تنطبقان على بؤرتي القطع الناقص $3x^2 + 5y^2 = 120$ والنسبة بين طول محوره الحقيقي والبعد بين بؤرتيه كنسبة $\frac{1}{2}$

Sol : $3x^2 + 5y^2 = 120 \Rightarrow \frac{x^2}{40} + \frac{y^2}{24} = 1$

$a^2 = 40$, $b^2 = 24 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 40 = 24 + c^2 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$

في ق. ز. $c = 4 \in x - \text{axis}$ بؤرتي القطع الناقص وهما بؤرتي القطع الزائد $(\pm 4, 0)$

$\frac{2a}{2c} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2c = 4a \Rightarrow c = 2a \Rightarrow 4 = 2a \Rightarrow a = 2$

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 16 = 4 + b^2 \Rightarrow b^2 = 12$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

2001 دور 2

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطعين المكافئين $y^2 = 20x$, $y^2 = -20x$ والفرق بين طولي محوريه الحقيقي والمرافق يساوي 2 وحدة .

sol : $y^2 = 20x$, $y^2 = 4px \Rightarrow 4p = 20 \Rightarrow p = 5$

$y^2 = -20x$, $y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 20 \Rightarrow p = 5$

في القطع الزائد $c = 5 \Rightarrow$ بؤرتي القطعين المكافئين وهما بؤرتي القطع الزائد $(\pm 5, 0)$

either $2a - 2b = 2 \Rightarrow a - b = 1 \Rightarrow a = b + 1 \dots (1)$

$c^2 = a^2 + b^2 \dots (2)$

$25 = (b + 1)^2 + b^2 \Rightarrow 25 = b^2 + 2b + 1 + b^2 \Rightarrow 2b^2 + 2b - 24 = 0$

$b^2 + b - 12 = 0 \Rightarrow (b+4)(b-3) = 0 \Rightarrow b = 3$, $a = 3 + 1 = 4$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

or $2b - 2a = 2 \Rightarrow b - a = 1 \Rightarrow b = a + 1 \dots (1)$

$c^2 = a^2 + b^2 \dots (2)$

$25 = (a + 1)^2 + a^2 \Rightarrow 25 = a^2 + 2a + 1 + a^2 \Rightarrow 2a^2 + 2a - 24 = 0$

$a^2 + a - 12 = 0 \Rightarrow (a+4)(a-3) = 0 \Rightarrow a = 3$, $b = 3 + 1 = 4$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

تأكيد || حرف (و) في اللغة العربية لايفيد الترتيب ففي القطع الزائد يمكن ان يكون المحور الحقيقي اكبر من المحور التخيلي او بالعكس لذا فان الفرق بين طولي محوريه الحقيقي والتخيلي او الفرق بين طولي محوريه التخيلي والحقيقي لها نفس المعنى وهو الاحتمالان معا الا اذا ارتبط بقرينة كان يقال ان المحور الحقيقي يزيد على المحور التخيلي بمقدار 4 او يقال ينقص عنه عندها يجب الالتزام بالترتيب .

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه على محور السينات والمسافة بين بؤرتيه تساوي 8 وحدات ومجموع طولي محوريه يساوي 16 وحدة .

2002 دور 1

sol: $2c = 8 \Rightarrow c = 4 \in x\text{-axis}$

$$2a + 2b = 16 \Rightarrow a + b = 8 \Rightarrow a = 8 - b \dots (1)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots (2)$$

$$(8 - b)^2 = b^2 + 16 \Rightarrow 64 - 16b + b^2 = b^2 + 16 \Rightarrow 16b = 48 \Rightarrow b = 3$$

$$a = 8 - 3 = 5$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما رأسا القطع الناقص $x^2 + 9y^2 = 36$ والنسبة بين لمولي محوره الحقيقي الى البعد بين بؤرتيه تساوي $\frac{1}{2}$ وينطبق محوره على المحورين الاحداثيين .

2002 دور 2

sol : $[x^2 + 9y^2 = 36] \div 36 \Rightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$

في القطع الزائد $c = 6 \in x\text{-axis}$ رأسا القطع الناقص وهما بؤرتي القطع الزائد $(\pm 6, 0)$

$$\frac{2a}{2c} = \frac{1}{2} \Rightarrow c = 2a \Rightarrow 6 = 2a \Rightarrow a = 3$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 36 = 9 + b^2 \Rightarrow b^2 = 27$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد}$$

قطع ناقص معادلته $x^2 + 4y^2 = 4$ جد طول محوريه واحداثيي رأسيه وبؤرتيه .

2003 دور 1

sol : $[x^2 + 4y^2 = 4] \div 4 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2, \quad b^2 = 1 \Rightarrow b = 1, \quad a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 4 = 1 + c^2$$

$$c^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$$

طول المحور الصغير $2b = 2$, طول المحور الكبير $2a = 4$

بؤرتي القطع الناقص $(\pm\sqrt{3}, 0)$, رأسا القطع الناقص $(\pm 2, 0)$

برنامج رحلتي في السادس

جد معادلة القطع الزائد الذي يمر ببؤرتي القطع الناقص $1 = \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24}$ والنسبة بين البعد بين
بؤرتيه وطول محوره المرافق كنسبة $\frac{5}{4}$.

2003 دور 2

2009 دور 2

sol : في القطع الناقص $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$

$$a^2 = 49, b^2 = 24 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 49 = 24 + c^2 \Rightarrow c^2 = 25 \Rightarrow c = 5$$

في القطع الزائد $a = 5 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الناقص والتي تنتمي الى القطع الزائد $(\pm 5, 0)$

$$\frac{2c}{2b} = \frac{5}{4} \Rightarrow 4c = 5b \Rightarrow c = \frac{5b}{4} \dots (1)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \dots (2) \Rightarrow \left[\frac{25b^2}{16} = 25 + b^2 \right] \cdot 16$$

$$25b^2 = 400 + 16b^2 \Rightarrow 9b^2 = 400 \Rightarrow b^2 = \frac{400}{9}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{\frac{400}{9}} = 1 \text{ معادلة القطع الزائد}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ $x^2 = 24y$
والفرق بين طولي محوريه يساوي 4 وحدات طول .

2004 دور 1

2015 دور 2 ، 3 ، 4

sol : $x^2 = 24y, x^2 = 4py \Rightarrow 4p = 24 \Rightarrow p = 6$

$\Rightarrow (0, 6) \Rightarrow$ بؤرتي القطع الناقص $(0, \pm 6) \Rightarrow c = 6 \in y\text{-axis}$

$$2a - 2b = 4 \Rightarrow a - b = 2 \Rightarrow a = 2 + b \dots (1)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots (2) \Rightarrow (2 + b)^2 = b^2 + 36 \Rightarrow 4 + 4b + b^2 = b^2 + 36$$

$$4b = 32 \Rightarrow b = 8 \Rightarrow a = 10$$

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{64} = 1 \text{ معادلة القطع الناقص}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه على محور السينات والمسافة بين
بؤرتيه تساوي 12 وحدة والفرق بين طولي محوريه يساوي 4 وحدات طول .

2006 تمهيدي

sol : $2c = 12 \Rightarrow c = 6 \in x\text{-axis}$

$$2a - 2b = 4 \Rightarrow a - b = 2 \Rightarrow a = 2 + b \dots (1)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots (2) \Rightarrow (2 + b)^2 = b^2 + 36 \Rightarrow 4 + 4b + b^2 = b^2 + 36$$

$$4b = 32 \Rightarrow b = 8 \Rightarrow a = 10$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1 \text{ معادلة القطع الناقص}$$

قطعان زائد وناقص احدهما يمر ببؤرتي الآخر جد معادلة القطع الزائد اذا علمت ان معادلة القطع الناقص هي $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ علما ان محوريهما على المحورين الاحداثيين .
 تلميح || كلمة (احدهما) الواردة في السؤال حصل عليها اعتراض لغوي
 ويمكن استبدالها بكلمة (كل منهما)
 الحل :- نلاحظ ان بؤرتي القطع الناقص هما راسي القطع الزائد وراسي القطع الناقص هما بؤرتي القطع الزائد

2004 دور 2
 2005 تمهيدي
 2006 دور 2
 2008 دور 2
 2014 دور 3

$$\text{في القطع الناقص } [9x^2 + 25y^2 = 225] \div 225 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\Rightarrow a^2 = 25 \Rightarrow a = 5, b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow c^2 = 25 - 9 = 16 \Rightarrow c = 4$$

بؤرتي القطع الناقص وهما رأسي القطع الزائد $(4, 0), (-4, 0)$
 رأسي القطع الناقص وهما بؤرتي القطع الزائد $(5, 0), (-5, 0)$
 في القطع الزائد $a = 4, c = 5$

$$\Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 25 = 16 + b^2 \Rightarrow b^2 = 9$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \text{ معادلة القطع الزائد}$$

جد معادلة القطع المخروطي الذي محوره هما المحورين الاحداثيين واحدى بؤرتيه $(-5, 0)$ واحد رأسيه $(3, 0)$

2004 دور 1

$$\text{sol: } (-5, 0) = (-c, 0) \Rightarrow c = 5, (3, 0) = (a, 0) \Rightarrow a = 3$$

$$\because c > a \Rightarrow \text{فإن القطع المخروطي هو قطع زائد } c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 25 = 9 + b^2 \Rightarrow b^2 = 16$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \text{ معادلة القطع الزائد}$$

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل ومحوره محور السينات ويمر بالنقطة $(1, 4)$ ثم جد معادلة المماس له عند تلك النقطة .

2004 دور 2

الحل | بما ان النقطة تقع في الربع الاول وبؤرة القطع المكافئ تقع على محور السينات فان معادلته

$$y^2 = 4px \Rightarrow 16 = 4p \Rightarrow p = 4 \Rightarrow y^2 = 16x \text{ معادلة القطع المكافئ}$$

$$2y y' = 16 \Rightarrow y' = \frac{8}{y} \Rightarrow m = \frac{8}{4} = 2 \text{ ميل المماس للمنحني}$$

$$(y - y_1) = m(x - x_1) \Rightarrow (y - 4) = 2(x - 1) \text{ معادلة المماس}$$

باستخدام التعريف جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل ومعادلة دليله $y = \sqrt{3}$

2005 تمهيدي


بما ان معادلة الدليل $y = \sqrt{3}$ فان بؤرتيه $F(0, -\sqrt{3})$ و $Q(x, \sqrt{3})$

$$\overline{QM} = \overline{FM}$$

$$\sqrt{(x - x)^2 + (y - \sqrt{3})^2} = \sqrt{(x)^2 + (y + \sqrt{3})^2}$$

$$y^2 - 2\sqrt{3}y + 3 = x^2 + y^2 + 2\sqrt{3}y + 3$$

$$x^2 = -4\sqrt{3}y$$



جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه على محور السينات والمسافة بين بؤرتيه تساوي 6 وحدات والفرق بين طولي محوريه وحدتا طول .

2005 دور 1

$$\text{sol : } 2c = 6 \Rightarrow c = 3 \in x - \text{axis}$$

$$2a - 2b = 2 \Rightarrow a - b = 1 \Rightarrow a = 1 + b \dots (1)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots (2) \Rightarrow (1 + b)^2 = b^2 + 9 \Rightarrow 1 + 2b + b^2 = b^2 + 9$$

$$2b = 8 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow a = 5$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطعين المكافئين $y^2 = 20x$, $y^2 = -20x$ وطول محوره المرافق 8 وحدات .

2005 دور 1

$$\text{sol : } y^2 = 20x , y^2 = 4px \Rightarrow 4p = 20 \Rightarrow p = 5$$

$$y^2 = -20x , y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 20 \Rightarrow p = 5$$

بؤرتي القطعين المكافئين وهما بؤرتي القطع الزائد $(5,0)$, $(-5,0)$

$$2b = 8 \Rightarrow b = 4$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 25 = a^2 + 16 \Rightarrow a^2 = 9$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد}$$

2008 دور 1

2015 ح4 مراجعة

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

48

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2005 دور 2

عين النقاط على القطع الزائد الذي معادلته $1 = \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{1}$ والتي تبعد عن البؤرة في الفرع الايمن بمقدار $\frac{1}{\sqrt{3}}$ وحدة .

sol : $a^2 = 3$, $b^2 = 1$, $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 3 + 1 \Rightarrow c^2 = 4 \Rightarrow c = 2$

$F_1(2, 0)$ البؤرة اليمنى للقطع الزائد , let $P(x, y) \in$ للقطع الزائد $\Rightarrow PF_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\sqrt{(x-2)^2 + (y-0)^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow [x^2 - 4x + 4 + y^2 = \frac{1}{3}] \cdot 3$

$3x^2 - 12x + 12 + 3y^2 = 1 \Rightarrow 3x^2 - 12x + 11 + 3y^2 = 0 \dots\dots\dots(1)$

$[\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{1} = 1] \cdot 3 \Rightarrow x^2 - 3y^2 = 3 \Rightarrow 3y^2 = x^2 - 3 \dots\dots\dots(2)$ نعوض 2 في 1

$3x^2 - 12x + 11 + x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 4x^2 - 12x + 8 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$

$(x-1)(x-2) = 0$

اما $x = 1 \Rightarrow 3y^2 = 1 - 3 \Rightarrow 3y^2 = -2$ يهمل

او $x = 2 \Rightarrow 3y^2 = 4 - 3 \Rightarrow 3y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore (2, \frac{1}{\sqrt{3}}), (2, -\frac{1}{\sqrt{3}}) \in$ القطع الزائد

2005 دور 2

لتكن $y^2 - 12x = 0$, $y^2 + 12x = 0$ معادلتين مكافئتين جد بؤرة كل منهما ومعادلة دليله ثم جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطعين المكافئتين وطول محوره الصغير يساوي 10 وحدات طول .

sol : $y^2 = 12x$, $y^2 = 4px \Rightarrow 4p = 12 \Rightarrow p = 3$

$y^2 = -12x$, $y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 12 \Rightarrow p = 3$

معادلة دليليهما $x = 3$, $x = -3$, بؤرتي القطعين المكافئتين وهما بؤرتي القطع الناقص $(3,0)$, $(-3,0)$

$2b = 10 \Rightarrow b = 5$

$a^2 = c^2 + b^2 \Rightarrow a^2 = 9 + 25 \Rightarrow a^2 = 34$

معادلة القطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{34} + \frac{y^2}{25} = 1$

تكن $16x^2 - 9y^2 = 144$ ، جد البؤرتين والرأسين وطول كل من المحورين الحقيقي والمرافق.

2006 تمهيدي

2014 بازعين

$$\text{sol : } [16x^2 - 9y^2 = 144] \div 144 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$

$$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3 , b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5$$

$$\text{البؤرتان } F_1(c, 0), F_2(-c, 0) = (5, 0), (-5, 0)$$

$$\text{الرأسان } V_1(a, 0), V_2(-a, 0) = (3, 0), (-3, 0)$$

$$2b = 8 \quad \text{طول المحور التخيلي} \quad 2a = 6 \quad \text{طول المحور الحقيقي}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3} \quad \text{الإختلاف المركزي}$$

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل ويمر بالنقطتين $(3, 6)$, $(-3, 6)$ ثم جد معادلة دليله .

2006 دور 1

الحل ١ بما ان النقطتان تقعان بالربعين الاول والثاني في بؤرة القطع المكافئ تقع على المحور الصادي الموجب

$$\text{معادلة الدليل } y = -\frac{3}{8} , \text{ البؤرة } f(0, \frac{3}{8}) \Rightarrow p = \frac{3}{8} \Rightarrow 9 = 24p \Rightarrow x^2 = 4py$$

$$\Rightarrow x^2 = 4(\frac{3}{8})y \Rightarrow x^2 = \frac{3}{2}y \quad \text{معادلة القطع المكافئ}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطع الزائد $8y^2 - x^2 = 32$ ويمس دليل القطع المكافئ $y^2 + 16x = 0$.

2006 دور 1

2016 دور 2

$$\text{sol : } [8y^2 - x^2 = 32] \div 32 \Rightarrow \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{32} = 1 \Rightarrow \text{في القطع الزائد } a^2 = 4 , b^2 = 32$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 4 + 32 \Rightarrow c^2 = 36 \Rightarrow c = 6$$

بؤرتا القطع الزائد وهما بؤرتي القطع الناقص $(0, 6)$, $(0, -6)$

$$\text{القطع المكافئ } y^2 + 16x = 0 \Rightarrow y^2 = -16x , y^2 = -4Px \Rightarrow 4P = 16 \Rightarrow P = 4$$

هي نقطة التماس مع القطع الناقص $(4, 0)$ \Rightarrow معادلة الدليل $x = 4$

في القطع الناقص لان البؤرتاه تقعان على محور الصادات $b = 4$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 16 + 36 \Rightarrow a^2 = 52$$

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{52} + \frac{x^2}{16} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل ويمر بالنقطتين (1, 3) , (-3, 1) ثم جد معادلة دليله .

2006 دور 2

الحل ١ بما ان القطع المكافئ يمر بنقطتين تقعان في الربعين الاول والرابع فان بؤرته تقع على محور السينات الموجب
معادلة القطع المكافئ $y^2 = 4px \Rightarrow 9 = 4p \Rightarrow p = \frac{9}{4} \Rightarrow y^2 = 9x$

معادلة الدليل $F(p, 0) = (\frac{9}{4}, 0)$ البؤرة , $x = -p \Rightarrow x = -\frac{9}{4}$

جد معادلة القطع الزائد الذي احدى بؤرتيه نقطة تقاطع المستقيم $2x - y = 8$ مع محور السينات وطول محوره التخيلي 4 وحدات .

2007 تمهيدي

الحل ١ أي نقطة تقع على محور السينات يكون فيها $y = 0$

$y = 0 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow (4, 0)$ احدى بؤرتي القطع الزائد $c = 4$

$2b = 4 \Rightarrow b = 2$, $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 16 = a^2 + 4 \Rightarrow a^2 = 12$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} = 1$

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل والبعد بين بؤرتيه 8 وحدات ورأساه هما

2007 دور 1

بؤرتا القطع الزائد $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

sol : $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ في القطع الزائد $\Rightarrow a^2 = 16$, $b^2 = 9$, $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 25 \Rightarrow c = 5$

في القطع الناقص $a = 5 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الزائد وهما رأسي القطع الناقص $(\pm 5, 0)$

$2c = 8 \Rightarrow c = 4$, $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 25 = b^2 + 16 \Rightarrow b^2 = 9$

معادلة القطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

لتكن $x^2 - ky^2 = 3$ تمثل معادلة قطع زائد احدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ $y^2 + 8x = 0$ جد قيمة k

2007 دور 1

sol : في القطع المكافئ $y^2 + 8x = 0 \Rightarrow y^2 = -8x$, $y^2 = -4Px \Rightarrow 4P = 8 \Rightarrow P = 2$

$c = 2 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الزائد $(2, 0)$, $(-2, 0)$ \Rightarrow بؤرة القطع المكافئ $(-2, 0)$

$[x^2 - ky^2 = 3] \div 3 \Rightarrow \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{\frac{3}{k}} = 1$ في القطع الزائد $\Rightarrow a^2 = 3$, $b^2 = \frac{3}{k}$

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow [4 = 3 + \frac{3}{k}] \Rightarrow \frac{3}{k} = 1 \Rightarrow k = 3$

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل وبؤرته نقطة الانقلاب للدالة $f(x)=(x-1)^3$

2007 خارج القطر

sol : $f(x) = (x-1)^3 \Rightarrow f'(x) = 3(x-1)^2 \Rightarrow f''(x) = 6(x-1)$

نقطة الانقلاب وهي بؤرة القطع المكافئ $(1, 0) \Rightarrow f(1) = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow 6(x-1) = 0$

معادلة القطع المكافئ $y^2 = 4px \Rightarrow y^2 = 4x \Rightarrow p = 1$

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما رأسا القطع الناقص $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ وطول محوره الحقيقي (12) وحدة وينطبق محوره على المحورين الاحداثيين .

2007 خارج القطر

sol : $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ في القطع الناقص $a^2 = 100 \Rightarrow a = 10$

هما رأسا القطع الناقص وهما بؤرتا القطع الزائد $(-10, 0), (10, 0)$

في القطع الزائد $a = 6 \Rightarrow 2a = 12, c = 10$

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 100 = 36 + b^2 \Rightarrow b^2 = 64$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما رأسا القطع الناقص $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$ والمار ببؤرتي القطع الناقص نفسه ثم جد مساحة القطع الناقص.

2015 خارج القطر دور 1

تلميح || هذه السؤال يعتبر مرادف للعبارة (كل منهما يمر ببؤرة الآخر) اي ان بؤرتي القطع الناقص هما رأسي القطع الزائد ورأسي القطع الناقص هما بؤرتي القطع الزائد ويشترك مع السؤال الوزاري اعلاه بالمقطع الثاني من هذا التفسير اما المقطع الاول فنقوم بحساب بؤرتي القطع الناقص عن طريق العلاقة $a^2 = b^2 + c^2$ والتي هي نفسها رأسي القطع الزائد وستكون الاجابة النهائية هي ذاتها في السؤال الوزاري اعلاه رغم نمط السؤال ، ويضاف الى الحل حساب مساحة القطع الناقص $A = ab\pi$

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه تنطبقان على بؤرتي القطع الناقص $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ والنسبة بين طول محوره الحقيقي الى البعد بين بؤرتيه تساوي $\frac{1}{2}$.

2008 تمهيدي

sol: في القطع الناقص $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

$a^2 = 25, b^2 = 9, a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 25 = 9 + c^2 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$

في القطع الزائد $\frac{2a}{2c} = \frac{1}{2} \Rightarrow c = 4 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الناقص وهما بؤرتي القطع الزائد $(\pm 4, 0)$

$\Rightarrow c = 2a \Rightarrow 4 = 2a \Rightarrow a = 2 \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 16 = 4 + b^2 \Rightarrow b^2 = 12$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

قطع مكافئ معادلته $y^2 = hx$ دليله يمر بالنقطة $(-6, 3)$ جد قيمة h.

2008 تمهيدي

sol: $\frac{1}{4} y^2 = hx \Rightarrow y^2 = 4hx$ البؤرة تقع على محور السينات

$p = 6 \Rightarrow$ بؤرة القطع المكافئ $f(6, 0) \Rightarrow$ معادلة الدليل $x = -6$

$y^2 = 4px \Rightarrow y^2 = 24x, y^2 = 4hx \Rightarrow 4h = 24 \Rightarrow h = 6$

قطع ناقص معادلته $4x^2 + 2y^2 = K$ والبعد بين بؤرتيه $2\sqrt{3}$ وحدة طول جد قيمة K .

2008 دور 1

sol : $2c = 2\sqrt{3} \Rightarrow c = \sqrt{3}$

$$[4x^2 + 2y^2 = k] \div k \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{k}{4}} + \frac{y^2}{\frac{k}{2}} = 1 \Rightarrow a^2 = \frac{k}{2}, b^2 = \frac{k}{4}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow \left[\frac{k}{2} = \frac{k}{4} + 3\right] \cdot 4 \Rightarrow 2k = k + 12 \Rightarrow k = 12$$

تذكر انه اذا تسوى
بسطي كسرين اعتيدين
فان الكبرهما هو الاصغر
مقلما

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطع الناقص $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ ويمس دليل
القطع المكافئ الذي معادلته $x^2 + 12y = 0$.

2009 تمهيدي

2001 دور 1

2014 دور 2

2015 دور 1

sol : $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ ففي القطع الناقص $a^2 = 25, b^2 = 9$

$$c^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow c^2 = 25 - 9 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$$

بؤرتا القطع الناقص وهما بؤرتي القطع الزائد $(0, 4), (0, -4)$

$$x^2 + 12y = 0 \Rightarrow x^2 = -12y, x^2 = -4Py \Rightarrow 4P = 12 \Rightarrow P = 3$$

هي نقطة التماس مع القطع الزائد $(0, 3)$ \Rightarrow معادلة الدليل $y = 3$

$$a = 3, c = 4 \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 16 = 9 + b^2 \Rightarrow b^2 = 7$$

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{7} = 1$$
 معادلة القطع الزائد

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه هما بؤرتي القطع الناقص $25x^2 + 9y^2 = 225$ ويمس دليل القطع المكافئ الذي معادلته $x^2 + 8y = 0$.

2015 دور 3

جد معادلة القطع الناقص الذي يمر ببؤرتي القطع الزائد $9y^2 - 16x^2 = 144$ ويقطع من محور السينات جزءا طوله 12 وحدة.

2009 دور 1

sol : $[9y^2 - 16x^2 = 144] \div 144 \Rightarrow \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ في القطع الزائد

$$a^2 = 16, b^2 = 9, c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 16 + 9 \Rightarrow c^2 = 25 \Rightarrow c = 5$$

في القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل $a = 5$ OR $b = 5 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الزائد $(0, 5), (0, -5)$
بما ان الجزء المقطوع من محور السينات = 12 فان

$$2a = 12 \Rightarrow a = 6 \text{ OR } 2b = 12 \Rightarrow b = 6$$

نقوم باخذ احتمال واحد من كل احتمالين لينتج $a = 6, b = 5$

بما ان القطبين يقعان على محور الصادات فان البؤرتين والرأسين يقعان على محور السينات

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{25} = 1$$
 معادلة القطع الناقص

جد معادلة القطع الناقص الذي احدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ $y^2 = -8x$ وطول محوره الكبير يساوي ثلاثة امثال طول محوره الصغير .

2010 تمهيدي

sol : $y^2 = -8x$, $y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 8 \Rightarrow p = 2 \Rightarrow (-2,0)$ بؤرة القطع المكافئ

$(\pm 2, 0)$ بؤرتي القطع الناقص $\Rightarrow c = 2 \in x\text{-axis}$

$2a = 3(2b) \Rightarrow a = 3b \dots (1)$

$a^2 = b^2 + c^2 \dots (2)$

$9b^2 = b^2 + 4 \Rightarrow 8b^2 = 4 \Rightarrow b^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow b = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow a = \frac{3}{\sqrt{2}}$

معادلة القطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{9}{2}} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}} = 1 \rightarrow \frac{2x^2}{9} + \frac{2y^2}{1} = 1$

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل ومحوره على المحورين الاحداثيين ويمر ببؤرة القطع المكافئ $y^2 - 16x = 0$ ومساحة منطقة القطع الناقص تساوي 20π وحدة مساحة .

2010 دور 1

sol: $y^2 = 16x$, $y^2 = 4px \Rightarrow 4p = 16 \Rightarrow p = 4 \Rightarrow (4,0)$ بؤرة القطع المكافئ

$(4,0) \in$ القطع الناقص \Rightarrow either $a = 4$ OR $b = 4$

$ab\pi = 20\pi \Rightarrow ab = 20$

if $a = 4 \Rightarrow 4b = 20 \Rightarrow b = 5$ تهمل

if $b = 4 \Rightarrow 4a = 20 \Rightarrow a = 5$

بما ان القطب يقع على محور السينات فان البؤرتين والرأسين على محور الصادات

معادلة القطع الناقص $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{16} = 1$

اذا كانت $K y^2 + 3x^2 = Z$ معادلة قطع ناقص بؤرتاه تنتميان الى محور السينات ويمر بنقطة

2010 دور 2

تقاطع المستقيم $2x + y = \sqrt{3}$ مع المحور الصادي علما ان مساحة مناطقه $2\sqrt{3}\pi$ وحدة

مساحة جد قيمتي K, Z

sol : if $x = 0 \Rightarrow y = \sqrt{3} \Rightarrow (0, \sqrt{3}) \in \text{Ellipse}$

لأن البؤرة تقع على محور السينات $b = \sqrt{3}$

$2\sqrt{3}\pi = ab\pi \Rightarrow 2\sqrt{3}\pi = \sqrt{3}a\pi \Rightarrow a = 2$

$[K y^2 + 3x^2 = Z] \div Z \Rightarrow \frac{y^2}{\frac{Z}{K}} + \frac{x^2}{\frac{Z}{3}} = 1 \Rightarrow a^2 = \frac{Z}{3}, b^2 = \frac{Z}{K}$

$4 = \frac{Z}{3} \Rightarrow Z = 12, 3 = \frac{Z}{K} \Rightarrow 3 = \frac{12}{K} \Rightarrow K = 4$

Mob: 07902162268

54

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

جد قيمة A وبؤرة ودليل القطع المكافئ الذي معادلته $Ax^2 + 8y = 0$ المار بالنقطة $(2,1)$ **تلميح** || السؤال نفسه سؤال تمارين القطع المكافئ وتم عكس احداثي النقطة .

2011 دور 1

الحل | اي نقطة تنتمي الى القطع المكافئ تحقق معادلته

$$Ax^2 + 8y = 0 \Rightarrow 4A + 8 = 0 \Rightarrow 4A = -8 \Rightarrow A = -2$$

$$-2x^2 = -8y \Rightarrow x^2 = 4y, \quad x^2 = 4py \Rightarrow 4p = 4 \Rightarrow p = 1$$

$$f(0, p) = (0, 1) \text{ بؤرة القطع المكافئ } y = -p \Rightarrow y = -1 \text{ معادلة الدليل}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه تنتميان لمحور السينات ومركزه نقطة الاصل ومساحة منطقتيه 7π وحدة مربعة ومحيطه يساوي 10π وحدة .

2011 دور 2

2015 دور 4 مراجعة

$$A = a b \pi = 7 \pi \Rightarrow ab = 7 \Rightarrow a = \frac{7}{b} \dots\dots (1)$$

$$P = 2\pi \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} = 10\pi \Rightarrow \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} = 5 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2}{2} = 25$$

$$a^2 + b^2 = 50 \dots\dots (2)$$

$$\frac{49}{b^2} + b^2 = 50 \Rightarrow 49 + b^4 = 50b^2 \Rightarrow b^4 - 50b^2 + 49 = 0$$

$$(b^2 - 49)(b^2 - 1) = 0$$

$$\text{اما } b^2 = 49 \Rightarrow b = 7 \Rightarrow a = \frac{7}{7} = 1 \text{ يهمل}$$

$$\text{او } b^2 = 1 \Rightarrow b = 1 \Rightarrow a = 7$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{1} = 1 \text{ معادلة القطع الناقص}$$

جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الاصل وطول محوره الحقيقي 6 وحدات والاختلاف المركزي يساوي (2) وبؤرتاه تقعان على محور السينات .

2011 خارج

$$\text{sol : } 2a = 6 \Rightarrow a = 3$$

$$\frac{c}{a} = 2 \Rightarrow c = 2a \Rightarrow c = 6$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 36 = 9 + b^2 \Rightarrow b^2 = 27$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1 \text{ معادلة القطع الزائد}$$

جد البورتين والرأسين وطول كل من المحورين والاختلاف المركزي للقطع الزائد

$$2(y+1)^2 - 4(x-1)^2 = 8$$

2012

تمميد

2011 دور 2

$$\text{sol : } \frac{(y+1)^2}{4} - \frac{(x-1)^2}{2} = 1$$

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1 \quad \text{الصورة القياسية هي}$$

مركز القطع الزائد الذي محوره الحقيقي يوازي محور الصادات $h = 1$, $k = -1 \Rightarrow (h, k) = (1, -1)$ معادلة المحور الحقيقي $x = 1$, طول المحور الحقيقي $2a = 4 \Rightarrow a = 2$ معادلة المحور المرافق $y = -1$, طول المحور المرافق (التخيلي) $2b = 2\sqrt{2} \Rightarrow b = \sqrt{2}$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 4 + 2 \Rightarrow c^2 = 6 \Rightarrow c = \sqrt{6} \Rightarrow \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{2} \quad \text{الاختلاف المركزي}$$

البورتان هما $F_1(h, k+c)$, $F_2(h, k-c) = F_1(1, -1 + \sqrt{6})$, $F_2(1, -1 - \sqrt{6})$ الرأسان هما $V_1(h, k+a)$, $V_2(h, k-a) = V_1(1, 1)$, $V_2(1, -3)$

ين كل من البورتين والرأسين وطولي المحورين والاختلاف المركزي للقطع الزائد

2015 دور 3

$$2(y+2)^2 - 4(x-3)^2 = 8$$

جد البورتين والرأسين وطول ومعادلة كل من المحورين والاختلاف المركزي التالية

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(1-y)^2}{25} = 1$$

اجريت تحويل بسيط في السؤال للفائدة العامة

2011 خارج

$$\text{sol : } \frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(1-y)^2}{25} = 1 \Rightarrow \frac{(x-2)^2}{9} + \frac{[-(y-1)]^2}{25} = 1 \Rightarrow \frac{(y-1)^2}{25} + \frac{(x-2)^2}{9} = 1$$

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} + \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1 \quad \text{الصورة القياسية هي}$$

مركز القطع الناقص الذي محوره يوازي محور الصادات $h = 2$, $k = 1 \Rightarrow (h, k) = (2, 1)$ معادلة المحور الكبير $x = 2$, طول المحور الكبير $2a = 10 \Rightarrow a = 5$ معادلة المحور الصغير $y = 1$, طول المحور الصغير $2b = 6 \Rightarrow b = 3$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 25 = 9 + c^2 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$$

البورتان هما $F_1(h, k+c)$, $F_2(h, k-c) = F_1(2, 5)$, $F_2(2, -3)$ الرأسان هما $V_1(h, k+a)$, $V_2(h, k-a) = V_1(2, 6)$, $V_2(2, -4)$

$$\frac{c}{a} = \frac{4}{5} \quad \text{الاختلاف المركزي}$$

Mob: 07902162268

56

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

2012 خارج

قطع ناقص رأساه $(0, \pm 5)$ واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل والمار
لدليه بالنقطة $(4, -3)$ جد معادلة القطعين المكافئ والناقص .

الحل ١ بما ان رأسي القطع الناقص يقعان على محور السينات فإن بؤرتيه يقعان على محور السينات ايضاً
اي ان بؤرة القطع المكافئ تقع على محور السينات كذلك .

ولأن دليل القطع المكافئ يمر بالنقطة $(4, -3)$ فإن معادلة الليل $x = -3$

معادلة القطع المكافئ $y^2 = 4px \Rightarrow y^2 = 12x$, $p = 3$ بؤرة القطع المكافئ $F(3, 0)$

$c = 3 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الناقص $(\pm 3, 0)$

$a = 5 \Rightarrow$ رأسي القطع الناقص $(\pm 5, 0)$

$b^2 = 16 \Rightarrow 25 = b^2 + 9 \Rightarrow b^2 = 16$

معادلة القطع الناقص $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

جد البؤرتين والراسين وطول ومعادلة كل من المحورين والاختلاف المركزي للقطع الزائد

2012 خارج

$$\frac{(x+2)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{4} = 1$$

الصورة القياسية هي $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ sol :

مركز القطع الزائد الذي محوره الحقيقي يوازي محور السينات $(h, k) = (-2, 1) \Rightarrow h = -2, k = 1$

معادلة المحور الحقيقي $y = 1$, طول المحور الحقيقي $2a = 6$, $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$

معادلة المحور التخيلي $x = -2$, طول المحور التخيلي $2b = 4$, $b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 9 + 4 \Rightarrow c^2 = 13 \Rightarrow c = \sqrt{13}$$

البؤرتان هما $F_1(h + c, k)$, $F_2(h - c, k) = (-2 + \sqrt{13}, 1)$, $(-2 - \sqrt{13}, 1)$

الرأسان هما $V_1(h + a, k)$, $V_2(h - a, k) = (1, 1)$, $(-5, 1)$

القطبان هما $M_1(h, k + b)$, $M_2(h, k - b) = (-2, 3)$, $(-2, -1)$

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{3} > 1$$

الاختلاف المركزي

2013 دور 1

2015 تمهيدي

عين كل من البؤرتين والرأسين والقطبين والاختلاف المركزي للقطع الناقص

$$\frac{(x+3)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$$

sol: $\frac{(y-k)^2}{a^2} + \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$ الصورة القياسية هي

مركز القطع الناقص الذي محوره يوازي محور الصادات $h = -3$, $k = -2 \Rightarrow (h, k) = (-3, -2)$

معادلة المحور الكبير $x = -3$, طول المحور الكبير $2a = 10$, $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$

معادلة المحور الصغير $y = -2$, طول المحور الصغير $2b = 6$, $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 25 = 9 + c^2 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$$

البؤرتان هما $F_1(h, k+c)$, $F_2(h, k-c) = F_1(-3, 2)$, $F_2(-3, -6)$

الرأسان هما $V_1(h, k+a)$, $V_2(h, k-a) = V_1(-3, 3)$, $V_2(-3, -7)$

القطبان هما $M_1(h+b, k)$, $M_2(h-b, k) = M_1(0, -2)$, $M_2(-6, -2)$

$$\frac{c}{a} = \frac{4}{5} \quad \text{الاختلاف المركزي}$$

عين كل من البؤرتين والرأسين والقطبين والاختلاف المركزي وطولي المحورين للقطع الناقص

2013 دور 2

$$\frac{(x-4)^2}{81} + \frac{(y+1)^2}{25} = 1$$

sol: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ الصورة القياسية هي

مركز القطع الناقص الذي محوره يوازي محور السينات $h = 4$, $k = -1 \Rightarrow (h, k) = (4, -1)$

معادلة المحور الكبير $y = -1$, طول المحور الكبير $2a = 18$, $a^2 = 81 \Rightarrow a = 9$

معادلة المحور الصغير $x = 4$, طول المحور الصغير $2b = 10$, $b^2 = 25 \Rightarrow b = 5$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 81 = 25 + c^2 \Rightarrow c^2 = 56 \Rightarrow c = \sqrt{56}$$

البؤرتان هما $F_1(h+c, k)$, $F_2(h-c, k) = F_1(4+\sqrt{56}, -1)$, $F_2(4-\sqrt{56}, -1)$

الرأسان هما $V_1(h+a, k)$, $V_2(h-a, k) = V_1(13, -1)$, $V_2(-5, -1)$

القطبان هما $M_1(h, k+b)$, $M_2(h, k-b) = M_1(4, 4)$, $M_2(4, -6)$

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{56}}{9} \quad \text{الاختلاف المركزي}$$

Mob: 07902162268

58

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

جد معادلة القطع الناقص الذي تقع بؤرتاه على محور السينات ومركزه نقطة الاصل والنسبة بين طولي محوريه كنسبة 1:2 ويقطع القطع المكافئ $y^2 = 8x$ عند $x = 2$ فان في القطع المكافئ $y^2 = 8x$ عند $x = 2$ فان

2013 خارج

الحل :-

$$y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 4 \Rightarrow (2, 4), (2, -4) \in \text{Ellipse}$$

$$\frac{2b}{2a} = \frac{1}{2} \quad 2a = 2(2b) \Rightarrow 2a = 4b \Rightarrow a = 2b \dots\dots (1) \quad \text{في القطع الناقص}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{4}{(2b)^2} + \frac{16}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{4}{4b^2} + \frac{16}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{b^2} + \frac{16}{b^2} = 1$$

$$\frac{17}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 = 17 \Rightarrow b = \sqrt{17} \Rightarrow a = 2\sqrt{17}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{68} + \frac{y^2}{17} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

تأكيد !! لو ان البؤرتان على محور الصادات

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{32} = 1 \quad \text{لكانت المعادلة}$$

جد معادلة القطع الزائد الذي رأساه هما بؤرتي القطع الناقص $9x^2 + 5y^2 = 45$ والمسافة بين بؤرتيه تساوي ضعف طول محوره المرافق .

2013 خارج

$$\text{في القطع الناقص} \quad \frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{sol : } [9x^2 + 5y^2 = 45] \div 45 \Rightarrow$$

$$a^2 = 9, b^2 = 5, c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 5 = 4 \Rightarrow c = 2 \in y\text{-axis}$$

$$\text{القطع الزائد} \quad a = 2 \in \text{بؤرتي القطع الناقص وهما رأسي القطع الزائد} \quad (0, \pm 2)$$

$$2c = 2(2b) \Rightarrow c = 2b \dots\dots (1)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \dots\dots (2)$$

$$4b^2 = 4 + b^2 \Rightarrow 3b^2 = 4 \Rightarrow b^2 = \frac{4}{3}$$

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{\frac{4}{3}} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتيه $F_1, F_2(\mp 4, 0)$ والنقطة P تنتمي اليه بحيث ان محيط المثلث PF_1F_2 يساوي 24 وحدة ؟

2014 محور 1


$$\text{sol : } (4, 0) = (c, 0) \Rightarrow c = 4$$

$$PF_1 + PF_2 + F_1F_2 = 24$$

$$2a + 2c = 24 \Rightarrow 2a + 8 = 24 \Rightarrow 2a = 16 \Rightarrow a = 8$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 64 = b^2 + 16 \Rightarrow b^2 = 48$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$



Mob: 07902162268

59

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

2016 دور 2 خارج

جد معادلة القطع الذي بؤرتاه $(0, \pm 5)$ والنقطة Q تنتمي اليه بحيث ان المثلث QF_1F_2 محيطه يساوي 30 وحدة طول .


sol : $(5, 0) = (c, 0) \Rightarrow c = 5$

$$QF_1 + QF_2 + F_1F_2 = 30$$

$$2a + 2c = 30 \Rightarrow 2a + 10 = 30 \Rightarrow 2a = 20 \Rightarrow a = 10$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 100 = b^2 + 25 \Rightarrow b^2 = 75$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{75} = 1$$
 معادلة القطع الناقص



جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ $x^2 = 24y$ ومجموع طولي محوريه (36) وحدة .

2012 تمصيدي

الحل :- :- في القطع المكافئ $x^2 = 24y$, $x^2 = 4Py \Rightarrow 4P = 24 \Rightarrow P = 6$

$$(0, 6), (0, -6) \Rightarrow c = 6$$

$$2a + 2b = 36 \Rightarrow a + b = 18 \Rightarrow a = 18 - b \dots\dots (1) \text{ في القطع الناقص}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \dots\dots (2)$$

$$(18 - b)^2 = b^2 + 36 \Rightarrow 324 - 36b + b^2 = b^2 + 36$$

$$36b = 324 - 36 \Rightarrow 36b = 288 \Rightarrow b = 8 \Rightarrow a = 18 - 8 \Rightarrow a = 10$$

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{64} = 1$$
 معادلة القطع الناقص

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

60

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2014 نارحين

جد معادلة القطع الناقص الذي احدى بؤرتيه تبعد عن نهايتي محوره الكبير بالعدين 1 ، 5 على الترتيب وبؤرتاه تقعان على محور الصادات ومركزه نقطة الاصل.


sol : بما ان موقع البؤرة غير معلوم فيجب اخذ الاحتمالان معا

$$2a = 1 + 5 \Rightarrow 2a = 6 \Rightarrow a = 3$$

$$2c = 5 - 1 \Rightarrow 2c = 4 \Rightarrow c = 2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 9 = b^2 + 4 \Rightarrow b^2 = 5$$

or $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{5} = 1$ معادلة القطع الناقص



يدور القمر حل الارض في مدار على صورة قطع ناقص سيني البؤرتين . تقع الارض في احدى بؤرتيه فاذا كانت اطل مسافة بين الارض والقمر 90Km واقصر مسافة بينهما 10km جد الاختلاف المركزي للقطع


2016 دور 2 خارج

sol :

$$2a = 90 + 10 \Rightarrow 2a = 100 \Rightarrow a = 50$$

$$2c = 90 - 10 \Rightarrow 2c = 80 \Rightarrow c = 40$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$$



التقييم ١ فكرة السؤال منهجية ولكن واضع السؤال قد اخفق في تقدير المسافة المنطقية بين الارض والقمر وواقع نفسه في اشكال منطقي رغم ذلك يعد السؤال من الاسئلة السهلة نسبيا .

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

61

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2012 دور 2

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وينطبق محوره على المحورين الاحداثيين ويقطع من محور السينات جزءا طوله 8 وحدات ومساحة منطقتة 24π وحدة مساحة ؟

$$\text{sol: } A = ab\pi \Rightarrow 24\pi = ab\pi \Rightarrow ab = 24$$

الجزء المقطوع من محور السينات يمثل (اما المحور الكبير (2a) او (المحور الصغير (2b

$$\text{if } 2a = 8 \Rightarrow a = 4 \Rightarrow 4b = 24 \Rightarrow b = 6 \text{ تهمل}$$

$$2b = 8 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow 4a = 24 \Rightarrow a = 6$$

بما ان الجزء المقطوع من محور السينات يمثل المحور الصغير فان البورتين والرأسين يقعان على محور الصادات اي ان معادلة القطع الناقص هي

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{16} = 1$$

عين البؤرة والرأس ومعالنتي كل من الدليل والمحور للقطع المكافئ $y^2 + 4y + 2x = -6$

2012 دور 1

$$\text{sol: } y^2 + 4y + 2x = -6 \Rightarrow y^2 + 4y + 4 = -2x - 6 + 4$$

$$\Rightarrow (y + 2)^2 = -2x - 2$$

$$(y + 2)^2 = -2(x + 1), (y - k)^2 = -4p(x - h) \Rightarrow 4p = 2 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

$$F(h-p, k) = F(-\frac{3}{2}, -2) \text{ البؤرة}, V(h, k) = (-1, -2) \text{ الرأس}$$

$$x = h+p \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ معادلة الليل}, y = k \Rightarrow y = -2 \text{ معادلة المحور}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ $y^2 - 12x = 0$ وطول محوره الصغير يساوي 8 وحدات .

2014 تمهيدي

$$\text{sol: } y^2 = 12x, y^2 = 4px \Rightarrow 4p = 12 \Rightarrow p = 3 \Rightarrow (3, 0) \text{ بؤرة القطع المكافئ}$$

$$(\pm 3, 0) \text{ بؤرتي القطع الناقص} \Rightarrow c = 3 \in x\text{-axis}$$

$$2b = 8 \Rightarrow b = 4$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 16 + 9 = 25$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \text{ معادلة القطع الناقص}$$

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه تقعان على محور السينات ومجموع طولي محوريه يساوي 16 وحدة طول وبؤرتاه تنطبقان على بؤرتي القطع الزائد $x^2 - 2y^2 = 6$

2014 دور 4 اذار

$$\text{sol : } [x^2 - 2y^2 = 6] \div 6 \Rightarrow \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow \text{في القطع الزائد } a^2 = 6, b^2 = 3$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 6 + 3 \Rightarrow c^2 = 9 \Rightarrow c = 3$$

في القطع الناقص $c = 3 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الزائد وهما بؤرتي القطع الناقص $(3, 0), (-3, 0)$

$$2a + 2b = 16 \Rightarrow a + b = 8 \Rightarrow a = 8 - b \quad \dots\dots(1, \quad a^2 = b^2 + c^2 \quad \dots\dots(2$$

$$(8 - b)^2 = b^2 + 9 \Rightarrow 64 - 16b + b^2 = b^2 + 9 \Rightarrow 16b = 55 \Rightarrow b = \frac{55}{16} \Rightarrow b^2 = \frac{3025}{256}$$

$$a^2 = \frac{3025}{256} + 9 = \frac{5329}{256}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{256x^2}{5329} + \frac{256y^2}{3025} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

عزيزي الطالب من المحتمل ان مجموع طولي محوري القطع الناقص هي 18 بدلا من 16 وهناك خطأ مطبعي في السؤال ليكون الجواب هو

$$\text{sol : } [x^2 - 2y^2 = 6] \div 6 \Rightarrow \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow \text{في القطع الزائد } a^2 = 6, b^2 = 3$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 6 + 3 \Rightarrow c^2 = 9 \Rightarrow c = 3$$

في القطع الناقص $c = 3 \Rightarrow$ بؤرتي القطع الزائد وهما بؤرتي القطع الناقص $(3, 0), (-3, 0)$

$$2a + 2b = 18 \Rightarrow a + b = 9 \Rightarrow a = 9 - b \quad \dots\dots(1, \quad a^2 = b^2 + c^2 \quad \dots\dots(2$$

$$(9 - b)^2 = b^2 + 9 \Rightarrow 81 - 18b + b^2 = b^2 + 9 \Rightarrow 18b = 72 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow b^2 = 16$$

$$a^2 = 16 + 9 = 25$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

اذا كانت $e + id = \frac{4+2i}{1-i}$ جد معادلة القطع الناقص الذي احدى بؤرتيه $(0, d)$ وطول محوره الكبير يساوي $2||e + id||$

2014 دور 4 اذار

$$\text{sol : } e + id = \frac{4+2i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{4+4i+2i+2i^2}{1+1} = \frac{2+6i}{2} = 1 + 3i \Rightarrow e = 1, d = 3$$

$$2||e + id|| = 2||1 + 3i|| = 2\sqrt{1+9} = 2\sqrt{10}$$

$$(0, d) = (0, 3) \Rightarrow \text{احدى بؤرتي القطع الناقص } c = 3$$

$$2a = 2\sqrt{10} \Rightarrow a = \sqrt{10} \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 10 = b^2 + 9 \Rightarrow b^2 = 1$$

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{10} + \frac{x^2}{1} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

عين كل من البورتين والرأسين والقطبين والاختلاف المركزي وطولي المحورين للقطع الزائد

2014 تمميد

$$\frac{(x+2)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{4} = 1$$

$$\frac{(x+2)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{4} = 1$$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{الصورة القياسية هي}$$

مركز القطع الزائد الذي محوره الحقيقي يوازي محور السينات $(h, k) = (-2, 1)$ ، $h = -2$ ، $k = 1$

معادلة المحور الحقيقي $y = 1$ ، طول المحور الحقيقي $2a = 6$ ، $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$

معادلة المحور التخيلي $x = -2$ ، طول المحور التخيلي $2b = 4$ ، $b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 9 + 4 \Rightarrow c^2 = 13 \Rightarrow c = \sqrt{13}$$

البورتان هما $F_1(h + c, k)$ ، $F_2(h - c, k) = (-2 + \sqrt{13}, 1)$ ، $(-2 - \sqrt{13}, 1)$

الرأسان هما $V_1(h + a, k)$ ، $V_2(h - a, k) = (1, 1)$ ، $(-5, 1)$

الاختلاف المركزي $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{3}$ ، $M_1(h, k+b)$ ، $M_2(h, k-b) = (-2, 3)$ ، $(-2, -1)$ $\Rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{13}}{3}$

جد بؤرة ونليل القطع المكافئ ومعادلة المحور ورأس القطع المكافئ
مع الرسم ؟ $8y + 7 = x^2 + 2x$

2014 دور 3

sol: $x^2 + 2x = 8y + 7 \Rightarrow x^2 + 2x + 1 = 8y + 8$

$$(x + 1)^2 = 8(y + 1) , (x - h)^2 = 4p(y - k)$$


$$h = -1 , k = -1 \Rightarrow v(h, k) = (-1, -1) \quad \text{الرأس}$$

$$4p = 8 \Rightarrow p = 2$$

$$F(h, k+p) = (-1, 1) \quad \text{البؤرة}$$

$$y = k - p \Rightarrow y = -3 \quad \text{معادلة الدليل}$$

$$x = h \Rightarrow x = -1 \quad \text{معادلة المحور}$$



برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

64

اعدادية الكاظمية للبنين

اعدادية الكاظمية للبنين

2014 تمهيدي

جسر على شكل نصف قطع ناقص ، المسافة بين نهايتي قاعدته (24 m) وارتفاعه (9 m) جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد عن بدايته (6 m)

الحل ١ نفرض ان مركز الجسر هو نقطة الاصل فيكون طول الجسر الافقي هو المحور الكبير للقطع الناقص وارتفاعه هو نصف المحور الصغير $2a = 24 \Rightarrow a = 12$, $b = 9$

وعلى اعتبار ان اي نقطة تقع على القطع الناقص تحقق معادلته فان النقطة التي تبعد عن بداية الجسر 6 متر هي النقطة التي تبعد عن نقطة الاصل 6 متر ايضا اي ان احداثيها السيني يساوي 6 والمطلوب الارتفاع الذي يمثل الاحداثي الصادي للنقطة

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{36}{144} + \frac{y^2}{81} = 1 \Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{y^2}{81} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{81} = 1 - \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{y^2}{81} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{243}{4} \Rightarrow y = \frac{9\sqrt{3}}{2} \text{ m}$$

2014 تمهيدي

جد معادلة القطع الناقص والزائد اذا كان كل منهما يمر ببؤرتي الآخر وكلاهما تقعان على المحور السيني وطول المحور الكبير يساوي $6\sqrt{2} \text{ m}$ وطول المحور الحقيقي يساوي 6m

الحل ١ في القطع الناقص $2a = 6\sqrt{2} \Rightarrow a = 3\sqrt{2}$

في القطع الزائد $2a = 6 \Rightarrow a = 3$ وبما انهما كل منهما يمر ببؤرتي الآخر فان راسي القطع الناقص هما ببؤرتي القطع الزائد وبؤرتي القطع الناقص هما راسي القطع الزائد وعليه فان

في القطع الناقص $a = 3\sqrt{2}$, $c = 3 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 18 = b^2 + 9 \Rightarrow b^2 = 9$

معادلة القطع الناقص $\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$

في القطع الزائد $c = 3\sqrt{2}$, $a = 3 \Rightarrow c^2 = b^2 + a^2 \Rightarrow 18 = b^2 + 9 \Rightarrow b^2 = 9$

معادلة القطع الزائد $\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9} = 1$

2014 خارج

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه نقطتا تقاطع المنحني $x^2 + y^2 - 3x = 16$ مع محور الصادات ويمس دليل القطع المكافئ $y^2 = 12x$.

الحل :- في المنحني $x^2 + y^2 - 3x = 16$ عن $x = 0$ فان

$y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 4 \Rightarrow (0, 4), (0, -4)$ ببؤرتي القطع الناقص $c = 4$

في القطع المكافئ $y^2 = 12x$, $y^2 = 4Px \Rightarrow 4P = 12 \Rightarrow P = 3$

القطع الناقص نقطة التماس $(-3, 0) \Rightarrow$ معادلة الدليل $x = -3$

لأن البؤرتين تقعان على محور الصادات والنقطة تقع على محور السينات $b = 3$

$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 9 + 16 \Rightarrow a^2 = 25$

معادلة القطع الناقص $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1$

Mob: 07902162268

65

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه (0, 6) و (0, -6) ويتقاطع مع محور السينات عند $x = \pm 4$ ومركزه نقطة الاصل .

2014 دور 4 انبار

sol : $c = 6$, $a = 4$, $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 36 = b^2 + 16 \Rightarrow b^2 = 20$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$

اكتب المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الاصل اذا علمت ان احد رأسيه يبعد عن البؤرتين بالعدد 9 ، 1 على الترتيب اذا علمت ان محوره ينطبقان على المحورين الاحداثيين .

2015 تمميد


sol : $2c = 1 + 9 \Rightarrow 2c = 10 \Rightarrow c = 5$

$2a = 9 - 1 \Rightarrow 2a = 8 \Rightarrow a = 4$

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 25 = 16 + b^2 \Rightarrow b^2 = 9$

معادلة القطع الزائد $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

معادلة القطع الزائد $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$



ملاحظة (**منهجية**) اذا كانت احد رأسي قطع زائد يبعد عن البؤرتين بعددين فان مجموعهما يمثل 2c وفرقهما الموجب يمثل 2a .

ملاحظة (**غير منهجية**) حاصل ضرب بعدي الراس في القطع الزائد عن البؤرتين يساوي b^2

جد المعادلة القياسية للقطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه النقطتان (0, 5) و (0, -5) وطول محوره الكبير يساوي 12 وحدة .

2015 دور 1

sol: $c = 5 \in x - \text{axis}$, $2a = 12 \Rightarrow a = 6$

$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 36 = b^2 + 25 \Rightarrow b^2 = 11$

معادلة القطع الناقص $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{11} = 1$

التقييم || سؤال سهل جدا جدا واعتقد ان ماكان مقدر له ان يكون باستخدام التعريف وقد تم تخفيف السؤال على الطالب بشكل كبير علما ان الطالب الذي استخدم التعريف في حله يعطى درجة كاملة .

قصي هاشم التميمي

ليكن $5y^2 - 4x^2 = k$ قطع زائد احدي بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ
 $4y - \sqrt{5} x^2 = 0$ جد قيمة k .

2015 دور 2

sol : $4y - \sqrt{5} x^2 = 0 \Rightarrow 4y = \sqrt{5} x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{4}{\sqrt{5}} y$, $x^2 = 4Py \Rightarrow 4P = \frac{4}{\sqrt{5}} \Rightarrow P = \frac{1}{\sqrt{5}}$
 $c = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow$ بؤرتي القطع الزائد $(0, \frac{1}{\sqrt{5}})$, $(0, -\frac{1}{\sqrt{5}})$, بؤرة القطع المكافئ $(0, \frac{1}{\sqrt{5}})$
 $[5y^2 - 4x^2 = k] \div k \Rightarrow \frac{y^2}{\frac{k}{5}} - \frac{x^2}{\frac{k}{4}} = 1$ في القطع الزائد $\Rightarrow a^2 = \frac{k}{5}$, $b^2 = \frac{k}{4}$
 $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow [\frac{1}{5} = \frac{k}{5} + \frac{k}{4}] \cdot 20 \Rightarrow 4 = 4k + 5k \Rightarrow 9k = 4 \Rightarrow k = \frac{4}{9}$

جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه تنتميان الى محور الصادات ومساحته 32π
 وحدة مساحة والنسبة بين طولي محوريه كنسبة $1/2$

2015 دور 2

sol: $\frac{2b}{2a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 2b$ (1)

$a b \pi = 32 \pi \Rightarrow 2b^2 = 32 \Rightarrow b^2 = 16 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow a = 8$

معادلة القطع الناقص $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{64} + \frac{x^2}{16} = 1$

**للحصول على جميع الملازم والنصائح الدراسية
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي**

برنامج رحلتي في السادس

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبؤرتاه على محور السينات ويمر بالنقطتين (3 , 4) , (2 , 6) .

2016 دور 1 خ

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

المعادلة القياسية للقطع الناقص هي

الحل:-

$$[\frac{16}{a^2} + \frac{9}{b^2} = 1] \cdot a^2 b^2 \Rightarrow 16b^2 + 9a^2 = a^2 b^2 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$[\frac{36}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1] \cdot a^2 b^2 \Rightarrow 36b + 4a^2 = a^2 b^2 \quad \dots\dots\dots (2)$$

إذا تساوى الطرف الايمن في اي معادلتين تساوى فيهما الطرف الايسر $36b + 4a^2 = 16b^2 + 9a^2$

$$20b^2 = 5a^2 \Rightarrow a^2 = 4b^2 \quad \dots\dots\dots (3) \text{ in } (1)$$

$$16b^2 + 36b^2 = 4b^4 \Rightarrow [52b^2 = 4b^4] \div b^2 \Rightarrow b^2 = 13 \text{ in } (3) \Rightarrow a^2 = 52$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{52} + \frac{y^2}{13} = 1$$

تقييم السؤال || السؤال منهجي جدا وهو موجود في الكتاب المنهجي وتم استبدال النقطة (4 , 3) في الكتاب المنهجي الى النقطة (3 , 4) في هذا السؤال مع الابقاء على النقطة (2 , 6) على حالها وبذلك سوف تتغير معادلة

$$\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1$$

القطع الناقص علما ان المعادلة النهائية في الكتاب المنهجي هي $\frac{x^2}{45} + \frac{y^2}{20} = 1$

تلميح || القسمة على b^2 في هذا السؤال جائزة ولكنها غير جائزة بشكل مطلق ويجب ان تعلم انه لايجوز القسمة على متغير الا بعد التأكد انه لايساوي صفر وفي هذا السؤال نحن متأكدون ان b^2 لايمكن ان تساوي صفر.

برنامج رحلتي في السادس

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبعده البؤري مساويا لبعده بؤرة القطع

المكافئ عن دليله $y^2 + 24x = 0$ اذا علمت ان مساحة القطع الناقص تساوي $80\pi \text{ cm}^2$

في القطع المكافئ $\text{sol : } y^2 + 24x = 0 \Rightarrow y^2 = -24x, y^2 = -4px \Rightarrow 4p = 24 \Rightarrow p = 6$

تمثل المسافة بين بؤرة القطع المكافئ المعطى ودليله $2p = 12$

في القطع الناقص $2c = 2p \Rightarrow 2c = 12 \Rightarrow c = 6$

في القطع الناقص $ab\pi = 80\pi \Rightarrow ab = 80 \Rightarrow a = \frac{80}{b}$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow \left(\frac{80}{b}\right)^2 = b^2 + 36 \Rightarrow \left[\frac{6400}{b^2} = b^2 + 36\right] \cdot b^2$$

$$6400 = b^4 + 36b^2 \Rightarrow b^4 + 36b^2 - 6400 = 0$$

$$(b^2 + 100)(b^2 - 64) = 0 \Rightarrow b^2 = 64 \Rightarrow b = 8 \Rightarrow a = 10$$

بما انه لم يذكر موقع بؤرة القطع الناقص فأن المعادلة يمكن ان تكون بكلا الاحتمالين

$$\text{either } \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{64} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

$$\text{OR } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

تأكيد || ان وجود معادلة سينية للقطع المكافئ لاتعني ان بؤرة القطع الناقص تقع على محور السينات لان وصف البعد في السؤال يشير الى قيمة عددية للبعد بين البؤرتين وليس موقعهما . اما لفظ البعد البؤري فهو لفظ غير وارد في المنهج العراقي وغير وارد في كل الاسئلة الوزارية السابقة ويمكن ان يشير الى قيمة c فقط وفي هذا السؤال كان المقصود هو 2c وفي المنطق الرياضي يكون اي تعبير لفظي له اكثر من دلالة واحدة يشير الى خلل واضح في اعداد السؤال وهذا مالايجب حدوثه في الاسئلة الوزارية .

السؤال منهجي بالرغم من عدم وجوده نصا في الكتاب المقرر وصيغته ركيكة بعض الشيء فيجب ان يقال ان

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل وبعده البؤري مساويا لبعده بؤرة القطع المكافئ $y^2 + 24x = 0$ عن دليله اذا علمت ان مساحة القطع الناقص تساوي $80\pi \text{ cm}^2$.

قصي هاشم التميمي

جد معادلة القطع الزائد والناقص اذا كان كل منهما يمر ببؤرتي الآخر وكلاهما تقعان على محور السينات وطول المحور الكبير يساوي $6\sqrt{2}$ وحدة طول وطول المحور الحقيقي يساوي 6 وحدة طول .

الحل \ بما ان القطعان الزائد والناقص كل منهما يمر ببؤرة الآخر فإن بؤرتي القطع الناقص هما رأسي القطع الزائد ورأسي القطع الناقص هما بؤرتي القطع الزائد .

في القطع الناقص $2a = 6\sqrt{2} \Rightarrow a = 3\sqrt{2}$

في القطع الزائد $2a = 6 \Rightarrow a = 3$

$c = 3 \Rightarrow$ هما بؤرتي القطع الناقص $(\pm 3, 0)$, هما رأسي القطع الناقص $(\pm 3\sqrt{2}, 0)$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 18 = b^2 + 9 \Rightarrow b^2 = 9$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{معادلة القطع الناقص}$$

$a = 3 \Rightarrow$ هما رأسي القطع الزائد $(\pm 3, 0)$, هما بؤرتي القطع الزائد $(\pm 3\sqrt{2}, 0)$

$$c^2 = b^2 + a^2 \Rightarrow 18 = b^2 + 9 \Rightarrow b^2 = 9$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{معادلة القطع الزائد}$$

السؤال منهجي بالرغم من عدم وجوده نصا في الكتاب المقرر على الرغم من ان لغة السؤال ركيكة بعض الشيء وينقصه ان يذكر فيه ان القطعان مركزيهما نقطة الاصل .

برنامج رحلتي في السادس

2016 تمميد

جد معادلة القطع المخروطي الذي رأسه نقطة الاصل وينطبق محوره على المحورين الاحداثيين

اختلافه المركزي يساوي 3 ويمر بالنقطة (2, 0)

الحل ١ بما ان الاختلاف المركزي اكبر من (1) فان القطع المخروطي هو قطعاً زائداً

اذا مر القطع الزائد بنقطة تقع على احد المحورين وكان مركزه نقطة الاصل فانها تمثل الرأس حتماً

$$a = 2, \frac{c}{a} = 3 \Rightarrow c = 3a \Rightarrow c = 6$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 36 = 4 + b^2 \Rightarrow b^2 = 32$$

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{32} = 1$$
 بما ان الرأس يقع على محور الصادات فان المعادلة

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ

2016 تمميد

$$x^2 - 16y = 0 \text{ وطول محوره الكبير يساوي } 12 \text{ وحدة.}$$

$$\text{الحل :- في القطع المكافئ } x^2 - 16y = 0 \Rightarrow x^2 = 16y, x^2 = 4Py \Rightarrow 4P = 16 \Rightarrow P = 4$$

بؤرة القطع المكافئ هي (4, 0) أي ان بؤرتي القطع الناقص هي (4, 0)، (-4, 0) أي ان c = 4

$$2a = 12 \Rightarrow a = 6, c = 4$$

في القطع الناقص

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 36 = b^2 + 16 \Rightarrow b^2 = 20$$

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{36} + \frac{x^2}{20} = 1$$
 معادلة القطع الناقص

مثال الكتاب) جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ $y^2 - 12x = 0$ وطول محوره الصغير يساوي (10) وحدات.جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الاصل واحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ $y^2 - 12x = 0$ وطول محوره الصغير يساوي 8 وحدات.

2014 تمميد

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

71

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد البورتين والرأسين وطول كل من المحورين والاختلاف المركزي للقطع الزائد الذي معادلته

2016 دور 2

$$16x^2 + 160x - 9y^2 + 18y = 185$$

$$\text{Sol: } 16(x^2 + 10x) - 9(y^2 - 2y) = 185$$

$$16(x^2 + 10x + 25) - 9(y^2 - 2y + 1) = 185 + 400 - 9$$

$$16(x + 5)^2 - 9(y - 1)^2 = 576$$

بقسمة الطرفين على العدد 576

$$\frac{(x+5)^2}{36} - \frac{(y-1)^2}{64} = 1 \Rightarrow \frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \text{ هي الصورة القياسية}$$

مركز القطع الزائد الذي محوره الحقيقي يوازي محور السينات $(h, k) = (-5, 1)$ ، $k = 1$ ، $h = -5$ معادلة المحور الحقيقي $y = 1$ ، طول المحور الحقيقي $2a = 12$ ، $a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$ معادلة المحور التخيلي $x = -5$ ، طول المحور التخيلي $2b = 16$ ، $b^2 = 64 \Rightarrow b = 8$

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = 36 + 64 \Rightarrow c^2 = 100 \Rightarrow c = 10$$

الاختلاف المركزي

البورتان هما $F_1(h + c, k)$ ، $F_2(h - c, k) = (5, 1)$ ، $(-15, 1)$

$$\frac{c}{a} = \frac{5}{6} > 1$$

الرأسان هما $V_1(h + a, k)$ ، $V_2(h - a, k) = (1, 1)$ ، $(-11, 1)$

برنامج رحلتي في السادس

حلوى الاسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثالث (المسائل المرتبطة بالزمن)

1996 دور 1

جد نقطة او اكثر تنتمي الى الدائرة $x^2 + y^2 - 4x = 4$ عندها يكون معدل تغير x بالنسبة للزمن مساويا الى معدل تغير y بالنسبة للزمن .

sol : let $M(x, y)$; $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt}$

$$x^2 + y^2 - 4x = 4$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} - 4 \frac{dx}{dt} = 0$$

$$2x \frac{dx}{dt} - 4 \frac{dx}{dt} = -2y \frac{dy}{dt} \Rightarrow (2x - 4) \frac{dx}{dt} = (-2y) \frac{dy}{dt}$$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} \Rightarrow [(2x - 4) = (-2y)] \div 2 \Rightarrow x - 2 = -y \Rightarrow y = 2 - x \dots\dots (1)$$

$$x^2 + y^2 - 4x = 4 \dots\dots (2)$$

$$x^2 + (2 - x)^2 - 4x - 4 = 0$$

$$x^2 + 4 - 4x + x^2 - 4x - 4 = 0$$

$$2x^2 - 8x = 0 \Rightarrow 2x(x - 4) = 0$$

$$x = 0 \Rightarrow y = 2 \text{ OR } x = 4 \Rightarrow y = 2 - 4 = -2$$

$$M = \{ (0, 2), (4, -2) \}$$

1997 دور 1

سيارة تسير بسرعة 30 m/s اجتازت اشارة مرورية حمراء ارتفاعها 3 m عن سطح الارض وبعد ان ابتعدت عنها مسافة $3\sqrt{3} \text{ m}$ اصطدمت بسيارة اخرى نتيجة عدم الالتزام بقوانين المرور جد سرعة تغير المسافة بين السيارة والاشارة الضوئية .

تلميح || هذا السؤال لكي يكون منطقيا يجب ان تكون الاشارة المرورية معلقة والسيارة تمر من تحتها مباشرة وفي غير هذه الحالة اي انه ان كانت الاشارة تقع اعلى عمود مستقر على الارض عندها يجب ان يكون العمود على الرصيف وليس في وسط الشارع والا اصطدمت السيارة به .


الحل || نفرض ان بعد السيارة عن مسقط الاشارة المرورية على الارض x ونفرض ان بعدها عن الاشارة y

$$y^2 = x^2 + 9$$

$$y = 3\sqrt{3} \Rightarrow 27 = x^2 + 9 \Rightarrow x^2 = 18 \Rightarrow x = 3\sqrt{2}$$

$$2y \frac{dy}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \Rightarrow y \frac{dy}{dt} = x \frac{dx}{dt}$$

$$3\sqrt{3} \frac{dy}{dt} = 3\sqrt{2} (30) \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{3\sqrt{2} (30)}{3\sqrt{3}} = 10\sqrt{6} \text{ m/s}$$



قطار نو عربة واحدة يسير بسرعة (30 m/s) اجتازت شجرة ارتفاعها 3 m عن سطح الارض وبعد ان ابتعدت عنها مسافة $3\sqrt{3}$ m توقف نتيجة وجود عمل اربابي على السكة احسب سرعة تغير المسافة بين القطار وقمة الشجرة ؟

2010 تمميد

تلميح || هذا السؤال فيه اشكال كبير من حيث المنطوق لان الشجرة لا يمكن ان تكون على السكة مباشرة ولا يمكن تفسير الشجرة على انها معلقة كما في تفسير سؤال الاشارة المروية لذا فان السؤال على وضعه الحالي فيه اشكال كبير ولا يمكن ان يكرر في الامتحان الا بعد الدخال التعديل ادناه عليه ليكون سؤالاً ليس بسهل التعديل المقترح ((ان اقرب مسافة بين الشجرة والسكة هي 3 متر)) ، ((كما سنفترض انه يبتعد عن قمته)) وسيصبح الحل بالشكل ادناه :-

الحل || في المثلث acb القائم الزاوية في c نفرض ان $ab = y$ والذي يمثل قطر متوازي المستطيلات حيث ان bc يمثل الشجرة و cd اقرب مسافة بين قاعدة الشجرة والسكة

$$y^2 = z^2 + 9$$

$$[y = 3\sqrt{3} \Rightarrow 27 = z^2 + 9 \Rightarrow z^2 = 18 \Rightarrow z = 3\sqrt{2}]$$

$$2y \frac{dy}{dt} = 2z \frac{dz}{dt} \Rightarrow y \frac{dy}{dt} = z \frac{dz}{dt} \dots (1)$$

في المثلث adc القائم الزاوية في d نفرض ان $ad = x$, $ac = z$


$$z^2 = x^2 + 9 \Rightarrow 18 = x^2 + 9 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$$

$$2z \frac{dz}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \Rightarrow z \frac{dz}{dt} = x \frac{dx}{dt} \dots (2) \quad \text{موض 1 في 2}$$

$$y \frac{dy}{dt} = x \frac{dx}{dt} \Rightarrow 3\sqrt{3} \frac{dy}{dt} = 3 (30) \Rightarrow \frac{dy}{dt} = 10\sqrt{3} \text{ m/s}$$

تلميح || لو قيل ان القطار يبعد عن قاعدة الشجرة في لحظة ما يساوي $3\sqrt{3}$ لكنت الخطوة الثانية في الحل هي :

$$[z = 3\sqrt{3} \Rightarrow y^2 = 27 + 9 \Rightarrow y = 36 \Rightarrow y = 6]$$



اسطوانة دائرية قائمة يزداد ارتفاعها بمعدل 0.5 cm/s بحيث يظل حجمها دائماً مساوياً $320\pi \text{ cm}^3$ جد معدل تغير نصف قطر قاعدتها عندما يكون ارتفاعها 5 cm الحل || نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة = x ، ارتفاعها = h ، حجمها

2000 دور 2

2003 دور 2

2006 تمميد


$$V = \pi x^2 h \Rightarrow 320\pi = \pi x^2 h \Rightarrow 320 = x^2 h$$

$$[h = 5 \Rightarrow 320 = 5x^2 \Rightarrow x^2 = 64 \Rightarrow x = 8] \quad \text{تعوض بعد الاشتقاق}$$

$$0 = x^2 \frac{dh}{dt} + h \cdot 2x \frac{dx}{dt}$$

$$0 = 64(0.5) + 5(16) \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -0.4 \text{ cm/s}$$

اي ان معدل نقصان
نصف القطر يساوي
0.4cm/s



خزان مملوء بالماء على شكل متوازي سطوح مستطيله قاعدته مربعة طولها 2 m يتسرب منه الماء بمعدل $0.4 \text{ m}^3/\text{h}$ جد معدل تغير انخفاض الماء في الخزان في أي زمن t .

2011 دور 1

2013 دور 2


sol : let V = حجم متوازي المستطيلات , X = طول ضلع القاعدة المربعة = ارتفاع h ,

$$V = X^2 h$$

$$X = 2 \text{ m} \Rightarrow V = 4h$$

$$\frac{dv}{dt} = 4 \frac{dh}{dt} \Rightarrow -0.4 = 4 \frac{dh}{dt} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = -0.1 \text{ m/h}$$

$$\frac{dh}{dt} = 0.1 \text{ m/h} \quad \text{معدل تغير انخفاض الماء في الخزان}$$



$$x = 2$$

$$\frac{dv}{dt} = -0.4$$

$$\frac{dh}{dt} = ?$$

تذكير || الثابت الدائم يعوض قبل الاشتقاق والمتغير الدائم يعوض بعد الاشتقاق وحيثا يعوض قبل الاشتقاق لايجاد قيمة متغير دائم آخر ليتم تعويضهما معا بعد الاشتقاق

بالون كروي مملوء بالغاز فيه ثقب يتسرب منه الغاز فإذا كان معدل نقصان نصف قطره

$(\frac{7}{22} \text{ cm/s})$ بحيث يبقى محافظا على شكله فعندما يكون نصف قطره 10 cm جد :

2004 دور 1

(1) معدل نقصان حجمه ، (2) معدل نقصان مساحته السطحية

الحل | نفرض ان نصف قطر الكرة r وحجمها v ومساحتها السطحية A

$$v = \frac{4\pi}{3} r^3 \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 4 \frac{22}{7} (100) \frac{-7}{22} = -400 \text{ cm}^3/\text{s}$$

اي ان معدل نقصان الحجم يساوي $400 \text{ cm}^3/\text{s}$

$$A = 4\pi r^2 \Rightarrow \frac{dA}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dA}{dt} = 8 \frac{22}{7} (10) \frac{-7}{22} = -80 \text{ cm}^2/\text{s}$$

اي ان معدل نقصان المساحة السطحية تساوي $80 \text{ cm}^2/\text{s}$

طريقان متعامدان تسير سيارة على الطريق الاول بسرعة 80 km/h وتسير سيارة على الطريق الاخر بسرعة 60 km/h جد معدل ابتعاد السيارتين بعد مرور ربع ساعة .

2009 دور 1

الحل | نفرض ان الطريقان المتعامدان x , y والبعد بين السيارتين z

$$\therefore \frac{dx}{dt} = 80 \Rightarrow x = 80 \left(\frac{1}{4}\right) = 20 \text{ after } \frac{1}{4} h$$

$$\therefore \frac{dy}{dt} = 60 \Rightarrow y = 60 \left(\frac{1}{4}\right) = 15 \text{ after } \frac{1}{4} h$$


$$z^2 = x^2 + y^2$$

$$z^2 = 400 + 225 = 625 \Rightarrow z = 25$$

$$2z \frac{dz}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \Rightarrow z \frac{dz}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}$$

$$25 \frac{dz}{dt} = (80)(20) + (60)(15)$$

$$25 \frac{dz}{dt} = 2500 \Rightarrow \frac{dz}{dt} = 100 \text{ km/h}$$



بالون كروي مملوء بالغاز فيه ثقب يتسرب منه الغاز فإذا كانت النسبة بين معدل نقصان حجمه الى معدل نقصان قطره (200π) احسب معدل نقصان حجمه عندما يكون معدل النقصان في مساحته السطحية $80\text{m}^2/\text{s}$.

2008 دور 2

الحل // نفرض ان حجم البالون = V ، ومساحته السطحية = A ، ونصف قطره = r

$$\frac{dv}{dt} = 200\pi \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 200\pi \frac{d2r}{dt}$$

$$\frac{d2r}{dt} = 2 \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 400\pi \frac{dr}{dt} \dots\dots (1)$$

$$V = \frac{4\pi}{3} r^3 \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} \dots\dots (2)$$

$$4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 400\pi \frac{dr}{dt} \Rightarrow r^2 = 100 \Rightarrow r = 10$$

$$A = 4\pi r^2 \Rightarrow \frac{dA}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt}$$

$$- 80 = 80\pi \frac{dr}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{-1}{\pi} \quad (1) \text{ او في } (2)$$


$$\frac{dv}{dt} = 400\pi \cdot \frac{-1}{\pi} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = -400 \text{ m}^3 / \text{s} \Rightarrow \text{معدل نقصانه } 400 \text{ cm}^3/\text{s} \Rightarrow \text{معدل تغير الحجم}$$

نلاحظ ان مشتقة قانون حجم الكرة تم الاستفادة منها مرتين ، مرة من خلال المعطومة المعطاة في السؤال ومرة اخرى من خلال اشتقاق قانون الحجم ومن خلال تساوي المعادلتين 1 مع 2 نستنتج قيمة r

مكعب صلد طول حرفه 8 m مغطى بطبقة من الجليد بحيث يحافظ على شكله مكعبا ، فإذا بدأ الجليد يذوب بمعدل $6 \text{ m}^3/\text{s}$ فجد معدل النقصان في سمك الجليد في اللحظة التي يكون فيها سمك الجليد 1 m .

2011 خارج القطر

2014 داخل القطر



الحل :- نفرض ان سمك الجليد = x ، حجم المكعب = (طول الضلع)³

$$v_1 = (8)^3 \quad \leftarrow \quad 8 = \text{طول ضلع المكعب الصغير}$$

$$v_2 = (8 + 2x)^3 \quad \leftarrow \quad (8 + 2x) = \text{طول ضلع المكعب الكبير}$$

$$v = v_2 - v_1 \Rightarrow v = (8 + 2x)^3 - (8)^3$$

$$\frac{dv}{dt} = 3(8 + 2x)^2 \cdot (2) \frac{dx}{dt} + 0 \Rightarrow -6 = 3(8 + 2)^2 \cdot (2) \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{100} \text{ m/s}$$

$$\frac{dx}{dt} = -0,01 \text{ m/s} \quad \text{معدل تغير سمك الجليد} \quad \text{OR} \quad \frac{dx}{dt} = 0,01 \text{ m/s} \quad \text{معدل نقصان سمك الجليد}$$


ملاحظة! اذا ما عبرنا عن الناتج بمعدل النقصان فيكتب موجبا لأن الإشارة السالبة استعضنا عنها بوصف النقصان.

سلم طوله 10m يستند بطرفه العلوي على حائط رأسي وبطرفه السفلي على ارض افقية فاذا انزلق الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط بمعدل 2 m/sec عندما يكون الطرف الاسفل على بعد 8m من الحائط جد :

2012 دور 1

2014 دور 2

2014 تمهيدي



$$x=8, y=6$$

$$\frac{dx}{dt} = +2, \frac{dy}{dt} =$$

(1) معدل انزلاق طرفه العلوي .

(2) سرعة تغير الزاوية بين السلم والارض .

الحل :- (1) نفرض بعد قاعدة السلم عن الحائط x ، بعد رأس السلم عن الارض y

$$x^2 + y^2 = 100$$

$$64 + y^2 = 100 \Rightarrow y^2 = 36 \Rightarrow y = 6$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0$$

$$(2)(8)(2) + (2)(6) \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow 12 \frac{dy}{dt} = -32 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{8}{3} \text{ m/sec}$$

أي ان معدل انزلاق الطرف العلوي $\frac{8}{3}$ m/sec(2) نفرض ان الزاوية بين السلم والارض θ

$$\sin \theta = \frac{y}{10} \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{10} y$$

$$\cos \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{10} \frac{dy}{dt}, \because \cos \theta = \frac{x}{10} \Rightarrow \frac{x}{10} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{10} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{8}{10} \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{10} \left(-\frac{8}{3}\right) \Rightarrow \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{3} \text{ rad/sec}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{3} \text{ rad/sec}$$

تنبيه || السؤال ورد في اربع نماذج وزارية ولكن احيانا يكون مطلب واحد وهو الاول وحيانا يكون مطلبين معا .

ملاحظة مهمة ||| يمكن استخدام العلاقة في المطلب الثاني أي دالة نشاء سواء كانت $\tan \theta = \frac{y}{x}$ او $\cos \theta = \frac{x}{10}$ فنحصل على نفس الاجابة (جرب ذلك)

سلم طوله 13m يستند بطرفه العلوي على حائط رأسي وبطرفه السفلي على ارض افقية فاذا زلق الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط بمعدل 4 m/sec جد معدل انزلاق الطرف العلوي للسلم في اللحظة التي يكون فيها الطرف الاسفل للسلم على بعد 5 m من الحائط

2009 دور 2

الحل يكون بنفس اسلوب السؤال اعلاه مع مراعاة تغيير اعداد السؤال والجواب ان معدل انزلاق الطرف

العلوي للسلم يساوي $\frac{5}{3} \text{ m/s}$ مع التأكيد على ان الناتج النهائي سيكون سالبا وتم الاستعاضة منه

بكلمة انزلاق .

2011 دور 2

2014 دور 3

2015 نازحين 1

صفيحة مستطيلة من المعدن مساحتها 96 cm^2 يتمدد طولها بمعدل 2 cm/s بحيث تبقى مساحتها ثابتة ، جد معدل النقصان في عرضها وذلك عندما يكون عرضها 8 cm .

sol : let $A =$ مساحة المستطيل , $X =$ طول المستطيل , $y =$ عرض المستطيل

$$A = X y$$

$$96 = 8X \Rightarrow X = 12$$

$$0 = X \frac{dy}{dt} + y \frac{dx}{dt}$$

$$0 = 12 \frac{dy}{dt} + (8) (2) \Rightarrow 12 \frac{dy}{dt} = -16 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{4}{3} \text{ cm/s}$$

اي ان العرض يتناقص بمعدل $\frac{4}{3} \text{ cm/s}$ في تلك اللحظة

$$\frac{dx}{dt} = 2 , \frac{dy}{dt} = ?$$

$$A = 96 \text{ (ثابت)}$$

$$x = ? , y = 8$$



صفيحة مستطيلة من المعدن مساحتها 96 cm^2 يتمدد عرضها بمعدل 2 cm/s بحيث تبقى مساحتها

ثابتة ، جد معدل التغير في الطول وذلك عندما يكون طولها 12 cm .

2016

دور 1

اختلاف بسيط في الارقام عن سوال الكتاب والاسئلة الوزارية لثلاث سنوات متفرقة كما في ادناه مع التأكيد على ان الناتج السالب $3 = -\frac{dx}{dt}$ يمثل معدل تغير طول المستطيل وينتهي السؤال به واذا طلب معدل التناقص فتستبدل الاشارة السالبة بكلمة نقصان .

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

78

اعدادية الكاظمية للبنين

اعدادية الكاظمية للبنين

عمود طوله 7.2 m في نهايته مصباح ، يتحرك رجل طوله 1.8 m مبتعدا عن العمود وبسرعة 30 m/min
جد معدل تغير طول ظل الرجل .

الحل :- نفرض البعد بين قدم الرجل وقاعدة العمود = x ، نفرض ان طول ظل الرجل = y

تشابه المثلثين abc , aef

$$\frac{1.8}{7.2} = \frac{y}{x+y} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{y}{x+y}$$

$$x + y = 4y \Rightarrow x = 3y$$

$$\frac{dx}{dt} = 3 \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \left(\frac{30}{3}\right)$$

$$\frac{dy}{dt} = 10 \text{ m/min}$$


2012 تمهيدي

2013 دور 1

2014 تمهيدي في

2015 تمهيدي

2015 دور 1



$$\frac{dx}{dt} = 30, \frac{dy}{dt} = ?$$

ملاحظة || كلما يبتعد الرجل عن مصدر النور يزداد ظله والعكس صحيح
تأكيد || لو طلب في هذا السؤال معدل تغير طول ظل رأس الرجل بالنسبة للقاعدة نفرض البعد بين ظل رأس الرجل والقاعدة y والبعد بين قدم الرجل والقاعدة x عندها سيكون البعد بين قدم الرجل وظل الرأس (y-x) ثم نجري التشابه . حاول ذلك ؟؟؟
الجواب $\frac{dy}{dt} = 40 \text{ m/min}$

كما يمكن الحل بنفس الطريقة السابقة ويضاف الناتج الى سرعة الرجل للحصول على نفس الجواب .
عمود طوله 6.4 m في نهايته مصباح ، يتحرك رجل طوله 1.6 m مبتعدا عن العمود وبسرعة 30 m/min جد سرعة تغير طول ظل الرجل .

2015 دور 2

فنار ميناء ارتفاعه 20 m يعلوه مصباح كبير تحركت سفينة ارتفاعها 5m مبتعدة عن
الفنار بسرعة 50 km/h جد تغير طول ظل السفينة على سطح البحر .

2016 دور 2 خارج

الحل :- نفرض البعد بين السفينة وقاعدة الفنار = x ، نفرض ان طول ظل السفينة = y


من تشابه المثلثين abc , aef

$$\frac{5}{20} = \frac{y}{x+y} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{y}{x+y}$$

$$x + y = 4y \Rightarrow x = 3y$$

$$\frac{dx}{dt} = 3 \frac{dy}{dt} \Rightarrow 50 = 3 \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{50}{3}\right) \text{ km/h}$$



$$\frac{dx}{dt} = 50, \frac{dy}{dt} = ?$$

تأكيد | في عموم الاسئلة الفيزيائية اذا وجد اختلاف في وحدات السؤال يجب اللجوء الى توحيد الوحدات قبل الشروع في الحل
ولكن في اسئلة التشابه الذي يعتمد في الاساس على مبدأ النسب فيجوز الشروع في الحل بعد التحقق من ان كل نسبة افقية او عمودية تحوي على نفس الوحدة كما حدث في هذا السؤال حيث ان $\frac{m}{m} = \frac{km}{km}$ ويمكن جعلها بالصورة $\frac{km}{km} = \frac{km}{km}$ وكلا الحليين صحيحين ويوصل الى نفس الناتج لذا اقتضى التنويه .

سلم يستند طرفه الاسفل على ارض افقية وطرفه الاعلى على حائط رأسي فاذا انزلق الطرف الاسفل مبتعدا عن الحائط بمعدل 2 m/s جد معدل انزلاق طرفه العلوي عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والارض تساوي $\frac{\pi}{3}$.

2013 دور 1 خارج


2015 خارج 1

الحل :- نفرض طولي الضلعين القائمي x, y وليكن طول الوتر a (عددا ثابتا)

$$a^2 = x^2 + y^2$$

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \dots\dots(1)$$

$$\tan \frac{\pi}{3} = \frac{y}{x} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{y}{x} \Rightarrow y = \sqrt{3}x \dots\dots(2)$$



$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2$$

$$\frac{dy}{dt} = ?$$

$$0 = 2x(2) + 2\sqrt{3}x \frac{dy}{dt} \Rightarrow 2\sqrt{3}x \frac{dy}{dt} = -4x \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ m/s}$$

معدل انزلاق طرفه العلوي تساوي $\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ m/s}$

2015 4 مراجعة

سلم يستند طرفه الاسفل على ارض افقية وطرفه الاعلى على حائط رأسي فاذا انزلق الطرف الاسفل مبتعدا عن الحائط بمعدل $\frac{1}{5} \text{ m/s}$ جد معدل انزلاق طرفه العلوي عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والارض تساوي $\frac{\pi}{3}$

سلم يستند طرفه الاسفل على ارض افقية وطرفه الاعلى على حائط رأسي فاذا انزلق الطرف الاسفل مبتعدا عن الحائط بمعدل 2 m/s جد معدل انزلاق طرفه العلوي عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والارض تساوي $\frac{\pi}{4}$.


2016 دور 2

الحل :- نفرض طولي الضلعين القائمي x, y وليكن طول الوتر a (عددا ثابتا)

$$a^2 = x^2 + y^2$$

$$0 = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \dots\dots(1)$$

$$\tan \frac{\pi}{4} = \frac{y}{x} \Rightarrow 1 = \frac{y}{x} \Rightarrow y = x \dots\dots(2)$$



$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2$$

$$\frac{dy}{dt} = ?$$

$$0 = 2x(2) + 2x \frac{dy}{dt} \Rightarrow 2x \frac{dy}{dt} = -4x \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -2 \text{ m/s}$$

معدل انزلاق طرفه العلوي تساوي 2 m/s

التقييم \ السؤال منهجي جدا ضمن تمارين الكتاب وتم تغيير الزاوية فقط ويعد من الاسئلة المتوسطة الصعوبة وقد ورد وزاريا في ثلاث سنوات اثنان منها نصا وفي الثالثة تغيير سرعة حركة طرفه السفلي مع الابقاء على الزاوية نفسها.

لتكن M نقطة متحركة على منحنى القطع المكافئ $y^2 = 4x$ بحيث يكون معدل ابتعادها عن النقطة (7,0) يساوي 0.2 unit/s جد المعدل الزمني لتغير الاحداثي السيني للنقطة M عندما يكون $x = 4$.

2013 دور 1 خارج

sol : let $M = (x, y)$, $N = (7, 0)$, $S = MN$ طول

$$D = \sqrt{(x-7)^2 + (y-0)^2} \Rightarrow s = \sqrt{x^2 - 14x + 49 + y^2}, \quad y^2 = 4x \text{ بالتعويض}$$

$$D = \sqrt{x^2 - 14x + 49 + 4x} = \sqrt{x^2 - 10x + 49}$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{2x-10}{2\sqrt{x^2-10x+49}} \frac{dx}{dt} \Rightarrow 0.2 = \frac{8-10}{2\sqrt{16-40+49}} \cdot \frac{dx}{dt} \Rightarrow 0.2 = -\frac{2}{10} \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -1 \text{ unit/s}$$

لتكن M نقطة متحركة على منحنى القطع المكافئ $x^2 = 4y$ بحيث يكون معدل ابتعادها عن النقطة (7,0) يساوي 0.2 unit/s جد المعدل الزمني لتغير الاحداثي الصادي للنقطة M عندما يكون $y = 4$.

2016 تمهيدي

يمكن ملاحظة العلاقة العددية بين هذا السؤال والسؤال الوزاري السابق

لتكن M نقطة تتحرك على القطع المكافئ $y = x^2$ جد احداثي النقطة M عندما يكون المعدل الزمني لأبتعادها عن النقطة $(0, \frac{3}{2})$ يساوي ثلثي المعدل الزمني لتغير الاحداثي الصادي للنقطة M.

2012 دور 2

sol : let $M = (x, y)$, $N = (0, \frac{3}{2})$, $S = MN$ طول, $\frac{ds}{dt} = \frac{2}{3} \cdot \frac{dy}{dt}$

$$s = \sqrt{(x-0)^2 + (y-\frac{3}{2})^2} \Rightarrow s = \sqrt{x^2 + y^2 - 3y + \frac{9}{4}}, \quad y = x^2 \text{ بالتعويض}$$

$$s = \sqrt{y + y^2 - 3y + \frac{9}{4}} \Rightarrow s = \sqrt{y^2 - 2y + \frac{9}{4}}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{2y-2}{2\sqrt{y^2-2y+\frac{9}{4}}} \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{2y-2}{2\sqrt{y^2-2y+\frac{9}{4}}} \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{2y-2}{2\sqrt{y^2-2y+\frac{9}{4}}}$$

$$2\sqrt{y^2 - 2y + \frac{9}{4}} = 3y - 3 \text{ بتربيع الطرفين}$$

$$4(y^2 - 2y + \frac{9}{4}) = 9y^2 - 18y + 9 \Rightarrow [4y^2 - 8y + 9 = 9y^2 - 18y + 9]$$

$$5y^2 - 10y = 0 \Rightarrow 5y(y - 2) = 0$$

$$y = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ يهمل OR } y = 2 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$

$$M = \{(\sqrt{2}, 2), (-\sqrt{2}, 2)\} \text{ مجموعة الحل}$$

2014 دور 1

لتكن M نقطة تتحرك على القطع المكافئ $y = x^2$ جد احداثي النقطة M عندما يكون المعدل الزمني لأبتعادها عن النقطة $(0, \frac{3}{2})$ يساوي ثلث المعدل الزمني لتغير الاحداثي الصادي للنقطة M.

تنبيه || لعله في النية (على اعتبار ان الاعمال بالنيات) ان تكون هذه النتيجة هي النتيجة ويكون الحل كسابقه

اما اذا كانت النية حقيقية هي ثلث فيكون الحل عجيبا فريبا كما يلي :-

sol : let $M = (x, y)$, $N = (0, \frac{3}{2})$, $S = MN$ طول , $\frac{ds}{dt} = \frac{1}{3} \cdot \frac{dy}{dt}$

$$s = \sqrt{(x-0)^2 + (y-\frac{3}{2})^2} \Rightarrow s = \sqrt{x^2 + y^2 - 3y + \frac{9}{4}} , \quad y = x^2 \text{ بالتعويض}$$

$$s = \sqrt{y + y^2 - 3y + \frac{9}{4}} \Rightarrow s = \sqrt{y^2 - 2y + \frac{9}{4}}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{2y-2}{2\sqrt{y^2-2y+\frac{9}{4}}} \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{2y-2}{2\sqrt{y^2-2y+\frac{9}{4}}} \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{2y-2}{2\sqrt{y^2-2y+\frac{9}{4}}}$$

$$\sqrt{y^2 - 2y + \frac{9}{4}} = 3y - 3 \quad \text{بتربيع الطرفين}$$

$$(y^2 - 2y + \frac{9}{4}) = 9y^2 - 18y + 9 \Rightarrow$$

$$[8y^2 - 16y + \frac{27}{4} = 0] \div 8 \Rightarrow [y^2 - 2y + \frac{27}{32} = 0] \Rightarrow y^2 - 2y = -\frac{27}{32}$$

$$y^2 - 2y + 1 = -\frac{27}{32} + 1 \Rightarrow (y-1)^2 = \frac{5}{32} \Rightarrow y-1 = \pm \sqrt{\frac{5}{32}} \Rightarrow y = 1 \pm \sqrt{\frac{5}{32}}$$

$$y = x^2 \Rightarrow x^2 = 1 \pm \sqrt{\frac{5}{32}} \Rightarrow x = \pm \sqrt{1 \pm \sqrt{\frac{5}{32}}}$$

مرشح مخروطي قاعدته افقية ورأسه الى الاسفل ارتفاعه يساوي 24cm وطول قطر

2014 دور 4 انبار

قاعدته 16 cm يصب فيه سائل بمعدل $5 \text{ cm}^3/\text{s}$ بينما يتسرب منه السائل بمعدل

$1 \text{ cm}^3/\text{s}$ جد معدل تغير نصف قطر السائل في اللحظة التي يكون فيها نصف قطر السائل 4 cm .

sol : let $V =$ ارتفاع الماء = h , نصف قطر قاعدة الماء = x , حجم الماء المخروطي الشكل

$$V = \frac{\pi}{3} x^2 h$$


$$\tan \theta = \frac{8}{24} = \frac{x}{h} \quad \text{او من تشابه المثلثين abc, aef}$$

$$8h = 24x \Rightarrow h = 3x$$

$$V = \frac{\pi}{3} x^2 (3x) \Rightarrow V = \pi x^3$$

$$\frac{dv}{dt} = 3\pi x^2 \frac{dx}{dt}$$

$$4 = 3\pi (4)^2 \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{4}{48\pi} = \frac{1}{12\pi} \text{ cm/s}$$



$$\frac{dv}{dt} = 5 - 1 = 4 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$x = 4 , \frac{dx}{dt} = ?$$

2014 فاجين

جد مجموعة النقط التي تنتمي الى الدائرة $x^2 + y^2 + 4x - 8y = 108$ والتي يكون عندها المعدل الزمني لتغير x مساويا للمعدل الزمني لتغير y بالنسبة للزمن t .

sol : let $M(x, y)$; $\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt}$

$$x^2 + y^2 + 4x - 8y = 108$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} + 4 \frac{dx}{dt} - 8 \frac{dy}{dt} = 0$$

$$2x \frac{dx}{dt} + 4 \frac{dx}{dt} = 8 \frac{dy}{dt} - 2y \frac{dy}{dt} \Rightarrow (2x + 4) \frac{dx}{dt} = (8 - 2y) \frac{dy}{dt}$$

$$\therefore \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dt} \Rightarrow [(2x + 4) = (8 - 2y)] \div 2 \Rightarrow x + 2 = 4 - y \Rightarrow y = 2 - x \quad \dots\dots (1)$$

$$x^2 + y^2 + 4x - 8y = 108 \quad \dots\dots (2)$$

$$x^2 + (2 - x)^2 + 4x - 8(2 - x) - 108 = 0$$

$$x^2 + 4 - 4x + x^2 + 4x - 16 + 8x - 108 = 0$$

$$2x^2 + 8x - 120 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x - 60 = 0 \Rightarrow (x + 10)(x - 6) = 0$$

$$x = -10 \Rightarrow y = 2 + 10 = 12 \quad \text{OR} \quad x = 6 \Rightarrow y = 2 - 6 = -4$$

$$M = \{(-10, 12), (6, -4)\}$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

83

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

متوازي مستطيلات قاعدته مربعة وارتفاعه ثلاثة امثال طول قاعدته يتمدد بالحرارة جد معدل تغير حجمها ومساحتها السطحية في اللحظة التي يكون فيها طول القاعدة 8m ومعدل تغير طول القاعدة $\frac{1}{4} \text{ m/s}$.


2016 دور 1 في

الحل || نفرض ان طول القاعدة = x ، والارتفاع = h ، حيث ان $h = 3x$

حجم متوازي المستطيلات V = مساحة القاعدة \times الارتفاع
المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات A = محيط القاعدة \times الارتفاع + $2 \times$ مساحة القاعدة

$$V = x^2 h \Rightarrow V = x^2(3x) \Rightarrow V = 3x^3$$

$$\frac{dv}{dt} = 9x^2 \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 9(8)^2 \left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 144 \text{ m}^3/\text{s}$$



$$A = 4x h + 2x^2 \Rightarrow A = 12x^2 + 2x^2 \Rightarrow A = 14x^2$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{dA}{dt} = 28x \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dA}{dt} = 28(8) \left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow \frac{dA}{dt} = 56 \text{ m}^2/\text{s}$$

تلميح || بما ان المعطيات في السؤال بدلالة x نقوم بتوحيد المتغيرات في القانون بدلالة x ، ولو كانت المعطيات بدلالة h فنقوم بتوحيدها بدلالة h ايضا حيث ان اذا كانت $h = 3x$ فيكون عندها $x = \frac{h}{3}$ ارجو الانتباه

تأكيد || يمكن ان يحل السؤال بطريقة اخرى وذلك باعتبار العلاقة $h = 3x$ علاقة اساسية ويتم اشتقاقها لينتج ان $\frac{dh}{dt} = 3 \frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dh}{dt} = \frac{3}{4}$ ، $x = 8 \rightarrow h = 24$ ثم نشتق القانون العام $V = x^2 h$ حسب مشتقة

حاصل ضرب دالتين ونعوض كلا بمكانه لينتج نفس الناتج $\frac{dA}{dt} = 56 \text{ m}^2/\text{s}$ جرب بنفسك

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

84

اعدادية الكاظمية للبنين

اعدادية الكاظمية للبنين

مبرهني رول والقيمة المتوسطة والتقريب

بين ان الدالة $f(x) = (x-1)^4$ تحقق مبرهنة رول على الفترة $x \in [-1, 3]$ ثم

2011 دور 1

جد قيمة c حيث ان $f'(c) = 0$

الحل :-

(أ) الدالة مستمرة على الفترة $[-1, 3]$ لانها كثيرة حدود(ب) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(-1, 3)$ لانها كثيرة حدود .

$$f(3) = (3-1)^4 = 16, f(-1) = (-1-1)^4 = 16 \Rightarrow f(3) = f(-1) \quad (\text{ج})$$

$$f'(x) = 4(x-1)^3$$

$$f'(c) = 0 \Rightarrow 4(c-1)^3 = 0 \Rightarrow c-1=0 \Rightarrow c=1 \in (-1, 3)$$

ابحث تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2 - x + 1$ على الفترة $[-1, 2]$ وان

2012 دور 1

تحققت جد قيمة c

الحل :-

(1) الدالة مستمرة على الفترة $[-1, 2]$ لانها كثيرة حدود(2) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(-1, 2)$ لانها كثيرة حدود .

$$(3) \text{ يوجد على الاقل قيمة واحدة } c \in (a, b) \text{ وتحقق } f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$f(2) = 4 - 2 + 1 = 3, f(-1) = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(2)-f(-1)}{2+1} = \frac{(3)-(3)}{3} = 0 \quad \text{ميل الوتر}, f'(x) = 2x - 1 \Rightarrow f'(c) = 2c - 1$$

$$\text{ميل المماس} = \text{ميل الوتر} \Rightarrow 2c - 1 = 0 \Rightarrow 2c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2} \in (-1, 2)$$

باستخدام مبرهنة رول جد قيمة c للدالة $f(x) = x^4 + 2x^2$ حيث $x \in [-2, 2]$

2013 دور 2

الحل :-

(أ) الدالة مستمرة على الفترة $[-2, 2]$ لانها كثيرة حدود(ب) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(-2, 2)$ لانها كثيرة حدود .

$$f(-2) = 16 + 8 = 24, f(2) = 16 + 8 = 24 \Rightarrow f(-2) = f(2) \quad (\text{ج})$$

$$f'(x) = 4x^3 + 4x$$

$$f'(c) = 0 \Rightarrow 4c^3 + 4c = 0 \Rightarrow 4c(c^2 + 1) = 0 \Rightarrow 4c = 0 \Rightarrow c = 0 \in (-2, 2)$$

وهذا غير ممكن لانه مجموع مربعين $c^2 + 1 = 0$ or

ابحث تحقق مبرهنة رول للدالة التالية وان تحققت جد قيمة c

2012 خارج القطر

$$f(x) = 2x + \frac{2}{x}, \quad x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$$

الحل :-

(أ) الدالة مستمرة على الفترة $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ لان الفترة تقع ضمن مجالها $R \setminus \{0\}$

$$\text{let } a \in \left[\frac{1}{2}, 2\right] \Rightarrow f(a) = 2a + \frac{2}{a} \in R \Rightarrow \text{الدالة معرفة}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2a + \frac{2}{a} \in R \Rightarrow \text{الغاية موجودة}$$

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow \text{الدالة مستمرة}$$

(ب) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ لان الفترة تقع ضمن مجالها $R \setminus \{0\}$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + 4 = 5, \quad f(2) = 4 + 1 = 5 \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = f(2) \quad (\Rightarrow)$$

$$f'(x) = 2 - \frac{2}{x^2}, \quad f'(c) = 0$$

$$2 - \frac{2}{c^2} = 0 \Rightarrow 2 = \frac{2}{c^2} \Rightarrow c^2 = 1 \Rightarrow c = 1 \in \left(\frac{1}{2}, 2\right) \text{ OR } c = -1 \notin \left(\frac{1}{2}, 2\right)$$

ابحث تحقق مبرهنة رول للدالة التالية وان تحققت جد قيمة c

2013 خارج القطر

$$f(x) = 9x + 3x^2 - x^3 : x \in [-1, 1]$$

الحل :-

(أ) الدالة مستمرة على الفترة $[-1, 1]$ لانها كثيرة حدود(ب) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(-1, 1)$ لانها كثيرة حدود .

$$f(1) = 9 + 3 - 1 = 11, \quad f(-1) = -9 + 3 + 1 = -5 \quad (\Rightarrow)$$

نظرية رول غير متحققة لعدم تحقق الشرط الثالث $\Rightarrow f(1) \neq f(-1)$ ابحث تحقق مبرهنة رول على الفترة $[-1, b]$ فإذا كانت

2014 خارج القطر

$$f(x) = ax^2 - 4x + 5, \quad c = 2, \quad c \in (-1, b), \quad a, b \in R \text{ فجد قيمتي } a, b$$

الحل | بما ان الدالة تحقق مبرهنة رول فان $f(-1) = f(b)$

$$f(-1) = a + 4 + 5 = a + 9, \quad f(b) = ab^2 - 4b + 5$$

$$ab^2 - 4b + 5 = a + 9 \quad (1)$$

$$f'(x) = 2ax - 4 \Rightarrow f'(c) = 0 \Rightarrow 2ac - 4 = 0 \Rightarrow 4a - 4 = 0 \Rightarrow a = 1 \text{ (in 1)}$$

$$b^2 - 4b + 5 = 1 + 9 \Rightarrow b^2 - 4b - 5 = 0 \Rightarrow (b - 5)(b + 1) = 0$$

$$\text{تھمل } b = 5 \text{ OR } b = -1$$

هل ان $f(x)$ تحقق مبرهنة رول على الفترة $[-1, 1]$ ؟ وان تحققت جد قيمة c

$$h(x) = x^3 - x$$

حيث ان $h(x) = x^3 - x$ الدالة مستمرة على الفترة $[-1, 1]$ لانها كثيرة حدود

(الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(-1, 1)$ لانها كثيرة حدود .

$$h(1) = 1 - 1 = 0, h(-1) = -1 + 1 = 0 \Rightarrow h(1) = h(-1) \quad (\text{ج})$$

$$h'(x) = 3x^2 - 1$$

$$h'(c) = 0 \Rightarrow 3c^2 - 1 = 0 \Rightarrow 3c^2 = 1 \Rightarrow c^2 = \frac{1}{3}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{3}} \in (-1, 1) \quad \text{OR} \quad c = -\frac{1}{\sqrt{3}} \in (-1, 1)$$

2014 دور 2

2016 دور 2 خارج

هل بالامكان تطبيق مبرهنة القيمة المتوسطة على الدالة $h(x) = x^2 - 4x + 5$

ضمن الفترة $[-1, 5]$

2014 دور 4 انبار

(الحل :- 1) الدالة مستمرة على الفترة $[-1, 5]$ لانها كثيرة حدود .

(2) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(-1, 5)$ لانها كثيرة حدود .

(3) يوجد على الاقل قيمة واحدة $c \in (a, b)$ وتحقق $h'(c) = \frac{h(b) - h(a)}{b - a}$

$$h'(x) = 2x - 4 \Rightarrow h'(c) = 2c - 4 \quad \text{ميل المماس}$$

$$\frac{h(b) - h(a)}{b - a} = \frac{h(5) - h(-1)}{5 - (-1)} = \frac{(25 - 20 + 5) - (1 + 4 + 5)}{6} = \frac{(10) - (10)}{6} = 0 \quad \text{ميل الوتر}$$

$$2c - 4 = 0 \Rightarrow 2c = 4 \Rightarrow c = 2 \in (-1, 5)$$

برهن ان الدالة $f(x) = x^2 - 6x + 4$ تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة وجد قيمة c على $[-1, 7]$

2014 دور 1

(الحل :- 1) الدالة مستمرة على الفترة $[-1, 7]$ لانها كثيرة حدود .

(2) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(-1, 7)$ لانها كثيرة حدود .

(3) يوجد على الاقل قيمة واحدة $c \in (a, b)$ وتحقق $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

$$f'(x) = 2x - 6 \Rightarrow f'(c) = 2c - 6 \quad \text{ميل المماس}$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(7) - f(-1)}{7 - (-1)} = \frac{(49 - 42 + 4) - (1 + 6 + 4)}{8} = \frac{(11) - (11)}{8} = 0 \quad \text{ميل الوتر}$$

ميل المماس = ميل الوتر

$$2c - 6 = 0 \Rightarrow 2c = 6 \Rightarrow c = 3 \in (-1, 7)$$

2015 دور 1

اذا كانت $f: [0, b] \Rightarrow \mathbb{R}$ ، وكانت f تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة

2014 تمميد في

2016 دور اول

عند $c = \frac{2}{3}$ ، جد قيمة b .

الحل :- بما ان الدالة تحقق شروط القيمة المتوسطة فانها مستمرة وقابلة للاشتقاق بالاضافة الى انها تحقق وجود

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ وتحقق } c \in (a, b) \text{ حيث قيمة واحدة على الاقل حيث}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 8x \Rightarrow f'(c) = 3c^2 - 8c \Rightarrow f'(\frac{2}{3}) = 3(\frac{2}{3})^2 - 8(\frac{2}{3}) = -4 \text{ ميل المماس}$$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(b) - f(0)}{b - 0} = \frac{(b^3 - 4b^2) - (0)}{b} = \frac{b^3 - 4b^2}{b} \text{ ميل الوتر}$$

ميل المماس = ميل الوتر

$$\frac{b^3 - 4b^2}{b} = -4 \Rightarrow b^3 - 4b^2 = -4b \Rightarrow b^3 - 4b^2 + 4b = 0$$

$$b(b^2 - 4b + 4) = 0 \Rightarrow b(b - 2)^2 = 0 \Rightarrow b = 0 \text{ يهمل OR } (b - 2)^2 = 0 \Rightarrow b = 2$$

اثبت ان الدالة $f(x) = (2 - x)^2$ حيث $x \in [0, 4]$ تحقق مبرهنة رول ثم جد قيمة (c) .

2015 تمميد في

الحل :- أ) الدالة مستمرة على الفترة $[0, 4]$ لانها كثيرة حدود

ب) الدالة قابلة للاشتقاق على الفترة $(0, 4)$ لانها كثيرة حدود .

$$f(0) = (2 - 0)^2 = 4 , f(4) = (2 - 4)^2 = 4 \Rightarrow f(0) = f(4) \text{ (ج)}$$

$$f'(x) = 2(2 - x)(-1) = -4 + 2x$$

$$f'(c) = 0 \Rightarrow -4 + 2c = 0 \Rightarrow 2c = 4 \Rightarrow c = 2 \in (0, 4)$$

مربع مساحته 50 cm^2 جد طول ضلعه بصورة تقريبية باستخدام التفاضلات .

1997 دور 2

$$A = m^2 \Rightarrow 50 = m^2 \Rightarrow m = \sqrt{50} \text{ (طول الضلع) = مساحة المربع}$$

$$m(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{let } a = 49 , b = 50 , h = b - a = 50 - 49 = 1 , m(a) = \sqrt{49} = 7$$

$$\Rightarrow m'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow m'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{49}} = \frac{1}{14} = 0.071$$

$$m(a + h) \approx m(a) + h \cdot m'(a) \Rightarrow m(48) \approx 7 + (1)(0.071) \approx 7 + 0.071 \approx 7.071 \text{ cm}$$

لتكن $f(x) = \sqrt[3]{2x+6}$ جد $f(1.02)$ بصورة تقريبية .

sol : $f(x) = \sqrt[3]{2x+6} = (2x+6)^{\frac{1}{3}}$

let $a = 1$, $b = 1.02$, $h = b - a = 0.02$, $f(a) = \sqrt[3]{8} = 2$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3}(2x+6)^{-\frac{2}{3}}(2) = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+6)^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2a+6)^2}} = \frac{2}{3(4)} = \frac{1}{6} = 0.16$

$f(a+h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(1.02) \approx 2 + (0.0032) \approx 2.0032$

1998 دور 2

2015 4 راحة

مخروط دائري قائم ارتفاعه يساوي نصف قطر قاعدته جد القيمة التقريبية لتغير حجمه اذا تغير ارتفاعه من 4 cm الى 4.01 cm باستخدام مفهوم التفاضلات .

2000 دور 1

الحل | نفرض ان نصف قطر قاعدة المخروط (r) والارتفاع y حيث ان $y = r$

$v = \frac{\pi}{3} r^2 y \Rightarrow v = \frac{\pi}{3} y^2 y \Rightarrow v_{(y)} = \frac{\pi}{3} y^3$

let $a = 4$, $b = 4.01$, $h = b - a = 0.01$

$v'_{(y)} = \pi y^2 \Rightarrow v'_{(a)} = \pi a^2 = \pi (4)^2 = 16\pi$

$h.v'(a) \approx (16\pi)(0.01) \approx 0.16\pi \text{ cm}^3$ القيمة التقريبية لتغير الحجم

جد باستخدام التفاضلات وبصورة تقريبية $\sqrt[3]{126}$

2001 دور 2

sol : $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$

let $a = 125$, $b = 126$, $h = b - a = 1$, $f(a) = \sqrt[3]{125} = 5$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{3\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{125^2}} = \frac{1}{75} = 0.013$

$f(a+h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(126) \approx 5 + (0.013)(1) \approx 5.013$

برنامج رحلتي في السادس

لتكن $f(x) = \sqrt{4x+5}$ جد $f(1.001)$ بصورة تقريبية .

2002 دور 2

$$f(x) = \sqrt{4x+5}$$

$$\text{let } a = 1, b = 1.001, h = b - a = 0.001, f(a) = \sqrt{4+5} = 3$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{4}{2\sqrt{4x+5}} = \frac{2}{\sqrt{4x+5}} \Rightarrow f'(a) = \frac{2}{\sqrt{4a+5}} = \frac{2}{\sqrt{4+5}} = \frac{2}{3} = 0.6$$

$$f(a+h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(1.001) \approx 3 + (0.001)(0.6) \approx 3.0006$$

جد باستخدام التفاضلات وبصورة تقريبية $\sqrt{99}$

2003 دور 1

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{let } a = 100, b = 99, h = b - a = 99 - 100 = -1, f(a) = \sqrt{100} = 10$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{100}} = \frac{1}{20} = 0.05$$

$$f(a+h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(99) \approx 10 + (-1)(0.05) \approx 9.95$$

لتكن $f(x) = \sqrt[3]{3x+5}$ جد $f(1.001)$ بصورة تقريبية باستخدام التفاضلات.

2004 دور 1

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt[3]{3x+5} = (3x+5)^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{let } a = 1, b = 1.001, h = b - a = 0.001, f(a) = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3}(3x+5)^{-\frac{2}{3}}(3) = \frac{3}{3^{\frac{2}{3}}(3x+5)^{\frac{2}{3}}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{\sqrt[3]{(3a+5)^2}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$f(a+h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(1.001) \approx 2 + (0.00025) \approx 2.0025$$

مربع مساحته 48 cm^2 جد بصورة تقريبية طول ضلعه .

2013 دور 1

$$A = m^2 \Rightarrow 48 = m^2 \Rightarrow m = \sqrt{48} \quad \text{لحل :- مساحة المربع} = (\text{طول الضلع})^2$$

$$m(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{let } a = 49, b = 48, h = b - a = 48 - 49 = -1, m(a) = \sqrt{49} = 7$$

$$\Rightarrow m'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow m'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{49}} = \frac{1}{14} = 0.071$$

$$m(a+h) \approx m(a) + h.m'(a) \Rightarrow m(48) \approx 7 + (-1)(0.071) \approx 7 - 0.071 \approx 6.929 \text{ cm}$$

باستخدام مفهوم التفاضلات جد حجم كرة طول نصف قطرها 2.99 cm بصورة تقريبية .

2005 دور 1

الحل :- حجم الكرة = $\frac{4\pi}{3}(\text{نصف القطر})^3$

$$V = \frac{4\pi}{3} (2.99)^3$$

$$V(x) = \frac{4\pi}{3} x^3$$

$$a = 3, b = 2.99, h = b - a = -0.01, v(a) = \frac{4\pi}{3} (3)^3 = 36\pi$$

$$V'(x) = 4\pi x^2 \Rightarrow V'(a) = 4\pi a^2 = 4\pi (3)^2 = 36\pi$$

$$v(a+h) \approx v(a) + h.v'(a) \approx 36\pi + (-0.01)(36\pi) \approx 35.64\pi \text{ cm}^3$$

جد حجم كرة طول نصف قطرها 3.001 cm بصورة تقريبية باستخدام مفهوم التفاضلات

الحل :- حجم الكرة = $\frac{4\pi}{3}(\text{نصف القطر})^3$

2006 تميمي

2016 دور 2

$$V = \frac{4\pi}{3} (3.001)^3$$

$$V(x) = \frac{4\pi}{3} x^3$$

$$a = 3, b = 3.001, h = b - a = 0.001, v(a) = \frac{4\pi}{3} (3)^3 = 36\pi$$

$$V'(x) = 4\pi x^2 \Rightarrow V'(a) = 4\pi a^2 = 4\pi (3)^2 = 36\pi$$

$$v(a+h) \approx v(a) + h.v'(a) \approx 36\pi + (0.001)(36\pi) \approx 36.036\pi \text{ cm}^3$$

ملاحظة || يمكن للطالب ان يستخرج $(3.001)^3$ عن طريق التعامل مع الدالة $f(x) = x^3$ لينتج ان

$f(a+h) = 27.027$ ومن ثم يكتب قانون حجم الكرة ويكون الجواب النهائي له

$v = \frac{4\pi}{3} (27.027) = 36.036\pi$ ويفضل الابتعاد عن هذا النوع من الحلول رغم صحتها العلمية .

'تكن $f(x) = \sqrt{3x+1}$ جد $f(1.001)$ بصورة تقريبية .

2005 دور 2

$$f(x) = \sqrt{3x+1}$$

$$\text{let } a = 1, b = 1.001, h = b - a = 0.001, f(a) = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}} \Rightarrow f'(a) = \frac{3}{2\sqrt{3+1}} = \frac{3}{2\sqrt{4}} = \frac{3}{4} = 0.75$$

$$f(a+h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(1.001) \approx 2 + (0.001)(0.75) \approx 2.00075$$

جد التقريبية للعدد $\sqrt[3]{26}$ باستخدام التفاضلات .

2008 دور 2

2016 تمميد

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{let } a = 27, b = 26, h = b - a = -1, f(a) = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{3\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{27^2}} = \frac{1}{27} = 0.037$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h \cdot f'(a) \Rightarrow f(26) \approx 3 + (0.037)(-1) \approx 3 - 0.037 \approx 2.963$$

باستخدام التفاضلات جد القيمة التقريبية للعدد $\sqrt[3]{-9}$

2006 دور 2

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{let } a = -8, b = -9, h = b - a = -9 + 8 = -1, f(a) = \sqrt[3]{-8} = -2$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{3\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{(-8)^2}} = \frac{1}{12} = 0.083$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h \cdot f'(a) \Rightarrow f(-9) \approx -2 + (0.083)(-1) \approx -2 - 0.083 \approx -2.083$$

جد بصورة تقريبية وباستخدام مفهوم التفاضلات طول ضلع مربع مساحته 101 cm^2

2007 دور 1

$$\text{الحل :- مساحة المربع} = (\text{طول الضلع})^2 \quad A = m^2 \Rightarrow 101 = m^2 \Rightarrow m = \sqrt{101}$$

$$m(x) = \sqrt{x}$$

$$\text{let } a = 100, b = 101, h = b - a = 101 - 100 = 1, m(a) = \sqrt{100} = 10$$

$$\Rightarrow m'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow m'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{100}} = \frac{1}{20} = 0.05$$

$$m(a + h) \approx m(a) + h \cdot m'(a) \Rightarrow m(101) \approx 10 + (1)(0.05) \approx 10 + 0.05 \approx 10.05 \text{ cm}$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

92

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد بصورة تقريبية باستخدام مفهوم التفاضلات $\sqrt{143}$

2008 تمهيدي

sol : $f(x) = \sqrt{x}$

let $a = 144$, $b = 143$, $h = b - a = 143 - 144 = -1$, $f(a) = \sqrt{144} = 12$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{144}} = \frac{1}{24} \approx 0.04$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(143) \approx 12 + (-1)(0.04) \approx 11.96$$

جد بصورة تقريبية باستخدام مفهوم التفاضلات $\sqrt{0.98}$

2008 دور 1

sol : $f(x) = \sqrt{x}$

let $a = 1$, $b = 0.98$, $h = b - a = -0.02$, $f(a) = \sqrt{1} = 1$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(0.98) \approx 1 + (-0.02)(0.5) \approx 1 - 0.01 \approx 0.99$$

جد بصورة تقريبية باستخدام مفهوم التفاضلات $\sqrt[4]{13.86}$

2008 دور 2 خارج

sol : $f(x) = \sqrt[4]{x} = x^{\frac{1}{4}}$

let $a = 16$, $b = 13.86$, $h = b - a = -2.14$, $f(a) = \sqrt[4]{16} = 2$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{4\sqrt[4]{a^3}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{16^3}} = \frac{1}{32} \approx 0.031$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(13.86) \approx 2 + (-2.14)(0.031) \approx 1.9347$$

تأكيد !! ان h في هذا السؤال كبيرة جدا قياسا بأصل العدد وعليه ستكون هذه النتيجة بعيدة بعض الشيء عن الواقع

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

93

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد بصورة تقريبية باستخدام مفهوم التفاضلات $\sqrt[3]{25.97}$

2013 دور 1

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{let } a = 27, b = 25.97, h = b - a = -1.03, f(a) = \sqrt[3]{27} = 3$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{3\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{27^2}} = \frac{1}{27} \approx 0.04$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(25.97) \approx 3 + (-0.0412) \approx 2.9588$$

جد بصورة تقريبية باستخدام مفهوم التفاضلات $\sqrt{15-1}$

2009 تمهيدي

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt{x-1} = x^{\frac{-1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\text{let } a = 16, b = 15, h = b - a = -1, f(a) = \frac{1}{\sqrt{16}} = 0.25$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}} \Rightarrow f'(a) = \frac{-1}{2\sqrt{a^3}} = \frac{-1}{2\sqrt{16^3}} = \frac{-1}{128} \approx -0.007$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(15) \approx 0.25 + (-0.007) \approx 0.257$$

جد بصورة تقريبية باستخدام مفهوم التفاضلات $\sqrt[4]{0.008}$

2009 دور 1

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt[4]{x} = x^{\frac{1}{4}}$$

$$\text{let } a = 0.0081, b = 0.0080, h = b - a = -0.0001, f(a) = \sqrt[4]{0.0081} = 0.3$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{4\sqrt[4]{a^3}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{(0.0081)^3}} = \frac{1}{0.108} \approx 9$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(0.008) \approx 0.3 + (-0.0009) \approx 0.2991$$

برنامج رحلتي في السادس

مكعب حجمه 124 cm^3 جد وباستخدام التفاضلات وبصورة تقريبية طول ضلعه

الحل :- حجم المكعب = (طول الضلع)³

2010 تمهيدي

$$V(m) = m^3 \Rightarrow 124 = m^3 \Rightarrow m = \sqrt[3]{124}$$

$$m(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{let } a = 125, b = 124, h = b - a = -1, m(a) = \sqrt[3]{125} = 5$$

$$\Rightarrow m'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{3\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{125^2}} = \frac{1}{75} = 0.013$$

$$m(a + h) = m(a) + h.m'(a) \Rightarrow m(124) \approx 5 + (0.013)(-1) \approx 5 - 0.013 \approx 4.987$$

استخدام مبرهنة القيمة المتوسطة جد بصورة تقريبية $\sqrt[3]{7.8}$

2011 دور 1

sol : $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$

$$\text{let } a = 8, b = 7.8, h = b - a = 7.8 - 8 = -0.2, f(a) = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{3\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{8^2}} = \frac{1}{12} = 0.083$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(7.8) \approx 2 + (0.083)(-0.2) \approx 2 - 0.0166 \approx 1.9834$$

باستخدام نتيجة القيمة المتوسطة جد القيمة التقريبية $\sqrt[3]{7.9}$

2015 نانعين 1 ، 2015 دور 3

استخدام مبرهنة القيمة المتوسطة جد بصورة تقريبية $\sqrt[3]{63}$

2012 تمهيدي

sol : $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$

$$\text{let } a = 64, b = 63, h = b - a = 63 - 64 = -1, f(a) = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{3\sqrt[3]{a^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{64^2}} = \frac{1}{48} = 0.0208$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(63) \approx 4 + (0.0208)(-1) \approx 4 - 0.0208 \approx 3.9792$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

95

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2012 دور 2

باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة جد بصورة تقريبية $\sqrt{\frac{1}{2}}$

sol : $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

let $a = 0.49$, $b = 0.50$, $h = b - a = 0.50 - 0.49 = 0.01$, $f(a) = \sqrt{0.49} = 0.7$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{0.49}} = \frac{1}{1.4} = 0.7142$

$f(a + h) = f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(0.5) \approx 0.7 + (0.7142)(0.01) \approx 0.7 + 0.0071 \approx 0.7071$

إذا علمت ان $f(x) = \sqrt[5]{31x + 1}$ جد بصورة تقريبية $f(1.01)$ باستخدام نتيجة القيمة المتوسطة .

2013 دور 1

sol : $f(x) = \sqrt[5]{31x + 1} = (31x + 1)^{\frac{1}{5}}$

$a = 1$, $b = 1.01$, $h = b - a = 0.01$, $f(a) = \sqrt[5]{32} = 2$

$f'(x) = \frac{1}{5} (31x + 1)^{-\frac{4}{5}} (31) = \frac{31}{5\sqrt[5]{(31x+1)^4}}$

$f'(a) = \frac{31}{5\sqrt[5]{(31+1)^4}} = \frac{31}{80} = 0.3875 \approx 0.39$

$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(1.01) \approx 2 + (0.0039) \approx 2.0039$

مخروط دائري قائم حجمه $210\pi \text{ cm}^3$ جد القيمة التقريبية لنصف قطر قاعدته إذا كان ارتفاعه 10cm .

2013 دور 2

1999 دور 1

الحل \ نفرض ان نصف قطر قاعدة المخروط (r)

$v = \frac{\pi}{3} r^2 h \Rightarrow 210\pi = \frac{\pi}{3} r^2 (10) \Rightarrow r^2 = 63 \Rightarrow r = \sqrt{63}$

$r(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$

let $a = 64$, $b = 63$, $h = b - a = 63 - 64 = -1$, $r(a) = \sqrt{64} = 8$

$\Rightarrow r'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow r'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{64}} = \frac{1}{16} = 0.0625$

$r(a + h) \approx r(a) + h.r'(a) \Rightarrow r(63) \approx 8 - (0.0625) \approx 7.9375$

Mob: 07902162268

96

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

2014 تمهيدي

2011 خارج القطر

جد وبصورة تقريبية باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة $\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$

$$\text{sol : } f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = x^{-\frac{1}{3}}$$

$$\text{let } a = 8, b = 9, h = b - a = 9 - 8 = 1, f(a) = \frac{1}{\sqrt[3]{8}} = 0.5$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{3}x^{-\frac{4}{3}} = \frac{-1}{3\sqrt[3]{x^4}} \Rightarrow f'(a) = \frac{-1}{3\sqrt[3]{8^4}} = \frac{-1}{3\sqrt[3]{8^4}} = \frac{-1}{48} = -0.0208$$

$$f(a + h) = f(a) + h \cdot f'(a) \Rightarrow f(9) \approx 0.5 + (-0.0208)(1) \approx 0.5 - 0.0208 \approx 0.4792$$

رصة نصف قطرها 6cm طليت بطلاء سمكه 0.1cm جد كمية الطلاء بصورة تقريبية باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة .

2014 دور 1

الحل :- حجم الكرة $= \frac{4\pi}{3} (\text{نصف القطر})^3$

$$V = \frac{4\pi}{3} (6.1)^3$$

$$V(x) = \frac{4\pi}{3} x^3$$

$$a = 6, b = 6.1, h = b - a = 6.1 - 6 = 0.1$$

$$V'(x) = 4\pi x^2 \Rightarrow V'(a) = 4\pi a^2 = 4\pi (6)^2 = 144\pi$$

$$h \cdot v'(a) = (0.1)(144\pi) = 14.4\pi \text{ cm}^3 \text{ (كمية الطلاء)}$$

باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة جد حجم مخروط دائري قائم بصورة تقريبية ، علما طول قطر قاعدته يساوي ارتفاعه ويساوي 3.99 cm

2015 دور 1

الحل :- حجم المخروط $= \frac{1}{3} \text{ مساحة القاعدة} \times \text{الارتفاع} = \frac{\pi}{3} (\text{نصف القطر})^2 \times \text{الارتفاع}$

$$v = \frac{\pi}{3} r^2 y, \because y = 2r \Rightarrow r = \frac{1}{2}y \Rightarrow v(y) = \frac{\pi}{12} y^3$$

$$a = 4, b = 3.99, h = b - a = 3.99 - 4 = -0.01, v(a) = \frac{\pi}{12} (4)^3 = \frac{64}{12} \pi = 5.33\pi$$

$$v'(y) = \frac{\pi}{4} y^2 \Rightarrow v'(a) = \frac{\pi}{4} a^2 = \frac{\pi}{4} (4)^2 = 4\pi$$

$$v(a + h) = v(a) + h \cdot v'(a) \Rightarrow v(3.99) = 5.3\pi + (4\pi)(-0.01) \\ = 5.33\pi - 0.04\pi = 5.29\pi \text{ cm}^3$$

تأكيد || بما ان الارتفاع يساوي طول القطر فإن طول نصف القطر يساوي 1.995 ويمكن ان نجعل القانون بدلالة

$$\text{نصف القطر بالشكل التالي } v = \frac{2\pi}{3} r^3 \Rightarrow v = \frac{\pi}{3} r^2 (2r) \Rightarrow v = \frac{\pi}{3} r^2 y \text{ عندها ستكون قيمة } a = 2$$

Mob: 07902162268

97

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

2015 خارج 1

باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة جد القيمة التقريبية $2 + 3(1.01)^{\frac{1}{3}} + (1.01)^5$

sol : $f(x) = x^5 + 3\sqrt[3]{x} + 2 = x^5 + 3x^{\frac{1}{3}} + 2$

let $a = 1$, $b = 1.01$, $h = b - a = 0.01$, $f(a) = 1 + 3 + 2 = 6$

$$\Rightarrow f'(x) = 5x^4 + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow f'(a) = 5a^4 + \frac{1}{\sqrt[3]{a^2}} = 5 + 1 = 6$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(1.01) \approx 6 + (0.01)(6) \approx 6 + 0.06 \approx 6.06$$

2015 دور 2

اذا كان $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ جد مقدار التغير التقريبي للدالة اذا تغيرت x من 4 الى 4.01

sol : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$

let $a = 4$, $b = 4.01$, $h = b - a = 4.01 - 4 = 0.01$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}} \Rightarrow f'(a) = \frac{-1}{2\sqrt{64}} = \frac{-1}{16} = -0.0625$$

مقدار التغير التقريبي $h.f'(a) \approx (0.01) \cdot (-0.0625) \approx -0.000625$

2015 دور 2 خارج

لتكن $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ فاذا تغيرت x من 125 الى 125.06 فما مقدار التغير التقريبي للدالة ؟

sol : $f(x) = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$

let $a = 125$, $b = 125.06$, $h = b - a = 125.06 - 125 = 0.06$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \Rightarrow f'(a) = \frac{2}{3\sqrt[3]{125}} = \frac{2}{15} = 0.1333$$

مقدار التغير التقريبي $h.f'(a) \approx (0.06) \cdot (0.1333) \approx 0.008$

قصي هاشم التميمي

2016 دور 1 في

جد بصورة تقريبية باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة $\sqrt{80} - \sqrt[4]{80}$

$$\text{sol : } f(x) = \sqrt{x} - \sqrt[4]{x} = x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{1}{4}}$$

$$\text{let } a = 81, b = 80, h = b - a = -1, f(a) = \sqrt{81} - \sqrt[4]{81} = 9 - 3 = 6$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$$

$$f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{81}} - \frac{1}{4\sqrt[4]{81^3}} = \frac{1}{18} - \frac{1}{108} = \frac{5}{108} \approx 0.046$$

$$f(a + h) \approx f(a) + h.f'(a) \Rightarrow f(81) \approx 6 + (-0.046) \approx 5.954$$

التقييم || السؤال ذو فكرة منهجية رغم عدم وجوده بالنص في الكتاب المنهجي وهو مقارب لسؤال التمارين $\sqrt{63} + \sqrt[3]{63}$ ومقارب اكثر من مثال الكتاب $\sqrt{17} + \sqrt[4]{17}$ وهذه الافكار المركبة لم ترد في الاسئلة الوزارية السابقة .

تأكيد || لو كان السؤال السابق بالصورة $\sqrt{26} + \sqrt[3]{26}$ فلا يوجد عدد قريب من العدد 26 له جذر تربيعي وتكعيبي في نفس الوقت وعليه يجب حل كل جذر لوحده ثم نجمع النتائج النهائية ارجو الانتباه . علما ان السؤال السابق يمكن حله بنفس هذه الطريقة المشار اليها لكن الحل بجزء واحد يكون افضل .

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

99

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

حلول الاسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الثالث (اسئلة الثوابت ورسم الدوال)

1997 دور 1

باستخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذي الافقي $y = 1$ ، المحاذي العمودي (لا يوجد)

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = -1, \text{ if } y = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, -1), (1, 0), (-1, 0)$

④ التناظر

$$\forall x \in R, \exists (-x) \in R$$

$$f(-x) = \frac{(-x)^2-1}{(-x)^2+1} = \frac{x^2-1}{x^2+1} = f(x) \Rightarrow \text{المنحنى متناظر حول محور الصادات}$$

⑤ النهايات

$$f'(x) = \frac{(x^2+1)(2x) - (x^2-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^3+2x-2x^3+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2} = 0$$

$$4x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -1 \Rightarrow (0, -1) \text{ نقطة حرجة}$$

$$x < 0 \quad x > 0$$

----- (0) ++++++ اشارة المشتقة الاولى

الدالة متزايدة بالفترة $\{x : x \in R; x > 0\}$

الدالة متناقصة بالفترة $\{x : x \in R; x < 0\}$

نقطة نهاية صغرى محلية $(0, -1)$

$$f''(x) = \frac{(x^2+1)^2 \cdot 4 - 4x \cdot 2(x^2+1) \cdot 2x}{(x^2+1)^4} = \frac{4(x^2+1)^2 - 16x^2(x^2+1)}{(x^2+1)^4}$$

$$f''(x) = \frac{(x^2+1)[4(x^2+1) - 16x^2]}{(x^2+1)^4} = \frac{4x^2+4-16x^2}{(x^2+1)^3} = \frac{4-12x^2}{(x^2+1)^3} = 0$$

$$4 - 12x^2 = 0 \Rightarrow 12x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$


$$y = \frac{\frac{1}{3}-1}{\frac{1}{3}+1} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{2}\right) \text{ نقاط انقلاب مرشحة}$$

----- $(-\frac{1}{\sqrt{3}}) ++++++ (\frac{1}{\sqrt{3}})$ ----- اشارة المشتقة الثانية

الدالة محدبة بالفترتين $\{x : x \in R; x > \frac{1}{\sqrt{3}}\}, \{x : x \in R; x < -\frac{1}{\sqrt{3}}\}$

الدالة مقعرة بالفترة $\{x : x \in R; x \in (-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})\}$

نقاط انقلاب $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{2}), (-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{2})$



Mob: 07902162268

100

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

باستخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = x^3 - 3x$

1999 دور 1

2006 تمصيدي

2007 دور 1

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 0, \text{ if } y = 0 \Rightarrow x^3 - 3x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 3) = 0 \\ \Rightarrow x = 0 \text{ OR } x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm \sqrt{3}$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 0), (\sqrt{3}, 0), (-\sqrt{3}, 0)$

④ التناظر $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -f(x)$$

\Rightarrow المنحنى متناظر حول نقطة الاصل

⑤ النهايات

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = -2 \text{ OR } x = -1 \Rightarrow f(-1) = 2$$

نقاط حرجية $(1, -2), (-1, 2)$

$$x < -1 \quad (-1, 1) \quad x > 1$$

+++++ -1 ----- (1) +++++ إشارة المشتقة الاولى

{ $x : x \in R ; x > 1$ } الدالة متزايدة بالفترة

{ $x : x \in R ; x < -1$ } الدالة متزايدة بالفترة

{ $x : x \in R ; x \in (-1, 1)$ } الدالة متناقصة بالفترة

نهاية صغرى $(1, -2)$, نهاية عظمى $(-1, 2)$

$$f''(x) = 6x \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$f(0) = 0 \Rightarrow (0, 0)$ نقطة انقلاب مرشحة


$$x < 0 \quad x > 0$$

----- 0+++++ إشارة المشتقة الثانية

{ $x : x \in R ; x < 0$ } الدالة محدبة بالفترة

{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة مقعرة بالفترة

(0, 0) نقطة انقلاب



Mob: 07902162268

101

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = x^5$

2000 حور 1

2006 حور 2

2008 تمسحي

2007 حار

القطر

2013 حور 3

2014 تمسحي

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

تأكيد !! بعض الاسئلة الوزارية كانت

 $F(x) = x^3$ ويكون له نفس الحلif $x = 0 \Rightarrow y = 0$, if $y = 0 \Rightarrow x = 0$ نقطة التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 0)$ ① التناظر $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$ المنحنى متناظر حول نقطة الاصل $f(-x) = (-x)^5 = - (x)^5 = -f(x) \Rightarrow$



⑤ النهايات

 $f'(x) = 5x^4 \Rightarrow 5x^4 = 0 \Rightarrow x = 0$ نقطة حرجة $f(0) = 0 \Rightarrow (0, 0)$ $x < 0$ $x > 0$

+++++ 0 +++++ اشاراة المشتقة الاولى

{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x < 0$ } الدالة متزايدة بالفترةمجرد نقطة حرجة $(0, 0)$ $f''(x) = 20x^3 \Rightarrow 20x^3 = 0 \Rightarrow x = 0$ نقطة انقلاب مرشحة $f(0) = 0 \Rightarrow (0, 0)$ $x < 0$ $x > 0$

----- 0 +++++ اشاراة المشتقة الثانية

{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة مقعرة بالفترة{ $x : x \in R ; x < 0$ } الدالة محدبة بالفترةنقطة انقلاب $(0, 0)$ 

2000 دور 2

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = (x^2 - 1)^2$

sol : $f(x) = (x^2 - 1)^2 = x^4 - 2x^2 + 1$

① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

if $x = 0 \Rightarrow y = 1$, if $y = 0 \Rightarrow (x^2 - 1)^2 = 0 \Rightarrow (x^2 - 1) = 0$

$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(1, 0)$

④ التناظر

$\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = x^4 - 2x^2 + 1 = f(x) \Rightarrow$ المنحنى متناظر حول محور الصادات

⑤ النهايات

$f'(x) = 4x^3 - 4x \Rightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Rightarrow 4x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow$

$x = 0 \Rightarrow f(0) = 1$ OR $x = 1 \Rightarrow f(1) = 0$ OR $x = -1 \Rightarrow f(-1) = 0$

نقاط حرجة $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(1, 0)$

$x < -1$ $(-1, 0)$ $(0, 1)$ $x > 1$

-----(-1)+++++(0)----- (1)+++++

اشارة المشتقة الاولى

$\{x : x \in R ; x > 1\}$ الدالة متزايدة بالفترة

$\{x : x \in R ; x < -1\}$ الدالة متناقصة بالفترة

$\{x : x \in R ; x \in (-1, 0)\}$ الدالة متزايدة بالفترة

$\{x : x \in R ; x \in (0, 1)\}$ الدالة متناقصة بالفترة

نهاية عظمى $(0, 1)$, نهاية صغرى $(1, 0)$, نهاية صغرى $(-1, 0)$

$f''(x) = 12x^2 - 4 = 0 \Rightarrow 12x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$

$f(\frac{1}{\sqrt{3}}) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{4}{9}$, $f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{4}{9}$


$\Rightarrow (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{9})$, $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{9})$ نقطة انقلاب مرشحة

+++++ $(-\frac{1}{\sqrt{3}})$ ----- $(\frac{1}{\sqrt{3}})$ +++++ اشارة المشتقة الثانية

$\{x : x \in R ; x > \frac{1}{\sqrt{3}}\}$, $\{x : x \in R ; x < -\frac{1}{\sqrt{3}}\}$ الدالة مقعرة بالفترتين

$\{x : x \in R ; x \in (-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})\}$ الدالة محدبة بالفترة

نقاط انقلاب $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{9})$, $(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{4}{9})$



Mob: 07902162268

103

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = x^3 + 3x^2$

2001 دور 2

① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 0, \text{ if } y = 0 \Rightarrow x^3 + 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x+3) = 0$$

$$x^2 = 0 \Rightarrow x = 0, x = -3$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 0)$, $(-3, 0)$

④ التناظر

$$\forall x \in R, \exists (-x) \in R$$

$$f(-x) = (-x)^3 + 3(-x)^2 = -x^3 + 3x^2 = -(x^3 - 3x^2) \neq -f(x) \text{ لا يوجد تناظر}$$


⑤ النهايات

$$f'(x) = 3x^2 + 6x \Rightarrow 3x^2 + 6x = 0 \Rightarrow 3x(x+2) = 0$$

$$\text{either } x = 0 \Rightarrow f(0) = 0, \text{ or } x = -2 \Rightarrow f(-2) = -8 + 12 = 4$$

نقاط حرجية $(0, 0)$, $(-2, 4)$

$$x < -2 \quad (-2, 0) \quad x > 0$$




اشارة المشتقة الاولى

{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x < -2$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x \in (-2, 0)$ } الدالة متناقصة بالفترةنهاية صغرى $(0, 0)$, نهاية عظمى $(-2, 4)$


$$f''(x) = 6x + 6 \Rightarrow 6x + 6 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$f(-1) = 2 \Rightarrow (-1, 2) \text{ نقطة انقلاب مرشحة}$$

$$x < 0 \quad x > 0$$



اشارة المشتقة الثانية

{ $x : x \in R ; x < -1$ } الدالة محدبة بالفترة{ $x : x \in R ; x > -1$ } الدالة مقعرة بالفترةنقطة انقلاب $(-1, 2)$ 

باستخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = x^2 - 2x - 3$

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحانيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = -3, \text{ if } y = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 3 \text{ OR } x = -1$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, -3), (3, 0), (-1, 0)$

④ التناظر $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$$f(-x) = (-x)^2 - 2(-x) - 3 = x^2 + 2x - 3 \neq -f(x) \Rightarrow \text{لا يوجد تناظر}$$

⑤ النهايات

$$f'(x) = 2x - 2 \Rightarrow 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$$

نقطة حرجة $(1, -4)$

$$x < -2 \quad x > -2$$

----- (1) ++++++ اشارة المشتقة الاولى



الدالة متزايدة بالفترة $\{x : x \in R ; x > 1\}$

الدالة متناقصة بالفترة $\{x : x \in R ; x < 1\}$

نقطة نهاية صغرى محلية $(1, -4)$

$$f''(x) = 2 > 0$$

الدالة مقعرة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب



استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = x^4 - 2x^2$

2005 تمهيدي

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 0, \text{ if } y = 0 \Rightarrow x^4 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$

نقاط التقاطع مع المحاورين الاحداثيين $(0, 0), (-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$

④ التناظر

$$\forall x \in R, \exists (-x) \in R$$

$$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x) \Rightarrow \text{المنحنى متناظر حول محور الصادات}$$

⑤ النهايات

$$f'(x) = 4x^3 - 4x \Rightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Rightarrow 4x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow$$

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 0 \text{ OR } x = 1 \Rightarrow f(1) = -1 \text{ OR } x = -1 \Rightarrow f(-1) = -1$$

نقاط حرجة $(0, 0), (-1, -1), (1, -1)$

$$x < -1 \quad (-1, 0) \quad (0, 1) \quad x > 1$$

$$\text{-----}(-1) \text{+++++}(0) \text{-----}(1) \text{+++++}$$

إشارة المشتقة الاولى

{ $x : x \in R ; x > 1$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x < -1$ } الدالة متناقصة بالفترة{ $x : x \in R ; x \in (-1, 0)$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x \in (0, 1)$ } الدالة متناقصة بالفترةنهاية عظمى $(0, 0)$, نهاية صغرى $(1, -1)$, نهاية صغرى $(-1, -1)$


$$f''(x) = 12x^2 - 4 = 0 \Rightarrow 12x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = \frac{-5}{9}, \quad f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{9} - \frac{2}{3} = \frac{-5}{9}$$

نقطة انقلاب مرشحة $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{9}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{9}\right)$

$$\text{+++++} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{-----} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{+++++}$$

إشارة المشتقة الثانية

{ $x : x \in R ; x > \frac{1}{\sqrt{3}}$ }, { $x : x \in R ; x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$ } الدالة مقعرة بالفترتين{ $x : x \in R ; x \in \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ } الدالة محدبة بالفترةنقاط انقلاب $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{9}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{9}\right)$ 

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = (x+2)(x-1)^2$

2005 دور 1

2008 دور 1

sol : ① اوسع مجال للدالة \mathbb{R}

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

if $x = 0 \Rightarrow y = 2$, if $y = 0 \Rightarrow (x+2)(x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = -2$ OR $x = 1$
 نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 2)$, $(-2, 0)$, $(1, 0)$

④ التناظر $\forall x \in \mathbb{R}, \exists (-x) \in \mathbb{R}$

$f(-x) = (-x+2)(-x-1)^2 = -(x-2)(-x-1)^2 \neq -f(x) \Rightarrow$ لا يوجد تناظر

⑤ النهايات

$$f(x) = (x+2)(x-1)^2 = (x+2)(x^2 - 2x + 1)$$

$$f'(x) = (x+2)(2x-2) + (x^2 - 2x + 1)(1) = 2x^2 - 2x + 4x - 4 + x^2 - 2x + 1$$

$$= 3x^2 - 3 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 0 \text{ OR } x = -1 \Rightarrow f(-1) = 4$$

نقاط حرجية $(1, 0)$, $(-1, 4)$

$$x < -1 \quad (-1, 1) \quad x > 1$$

+++++ -1 - - - - 1 ++++++

اشارة المشتقة الاولى

{ $x : x \in \mathbb{R}; x > 1$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in \mathbb{R}; x < -1$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in \mathbb{R}; x \in (-1, 1)$ } الدالة متناقصة بالفترةنهاية صفرى $(1, 0)$, نهاية عظمى $(-1, 4)$

$$f''(x) = 6x \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$f(0) = 2 \Rightarrow (0, 2) \text{ نقطة انقلاب مرشحة}$$

$$x < 0 \quad x > 0$$

----- 0 ++++++

اشارة المشتقة الثانية

{ $x : x \in \mathbb{R}; x > 0$ } الدالة مقعرة بالفترة{ $x : x \in \mathbb{R}; x < 0$ } الدالة محدبة بالفترة

(0, 2) نقطة انقلاب

+++++ (-1) - - - - 1 ++++++

----- 0 ++++++

+++++ ++++++

+++++ ++++++

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = x^3 - 3x + 2$ sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

if $x = 0 \Rightarrow y = 2$, if $y = 0 \Rightarrow x^3 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x+2)(x-1)^2 = 0$
 $\Rightarrow x = -2$ OR $x = 1 \Rightarrow (0, 2), (-2, 0), (1, 0)$ نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين

④ التناظر $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) + 2 = -x^3 + 3x + 2 = -(x^3 - 3x - 2) \neq -f(x)$$

 \Rightarrow المنحنى غير متناظر حول نقطة الاصل ولا حول محور الصادات


⑤ النهايات

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 0 \text{ OR } x = -1 \Rightarrow f(-1) = 4$$

نقاط حرجية $(1, 0), (-1, 4)$

$$x < -1 \quad (-1, 1) \quad x > 1$$




اشارة المشتقة الاولى

{ $x : x \in R ; x > 1$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x < -1$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x \in (-1, 1)$ } الدالة متناقصة بالفترةنهاية صغرى $(1, 0)$, نهاية عظمى $(-1, 4)$


$$f''(x) = 6x \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow x = 0$$

نقطة انقلاب مرشحة $(0, 2)$

$$x < 0 \quad x > 0$$



اشارة المشتقة الثانية

{ $x : x \in R ; x < 0$ } الدالة محدبة بالفترة{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة مقعرة بالفترةنقطة انقلاب $(0, 2)$ 

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = \frac{1}{x+1}$

2009 تمميدى

2014 خارج الخطر

sol : ① $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow \mathbb{R} / \{-1\}$ اوسع مجال للدالة

② $x = -1$ المحاذي العمودي ، $y = 0$ المحاذي الافقي

③ نقاط التقاطع

غير ممكن $\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 1$, $\text{if } y = 0$

نقطة التقاطع مع محور الصادات $(0, 1)$

④ التناظر


بما ان العدد (1) ينتمي الى مجال الدالة لكن العدد (-1) لا ينتمي لها فالمنحنى غير متناظر
لا مع محور الصادات ولا مع نقطة الاصل

⑤ النهايات

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2} \neq 0$$

$$x < -1 \quad x > -1$$

أي انه لا توجد نقاط حرجة




اشارة المشتقة الاولى

الدالة متناقصة بالفترتين $\{x : x \in \mathbb{R} ; x > -1\}$
 $\{x : x \in \mathbb{R} ; x < -1\}$

$$f''(x) = \frac{(x+1)^2 \cdot (0) + 1 [2(x+1)]}{(x+1)^4} = \frac{2}{(x+1)^3} \neq 0$$



أي انه لا توجد نقاط انقلاب

$$x < -1 \quad x > -1$$



اشارة المشتقة الثانية

الدالة مقعرة بالفتره $\{x : x \in \mathbb{R} ; x > -1\}$
الدالة محدبة بالفتره $\{x : x \in \mathbb{R} ; x < -1\}$



استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = 6x - 2x^3$

2011 دور 1

2015 دور 3

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لاتوجد ③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 0, \text{ if } y = 0 \Rightarrow 6x - 2x^3 = 0 \Rightarrow 2x(3 - x^2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \text{ OR } x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm \sqrt{3}$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 0), (\sqrt{3}, 0), (-\sqrt{3}, 0)$

④ التناظر

$$f(-x) = 6(-x) - 2(-x)^3 = -6x + 2x^3 = -(6x - 2x^3) = -f(x) \Rightarrow \text{المنحنى متناظر حول نقطة الاصل}$$

⑤ النهايات

$$f'(x) = 6 - 6x^2 \Rightarrow 6 - 6x^2 = 0 \Rightarrow 6x^2 = 6 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 4 \text{ OR } x = -1 \Rightarrow f(-1) = -4$$

نقاط حرجية $(1, 4), (-1, -4)$

$$x < -1 \quad (-1, 1) \quad x > 1$$

اشارة المشتقة الاولى



{ $x : x \in R ; x > 1$ } الدالة متناقصة بالفترة{ $x : x \in R ; x < -1$ } الدالة متناقصة بالفترة{ $x : x \in R ; x \in (-1, 1)$ } الدالة متزايدة بالفترةنهاية صغرى $(-1, -4)$, نهاية عظمى $(1, 4)$

$$f''(x) = -12x \Rightarrow -12x = 0 \Rightarrow x = 0$$

نقطة انقلاب مرشحة $f(0) = 0 \Rightarrow (0, 0)$

$$x < 0 \quad x > 0$$

اشارة المشتقة الثانية

{ $x : x \in R ; x < 0$ } الدالة مقعرة بالفترة{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة محدبة بالفترةنقطة انقلاب $(0, 0)$ 

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = (1 - x)^3 + 1$

2011 دور 2

2013 دور 2

2016 تمهيدي

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

بالجذر التكعيبي $\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 2$, $\text{if } y = 0 \Rightarrow (1 - x)^3 + 1 = 0 \Rightarrow (1 - x)^3 = -1$

$$1 - x = -1 \Rightarrow x = 2$$

نقطتي التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 2)$, $(2, 0)$

④ التناظر

لا يوجد تناظر $f(-x) = (1 + x)^3 + 1 = - [(-1-x)^3 - 1] \neq -f(x)$

⑤ النهايات

$$f'(x) = 3(1 - x)^2 (-1) = -3(1 - x)^2 \Rightarrow 1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$$

نقطة حرجة $f(1) = 1 \Rightarrow (1, 1)$

$$x < 1 \quad x > 1$$

-----1----- إشارة المشتقة الاولى

$\{x : x \in \mathbb{R} ; x > 1\}$ الدالة متناقصة بالفترتين

$\{x : x \in \mathbb{R} ; x < 1\}$

مجرد نقطة حرجة $(1, 1)$

$$f''(x) = -6(1 - x)(-1) = 6(1 - x) \Rightarrow 6(1 - x) = 0$$

$$\Rightarrow 1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$$

نقطة انقلاب مرشحة $f(1) = 1 \Rightarrow (1, 1)$



$$x < 1 \quad x > 1$$

+++++1----- إشارة المشتقة الثانية

$\{x : x \in \mathbb{R} ; x < 1\}$ الدالة مقعرة بالفترة

$\{x : x \in \mathbb{R} ; x > 1\}$ الدالة محدبة بالفترة

نقطة انقلاب $(1, 1)$



استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = 2x^2 - x^4$

2012 دور 2

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 0, \text{ if } y = 0 \Rightarrow 2x^2 - x^4 = 0 \Rightarrow x^2(2 - x^2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 0), (-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$ ④ التناظر $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$$f(-x) = 2(-x)^2 - (-x)^4 = 2x^2 - x^4 = f(x) \Rightarrow \text{المنحنى متناظر حول محور الصادات}$$


⑤ النهايات

$$f'(x) = 4x - 4x^3 \Rightarrow 4x - 4x^3 = 0 \Rightarrow 4x(1 - x^2) = 0 \Rightarrow$$

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 0 \text{ OR } x = 1 \Rightarrow f(1) = 1 \text{ OR } x = -1 \Rightarrow f(-1) = 1$$

نقاط حرجة $(0, 0), (-1, 1), (1, 1)$

$$x < -1 \quad (-1, 0) \quad (0, 1) \quad x > 1$$



اشارة المشتقة الاولى

{x : x ∈ R ; x > 1} الدالة متناقصة بالفترة

{x : x ∈ R ; x < -1} الدالة متزايدة بالفترة

{x : x ∈ R ; x ∈ (-1, 0)} الدالة متناقصة بالفترة

{x : x ∈ R ; x ∈ (0, 1)} الدالة متزايدة بالفترة

نهاية صغرى (0, 0), نهاية عظمى (1, 1), نهاية عظمى (-1, 1)

$$f''(x) = 4 - 12x^2 = 0 \Rightarrow 12x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$


$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}, \quad f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

نقطة انقلاب مرشحة $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{5}{9}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{5}{9}\right)$

$$\text{اشارة المشتقة الثانية} \quad \text{-----} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{+++++++} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{-----}$$

{x : x ∈ R ; x > 1/√3}, {x : x ∈ R ; x < -1/√3} الدالة محدبة بالفترتين

{x : x ∈ R ; x ∈ (-1/√3, 1/√3)} الدالة مقعرة بالفترة

نقاط انقلاب $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{5}{9}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{5}{9}\right)$ 

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = \frac{1}{x}$

2012 تمهيدي

sol : ① اوسع مجال للدالة $R / \{0\}$ ② المحاذي الأفقي $y = 0$ ، المحاذي العمودي $x = 0$

③ نقاط التقاطع

if $x = 0 \Rightarrow y =$ غير معرف ، if $y = 0 \Rightarrow x =$ غير معرفلا توجد نقاط تقاطع مع المحورين الاحداثيين $x \neq 0$, $y \neq 0$ ④ التناظر $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$$f(-x) = \frac{1}{(-x)} = -\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$$

 \Rightarrow المنحنى متناظر حول نقطة الاصل

⑤ النهايات

$$f'(x) = \frac{(x)(0) - (1)(1)}{x^2} = \frac{-1}{x^2} \neq 0$$

أي انه لا توجد نقاط حرجة
اشارة المشتقة الاولى



الدالة متناقصة بالفترتين
 $\{x : x \in R ; x > 0\}$
 $\{x : x \in R ; x < 0\}$

$$f''(x) = \frac{x^2 \cdot (0) - (-1)(2x)}{x^4} = \frac{2}{x^3} \neq 0$$

أي انه لا توجد نقاط انقلاب

اشارة المشتقة الثانية

الدالة مقعرة بالفترة
 $\{x : x \in R ; x > 0\}$
الدالة محدبة بالفترة
 $\{x : x \in R ; x < 0\}$



2013 تمهيدي

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = 10 - 3x - x^2$

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحانيات لا توجد

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 10, \text{ if } y = 0 \Rightarrow 10 - 3x - x^2 = 0 \Rightarrow (2 - x)(5 + x) = 0$$

$$\Rightarrow x = -5 \text{ OR } x = 2$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, 10), (-5, 0), (2, 0)$ ④ التناظر $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$$f(-x) = 10 - 3(-x) - (-x)^2 = 10 + 3x - x^2 \neq -f(x) \Rightarrow \text{لا يوجد تناظر}$$

⑤ النهايات

$$f'(x) = -3 - 2x \Rightarrow -3 - 2x = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

$$f(-\frac{3}{2}) = 10 - 3(-\frac{3}{2}) - (-\frac{3}{2})^2 = 10 + \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{40+18-9}{4} = \frac{49}{4}$$



نقطة حرجة $(-\frac{3}{2}, \frac{49}{4})$

$$x < -\frac{3}{2} \quad x > -\frac{3}{2}$$

+++++ $-\frac{3}{2}$ ----- إشارة المشتقة الاولى{ $x : x \in R ; x < -\frac{3}{2}$ } الدالة متزايدة بالفترة{ $x : x \in R ; x > -\frac{3}{2}$ } الدالة متناقصة بالفترةنقطة نهاية عظمى محلية $(-\frac{3}{2}, \frac{49}{4})$

$$f''(x) = -2$$

الدالة محدبة في كل مجالها ولا توجد نقاط انقلاب



Mob: 07902162268

114

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

استخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = \frac{3}{x^2}$

sol : $y = \frac{3}{x^2}$

① اوسع مجال للدالة $R / \{0\}$ ② المحاذي الأفقي $y = 0$ ، المحاذي العمودي $x = 0$

③ نقاط التقاطع

if $x = 0 \Rightarrow y = \infty$, if $y = 0 \Rightarrow x = \infty$

لا توجد نقاط تقاطع مع المحورين الاحداثيين $x \neq 0$, $y \neq 0$

④ التناظر

المنحنى متناظر حول محور الصادات $\Rightarrow f(-x) = \frac{3}{(-x)^2} = \frac{3}{x^2} = f(x)$


⑤ النهايات

$$f'(x) = \frac{(x)(0) - (3)(2x)}{x^4} = \frac{-6}{x^3} \neq 0$$


$x < 0$

$x > 0$

أي انه لا توجد نقاط حرجة



اشارة المشتقة الاولى


{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة متناقصة بالفترة{ $x : x \in R ; x < 0$ } الدالة متزايدة بالفترة

$$f''(x) = \frac{x^2 \cdot (0) - (-6)(3x^2)}{x^6} = \frac{18}{x^4} \neq 0$$


أي انه لا توجد نقاط انقلاب

$x < 0$

$x > 0$



اشارة المشتقة الثانية

{ $x : x \in R ; x > 0$ } الدالة مقعرة بالفترتين{ $x : x \in R ; x < 0$ }

باستخدام معلوماتك بالتفاضل ارسـم منحنى الدالة $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$

2015 تمهيدي

المحاذيات لا توجد ② ، اوسع مجال للدالة R ① sol :

نقاط التقاطع ④

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 4, \text{ if } y = 0 \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 4 = 0$$

$$\left. \begin{aligned} x^3 + x^2 - x^2 - 3x^2 + 4 = 0 &\Rightarrow x^3 + x^2 - 4x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2(x+1) - 4(x^2-1) = 0 \\ x^2(x+1) - 4(x-1)(x+1) &= 0 \Rightarrow (x+1)[x^2 - 4(x-1)] = 0 \Rightarrow (x+1)(x^2 - 4x + 4) = 0 \\ (x+1)(x-2)^2 &= 0 \Rightarrow x = -1 \text{ OR } x = 2 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{غير مطلوبة} \\ \text{وزاريا} \end{array}$$

نقاط التقاطع مع المحورين الاحداثيين هي $(0, 4), (-1, 0), (2, 0)$


التناظر ① $\forall x \in R, \exists (-x) \in R$

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x)^2 + 4 = -x^3 - 3x^2 + 4 = -(x^3 + 3x^2 - 4) \neq -f(x)$$

لا يوجد تناظر مع محور الصادات او نقطة الاصل \Rightarrow

النهايات ⑤ $f'(x) = 3x^2 - 6x \Rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x - 2) = 0$

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = 4 \text{ OR } x = 2 \Rightarrow f(2) = 0 \Rightarrow (0, 4), (2, 0) \text{ نقاط حرجة}$$



الدالة متزايدة بالفترة $\{x : x \in R; x > 2\}$
 الدالة متزايدة بالفترة $\{x : x \in R; x < 0\}$
 الدالة متناقصة بالفترة $\{x : x \in R; x \in (0, 2)\}$
 نهاية صغرى $(2, 0)$, نهاية عظمى $(0, 4)$

$$f''(x) = 6x - 6 \Rightarrow 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$f(1) = 2 \Rightarrow (1, 2) \text{ نقطة انقلاب مرشحة}$$

$$x < 1 \quad x > 1$$



باستخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة $f(x) = \frac{6}{x^2+3}$

2015 دور 2 خارج

sol : ① اوسع مجال للدالة R

② المحاذي الأفقي $y = 0$ ، المحاذي العمودي (لا يوجد)

③ نقاط التقاطع

$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = 2, \quad y \neq 0$$

نقطة التقاطع مع المحور الصادي $(0, 2)$

④ التناظر

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists (-x) \in \mathbb{R}$$

$$f(-x) = \frac{6}{(-x)^2+3} = \frac{6}{x^2+3} = f(x) \Rightarrow \text{المنحنى متناظر حول محور الصادات}$$

⑤ النهايات

$$f'(x) = \frac{(x^2+3)(0) - (6)(2x)}{(x^2+3)^2} = \frac{-12x}{(x^2+3)^2} = 0$$

$$-12x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow (0, 2) \text{ نقطة حرجة}$$

+++++(0)----- إشارة المشتقة الاولى

الدالة متزايدة بالفترة $\{x : x \in \mathbb{R}; x < 0\}$

الدالة متناقصة بالفترة $\{x : x \in \mathbb{R}; x > 0\}$

نقطة نهاية عظمى محلية $(0, 2)$

$$f''(x) = \frac{(x^2+3)^2 \cdot (-12) - (-12x) \cdot 2(x^2+3) \cdot 2x}{(x^2+3)^4} = \frac{-12(x^2+3)^2 + 48x^2(x^2+3)}{(x^2+3)^4}$$

$$f''(x) = \frac{(x^2+3)[-12(x^2+3) + 48x^2]}{(x^2+3)^4} = \frac{-12x^2 - 36 + 48x^2}{(x^2+3)^3} = \frac{36x^2 - 36}{(x^2+3)^3} = 0$$

$$36x^2 - 36 = 0 \Rightarrow 36x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$y = \frac{6}{1+3} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$


نقاط انقلاب مرشحة $(1, \frac{3}{2}), (-1, \frac{3}{2})$

+++++(-1)-----(-1)+++++ إشارة المشتقة الثانية

الدالة مقعرة بالفترتين $\{x : x \in \mathbb{R}; x > 1\}, \{x : x \in \mathbb{R}; x < -1\}$

الدالة محدبة بالفترة $\{x : x \in \mathbb{R}; x \in (-1, 1)\}$

نقاط انقلاب $(1, \frac{3}{2}), (-1, \frac{3}{2})$



$$f(x) = \frac{x-1}{x+1} \quad \text{باستخدام معلوماتك بالتفاضل ارسم منحنى الدالة}$$

2016 دور 2

sol : ① $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow R / \{-1\}$ اوسع مجال للدالة $\{-1\}$

② $x = -1$ المحاذي العمودي ، $y = 1$ المحاذي الافقي

③ نقاط التقاطع


$$\text{if } x = 0 \Rightarrow y = -1, \text{ if } y = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$$

نقطتي التقاطع مع المحورين الاحداثيين $(0, -1), (1, 0)$

④ التناظر

بما ان العدد (1) ينتمي الى مجال الدالة لكن العدد (-1) لا ينتمي لها فالمنحنى غير متناظر
لا مع محور الصادات ولا مع نقطة الاصل

⑤ النهايات



إذا كانت $f(x) = 3 + ax + bx^2$ تمتلك نقطة حرجة (1,4) جد قيمتي a, b الحقيقيتان ثم بين نوع النقطة الحرجة .

1997 دور 2

2007 تمميد

خطوة عمل النقطة الحرجة $f(1) = 4$, $f'(1) = 0$

$$f(x) = 3 + ax + bx^2 \Rightarrow 4 = 3 + a + b \Rightarrow a + b = 1 \dots (1)$$

$$f'(x) = a + 2bx \Rightarrow 0 = a + 2b \Rightarrow a = -2b \dots (2) \text{ in } (1)$$

$$-2b + b = 1 \Rightarrow b = -1 \Rightarrow a = 2$$

$$f''(x) = 2b = -2 < 0 \text{ النقطة الحرجة هي نقطة نهاية عظمى محلية}$$

إذا كانت (1, 6) نهاية صغرى محلية لمنحني الدالة $f(x) = ax^2 + (x - b)^2$ جد قيمتي a, b

1998 دور 1

$$\text{sol : } f(1) = 6 \Rightarrow 6 = a + (1 - b)^2 \Rightarrow 6 = a + 1 - 2b + b^2 \Rightarrow a - 2b + b^2 = 5 \dots (1)$$

$$f'(1) = 0 \Rightarrow f'(x) = 2ax + 2(x - b) \Rightarrow [2a + 2(1 - b) = 0] \div 2$$

$$a = b - 1 \dots (2) \text{ تعوض في (1)}$$

$$b - 1 - 2b + b^2 = 5 \Rightarrow b^2 - b - 6 = 0 \Rightarrow (b - 3)(b + 2) = 0$$

$$b = 3 \Rightarrow a = 3 - 1 = 2, b = -2 \Rightarrow a = -2 - 1 = -3$$

$$f''(x) = 2a + 2, a = 2 \Rightarrow f''(x) = 6 > 0, a = -3 \Rightarrow f''(x) = -4 < 0 \text{ يهمل}$$

مجموعة الحل $\{a = 2, b = 3\}$

إذا كانت (2, 6) نقطة حرجة لمنحني الدالة $f(x) = a - (x - b)^4$ فجد قيمتي a, b ثم بين نوع النقطة الحرجة .

2011 خارج القطر

$$\text{sol : } f(2) = 6 \Rightarrow 6 = a - (2 - b)^4 \dots (1)$$

$$f'(2) = 0 \Rightarrow f'(x) = -4(x - b)^3 \Rightarrow -4(2 - b)^3 = 0 \Rightarrow 2 - b = 0 \Rightarrow b = 2 \text{ (in 1)}$$

$$6 = a - (2 - 2)^4 \Rightarrow a = 6 \Rightarrow f(x) = 6 - (x - 2)^4$$

$$f''(x) = -12(x - 2)^2 \Rightarrow f''(2) = -12(2 - 2)^2 = 0 \Rightarrow \text{هذه الطريقة فاشلة في تحديد نوع النقطة}$$

نقطة نهاية عظمى محلية (2, 6) \Rightarrow إشارة $f'(x)$

$x < 2$ $x > 2$

+++++ (2) ----- $f'(x)$

إذا كانت $(-2, 1)$ نقطة حرجة لمنحني الدالة $f(x) = ax^2 - (x + b)^2$ جد قيمتي $a, b \in \mathbb{R}^+$ ثم بين نوع النقطة الحرجة .

2009 دور 1

sol : $f(1) = -2 \Rightarrow -2 = a - (1 + b)^2 \Rightarrow -2 = a - (1 + 2b + b^2)$

$$-2 = a - 1 - 2b - b^2 \Rightarrow a - 2b - b^2 = -1 \dots (1)$$

$$f'(1) = 0 \Rightarrow f'(x) = 2ax - 2(x + b) \Rightarrow [2a - 2(1 + b) = 0] \div 2$$

$$a = b + 1 \dots\dots\dots (2) \quad \text{تعوض في (1)}$$

$$b + 1 - 2b - b^2 = -1 \Rightarrow b^2 + b - 2 = 0 \Rightarrow (b + 2)(b - 1) = 0, \text{ either } b = -2 \text{ يهمل}$$

$$b = 1 \Rightarrow a = 1 + 1 = 2$$

$$f''(x) = 2a - 2, \quad a = 2 \Rightarrow f''(x) = 2 > 0 \Rightarrow (1, -2) \text{ نهاية صغرى محلية}$$

إذا كانت $f(x) = x^3 - bx^2 + cx$ يمر بالنقطة $(-2, -2)$ وكان للدالة نقطة انقلاب عند $x = 1$ جد قيمتي $b, c \in \mathbb{R}$ ثم جد نقطة النهاية العظمى المحلية له .

1999 دور 2

sol : $\because (-2, -2) \in f(x) \Rightarrow f(-2) = -2, \because x=1 \text{ انقلاب} \Rightarrow f'(1) = 0$

$$-8 - 4b - 2c = -2 \dots\dots\dots (1)$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2bx + c, \quad f''(x) = 6x - 2b$$

$$\because f''(1) = 0 \Rightarrow 6 - 2b = 0 \Rightarrow 2b = 6 \Rightarrow b = 3 \quad (1) \text{ نعوض في المعادلة}$$

$$-8 - 12 - 2c = -2 \Rightarrow -2c = 18 \Rightarrow c = -9$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 \Rightarrow [3x^2 - 6x - 9 = 0] \div (3)$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$$

$$x = 3, f(3) = 27 - 27 - 27 = -27 \text{ OR } x = -1, f(-1) = -1 - 3 + 9 = 5$$

نقاط حرجة $(3, -27), (-1, 5)$

$$f''(x) = 6x - 6 \Rightarrow f''(3) = 18 - 6 = 12 > 0, f''(-1) = -6 - 6 = -12 < 0$$

نقطة نهاية عظمى محلية $(-1, 5)$, نقطة نهاية صغرى محلية $(3, -27)$

قصي هاشم التميمي

2014 دور 1

إذا كان منحنى الدالة $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ مقعر لكل $x < 1$ ومحدب لكل $x > 1$ يمس المستقيم $y + 9x = 28$ عند $x = 3$ جد قيم $a, b, c \in \mathbb{R}$.

sol : $x = 3 \Rightarrow y + 27 = 28 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow (3, 1)$ نقطة تماس

$$f(3) = 1 \Rightarrow 27a + 9b + c = 1 \quad \dots\dots (1)$$

$$m = \frac{-a}{b} = \frac{-9}{1} = -9 \text{ ميل المستقيم}$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx \Rightarrow f'(3) = 27a + 6b$$

$$f'(3) = m \Rightarrow 27a + 6b = -9 \quad \dots\dots (2)$$

$$f''(x) = 6ax + 2b, f''(1) = 0 \Rightarrow 6a + 2b = 0 \quad \dots\dots (3)$$

$$2b = -6a \Rightarrow b = -3a \quad \text{تعويض في (2)}$$

$$27a + (6)(-3a) = -9 \Rightarrow 27a - 18a = -9 \Rightarrow 9a = -9 \Rightarrow a = -1$$

$$b = (-3)(-1) = 3 \quad \text{تعويض في المعادلة (1)}$$

$$-27 + 27 + c = 1 \Rightarrow c = 1$$

إذا كان منحنى الدالة $f(x) = ax^3 + bx^2 + 1$ مقعر لكل $x < 1$ ومحدب لكل $x > 1$ ويمس المستقيم $y + 9x = 28$ عند $x = 3$ جد قيم $a, b \in \mathbb{R}$

2000 دور 2

تلميح || في هذا السؤال يمكن حله بدون الاستفادة من نقطة الانقلاب أي من خلال المعادلتين 1, 2 فقط وإذا اضيف مجهول آخر للسؤال فيكون $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ فيجب الاستفادة من المعادلات الثلاث معا.

إذا كان المستقيم $y + 9x = 28$ يمس المنحنى $f(x) = ax^3 + bx^2 + 1$ عند $(3, 1)$ جد قيم $a, b \in \mathbb{R}$.

2009 دور 2

sol : $m = \frac{-a}{b} = \frac{-9}{1} = -9$ ميل المستقيم $\therefore (3, 1)$ نقطة تماس $\Rightarrow f(3) = 1, f'(3) = m$

$$27a + 9b + 1 = 1 \Rightarrow 3a + b = 0 \Rightarrow b = -3a \quad \dots\dots (1)$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx \Rightarrow f'(3) = 27a + 6b$$

$$\Rightarrow 27a + 6b = -9 \quad \dots\dots (2) \Rightarrow 27a - 18a = -9 \Rightarrow 9a = -9 \Rightarrow a = -1 \Rightarrow b = 3$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

121

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

إذا علمت ان للدالة $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ نهاية عظمى محلية عند $x = -2$ ونهاية صغرى محلية عند $x = 4$ جد قيمتي a, b .

2001 دور 1

sol : $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

$$f'(-2) = 0, f'(4) = 0$$

$$12 - 4a + b = 0 \dots\dots (1)$$

$$48 + 8a + b = 0 \dots\dots (2 \Rightarrow b = -48 - 8a) \text{ تعوض في (1)}$$

$$12 - 4a - 48 - 8a = 0 \Rightarrow -12a = 36 \Rightarrow a = -3 \Rightarrow b = -48 + 24 = -24$$

إذا علمت ان للدالة $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ نهاية عظمى محلية عند $x = -1$ ونهاية صغرى محلية عند $x = 2$ جد قيمتي a, b .

2012 دور 1

2013 دور 2

2008 خارج

2015 نازحين

sol : $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

$$f'(-1) = 0, f'(2) = 0$$

$$3 - 2a + b = 0 \dots\dots (1)$$

$$12 + 4a + b = 0 \dots\dots (2 \Rightarrow b = -12 - 4a) \text{ تعوض في (1)}$$

$$3 - 2a - 12 - 4a = 0 \Rightarrow -6a = 9 \Rightarrow a = -\frac{3}{2} \Rightarrow b = -12 - 4(-\frac{3}{2}) = -12 + 6 = -6$$

لتكن $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ جد معادلة المماس للمنحني عند نقطة انقلابه.

2003 دور 1

sol: $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$

$$f''(x) = 6x + 6 \Rightarrow 6x + 6 = 0 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow f(-1) = -1 + 3 + 9 - 6 = 5$$

$$(-1, 5) \text{ نقطة انقلاب وتماس معا} \Rightarrow m = f'(-1) = 3 - 6 - 9 = -12$$

$$(y - y_1) = m(x - x_1) \text{ معادلة المماس} \Rightarrow (y - 5) = -12(x + 1)$$

$$y - 5 = -12x - 12 \Rightarrow 12x + y + 7 = 0 \text{ معادلة المماس المطلوبة}$$

قصي هاشم التميمي

إذا كان المستقيم $3x - y = 7$ يمس المنحني $f(x) = ax^2 + bx + c$ عند النقطة $(-1, 2)$ وكانت له نهاية صغرى محلية عند $x = \frac{1}{2}$ جد قيم $a, b, c \in \mathbb{R}$.

لأنها صغرى $f'(\frac{1}{2}) = 0$, لأنها تماس $f'(2) = m$, لأنها تماس $f(2) = -1$ sol :

$$m = -\frac{\text{معامل } x}{\text{معامل } y} = \frac{-a}{b} = \frac{-3}{-1} = 3$$

$$(2, -1) \in f(x) \Rightarrow 4a + 2b + c = -1 \quad (1)$$

$$f'(x) = 2ax + b, \quad \therefore f'(2) = m \Rightarrow 4a + b = 3 \quad (2)$$

تعوض في المعادلة (2) $\Rightarrow a = -b$ (3) $\therefore f'(\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow a + b = 0$

تعوض قيمتهما في المعادلة (1) $-4b + b = 3 \Rightarrow -3b = 3 \Rightarrow b = -1 \Rightarrow a = 1$

$$4 - 2 + c = -1 \Rightarrow c = -3$$

إذا كان المستقيم $3x - y = 7$ يمس المنحني $f(x) = ax^2 + bx + c$ عند النقطة $(-1, 2)$ وكانت له نهاية صغرى محلية عند $x = 5$ جد قيم $a, b, c \in \mathbb{R}$.

2015 ح4 رفاة

إذا كان منحنى الدالة $f(x) = 2ax^2 + b$ وكانت $a \in \{-1, 0, 1, 3\}$ تمتلك نهاية عظمى محلية جد قيمة a .

2004 دور 1

sol: $f'(x) = 4ax \Rightarrow f''(x) = 4a$

$a = -1 \Rightarrow f''(x) = -4 < 0$ تمتلك نهاية عظمى محلية

جد معادلة المنحني $f(x) = ax^3 - bx^2 + cx$ حيث ان النقطة $(-1, 4)$ نقطة انقلاب له وميل المماس عندها يساوي (1).

2004 دور 2

خريطة عمل [لأنها انقلاب $f''(-1) = 0$, لأنها تماس $f'(-1) = 1$, لأنها تماس $f(-1) = 4$] sol :

$$(-1, 4) \in f(x) \Rightarrow -a - b - c = 4 \quad (1)$$

$$f'(x) = 3ax^2 - 2bx + c \Rightarrow 3a + 2b + c = 1 \quad (2)$$

$$2a + b = 5 \quad (3)$$

بالجمع

$$f''(x) = 6ax - 2b \Rightarrow -6a - 2b = 0 \quad (4) \Rightarrow 2b = -6a \Rightarrow b = -3a \text{ (in 3)}$$

$$2a - 3a = 5 \Rightarrow -a = 5 \Rightarrow a = -5 \Rightarrow b = 15 \text{ (in 1)}$$

$$5 - 15 - c = 4 \Rightarrow -c = 14 \Rightarrow c = -14$$

$$f(x) = -5x^3 - 15x^2 - 14x$$

2014 دور 3

2016 دور 2 خارج

2005 دور 2

جد نقطة الانقلاب للمنحنى $f(x) = (x-2)(x+1)^2$ ثم جد معادلة المماس له عند نقطة انقلابه

$$\text{sol: } f(x) = (x-2)(x^2+2x+1)$$

$$f'(x) = (x-2)(2x+2) + (x^2+2x+1)(1) = 2x^2+2x-4x-4 + x^2+2x+1 = 3x^2-3$$

$$f''(x) = 6x \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow f(0) = -2 \Rightarrow (0, -2) \text{ نقطة الانقلاب}$$

$$m = f'(x) = f'(0) = -3$$

$$(y - y_1) = m(x - x_1) \text{ معادلة المماس } \Rightarrow (y + 2) = -3(x - 0) \Rightarrow 3x + y + 2 = 0$$

2006 تمهيدي

إذا علمت ان للدالة $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ نهاية صغرى محلية عند $x = 4$ ونقطة انقلاب عند $x = 1$ جد قيمتي $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\text{sol: } f'(x) = 3x^2 + 2ax + b \Rightarrow f'(4) = 0$$

$$f''(x) = 6x + 2a \Rightarrow f''(1) = 0$$

$$48 + 8a + b = 0 \dots\dots (1)$$

$$6 + 2a = 0 \Rightarrow 2a = -6 \Rightarrow a = -3 \text{ نعوض في (1)}$$

$$48 - 24 + b = 0 \Rightarrow b = -24$$

2005 دور 1

لتكن $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + 1$ وكانت $(-1, 2)$ نهاية عظمى محلية للدالة جد قيمتي $c, d \in \mathbb{R}$ هل توجد نقطة انقلاب للدالة.

$$\text{sol: } f(-1) = 2, f'(-1) = 0 \text{ خطة عمل النقطة الحرجة}$$

$$f(x) = x^3 + bx^2 + cx + 1 \Rightarrow 2 = -1 + b - c + 1 \Rightarrow b - c = 2 \dots\dots (1)$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2bx + c \Rightarrow 0 = 3 - 2b + c \Rightarrow c = 2b - 3 \dots\dots (2) \text{ in (1)}$$

$$b - (2b - 3) = 2 \Rightarrow b - 2b + 3 = 2 \Rightarrow b = 1 \Rightarrow c = 2 - 3 = -1$$

$$f(x) = x^3 + x^2 - x + 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$f''(x) = 6x + 2 \Rightarrow 6x + 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$$

$$f(x) = \frac{-1}{27} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + 1 = \frac{-1+3+9+27}{27} = \frac{38}{27} \Rightarrow \left(-\frac{1}{3}, \frac{38}{27}\right) \text{ نقطة انقلاب مرشحة}$$

$$\left(-\frac{1}{3}, \frac{38}{27}\right) \text{ نقطة انقلاب} \Rightarrow \text{اشارة المشتقة الثانية} \left(-\frac{1}{3}\right) \text{ } \leftarrow \text{+++++++}$$

2007 دور 1

إذا كانت $f(x) = ax^3 + bx^2$ جد قيمتي $a, b \in \mathbb{R}$ إذا علمت ان للمنحنى نقطة انقلاب $(1, 2)$

$$\text{sol: } f(1) = 2 \Rightarrow 2 = a + b \dots\dots (1)$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx, f''(x) = 6ax + 2b$$

$$f''(1) = 0 \Rightarrow 6a + 2b = 0 \dots\dots (2) \Rightarrow b = -3a \text{ نعوض في (1)}$$

$$2 = a - 3a \Rightarrow 2 = -2a \Rightarrow a = -1 \text{ in (2)} \Rightarrow b = 3$$

إذا كانت $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ حيث $a \in \mathbb{R}$; $a, x \neq 0$ بين ان الدالة لاتتملك نهاية عظمى محلية مهما كانت قيمة a .

2008 دور 1

2015 دور 3

sol : $f'(x) = 2x - ax^{-2} \Rightarrow 2x - ax^{-2} = 0 \Rightarrow 2x - \frac{a}{x^2} = 0 \Rightarrow 2x = \frac{a}{x^2}$

$$2x^3 = a \Rightarrow x^3 = \frac{a}{2} \Rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{a}{2}}$$

$$f''(x) = 2 + 2ax^{-3} = 2 + \frac{2a}{x^3} \Rightarrow f''\left(\sqrt[3]{\frac{a}{2}}\right) = 2 + \frac{2a}{\frac{a}{2}} = 2 + (2a)\left(\frac{2}{a}\right) = 2 + 4 = 6 > 0$$

الدالة تملك نهاية صغرى محلية ولا يمكن ان تملك نهاية عظمى محلية .

إذا كانت $f(x) = x^2 - \frac{a}{x}$ حيث $a \in \mathbb{R}$; $a, x \neq 0$ بين ان الدالة لاتتملك نهاية عظمى محلية مهما كانت قيمة a .

2013 دور 1

نفس اسلوب حل السؤال السابق بفرق اشارة قيمة x

إذا كان المستقيم $x - y + 2 = 0$ يمس منحنى القطع المكافئ $y^2 = hx$ جد بؤرة القطع المكافئ.

2008 دور 2

sol : $m_{\text{المستقيم}} = -\frac{\text{معامل } x}{\text{معامل } y} = -\frac{a}{b} = \frac{-1}{-1} = 1$

ميل المماس للمنحنى (إذا مس او وازى مستقيم منحنى تساوى ميلاهما) $2y y' = h \Rightarrow y' = \frac{h}{2y}$

تعويض بمعادلة المستقيم (1) $\frac{h}{2y} = 1 \Rightarrow h = 2y \Rightarrow y = \frac{h}{2}$

(نعوض المعادلتين 1 ، 2 بمعادلة القطع المكافئ) $x - \frac{h}{2} + 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{h}{2} - 2$ (2)

$\left(\frac{h}{2}\right)^2 = h\left(\frac{h}{2} - 2\right) \Rightarrow \left[\frac{h^2}{4} = \frac{h^2}{2} - 2h\right] \cdot (4) \Rightarrow h^2 = 2h^2 - 8h \Rightarrow h^2 - 8h = 0$

$h(h - 8) = 0 \Rightarrow h = 0$ يهمل OR $h = 8$

بؤرة القطع المكافئ $(2, 0)$ $\Rightarrow p = 2 \Rightarrow 4p = 8 \Rightarrow$ بمعادلة القطع المكافئ $y^2 = 8x$, $y^2 = 4px$

إذا كانت $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ وكانت f مقعرة لكل $x > 1$ ومحدبة لكل $x < 1$ للدالة f نقطة نهاية عظمى محلية $(-1, 5)$ فجد قيم الثوابت $a, b, c \in \mathbb{R}$.

2012 دور 3

خريطة عمل [لانها انقلاب $f''(1) = 0$, لانها عظمى $f'(-1) = 0$, لانها عظمى $f(-1) = 5$] sol :

$$\because (-1, 5) \in f(x) \Rightarrow -a + b - c = 5 \dots\dots\dots (1)$$

2015 دور 1

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \because f'(-1) = 0 \Rightarrow 3a - 2b + c = 0 \dots\dots\dots (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} -a + b - c = 5 \dots\dots\dots (1) \\ 3a - 2b + c = 0 \dots\dots\dots (2) \end{array} \right\} \text{بالجمع}$$

$$\hline 2a - b = 5 \dots\dots\dots (3)$$

2016 دور 1

$$f''(x) = 6ax + 2b, \because f''(1) = 0 \Rightarrow 6a + 2b = 0 \dots\dots\dots (4)$$

$$2b = -6a \Rightarrow b = -3a \text{ (تعوض في المعادلة رقم 3)}$$

$$2a + 3a = 5 \Rightarrow 5a = 5 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow b = -3 \text{ (تعوض قيمتهما في المعادلة 1)}$$

$$-1 - 3 - c = 5 \Rightarrow c = -9$$

إذا كانت 6 تمثل نهاية صغرى محلية لمنحني الدالة $f(x) = 3x^2 - x^3 + c$ فجد قيمة c لم جد معادلة المماس للمنحني عند نقطة انقلابه.

2012 خارج القطر

sol : $y = 6$

$$f'(x) = 6x - 3x^2 \Rightarrow 6x - 3x^2 = 0 \Rightarrow 3x(2 - x) = 0$$

$$x = 0 \text{ OR } x = 2$$

$$f''(x) = 6 - 6x \Rightarrow f''(0) = 6 - 0 = 6 > 0, f''(2) = 6 - 12 = -6 < 0$$

$$(0, 6) \in f(x) \text{ هي نقطة النهاية الصغرى}$$

$$6 = 0 - 0 + c \Rightarrow c = 6 \Rightarrow f(x) = 3x^2 - x^3 + 6 \Rightarrow f'(x) = 6x - 3x^2 \Rightarrow f''(x) = 6 - 6x$$

$$6 - 6x = 0 \Rightarrow 6x = 6 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow f(1) = 3 - 1 + 6 = 8 \Rightarrow (1, 8) \text{ انقلاب مرشحة}$$

$$\therefore (1, 8) \text{ نقطة انقلاب}$$

نكن $f(x) = ax^2 - 6x + b$ حيث ان $a \in \{-4, 8\}$ جد قيمة a اذا كانت الدالة تمتلك نهاية صغرى محلية .

2013 تمهيدي

sol: $f'(x) = 2ax - 6 \Rightarrow f''(x) = 2a$

$a = 8 \Rightarrow f''(x) = 16 > 0$ الدالة تمتلك نهاية صغرى محلية

إذا كانت $g(x) = 1 - 12x$ ، $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ وكان كل من g, f متماسان عند نقطة الانقلاب وكانت للدالة f نقطة انقلاب هي $(1, -11)$ فجد قيم الثوابت $a, b, c \in \mathbb{R}$

2014 دور 2

sol: [لانها انقلاب $f''(1) = 0$, لانها تماس $f'(1) = m$, لانها تماس وانقلاب $f(1) = -11$] خريطة عمل

$\therefore f(1) = -11 \Rightarrow a + b + c = -11$ (1)

$m = g'(x) = -12$, $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

$\therefore f'(1) = m \Rightarrow 3a + 2b + c = -12$ (2)

$\pm a \pm b \pm c = \pm 11$ (3)

$2a + b = -1$ (4)

$f''(x) = 6ax + 2b$, $\therefore f''(1) = 0 \Rightarrow 6a + 2b = 0$ (5)

$2b = -6a \Rightarrow b = -3a$ (تعويض في المعادلة 4)

$2a - 3a = -1 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow b = -3$ (تعويض قيمتهما في المعادلة 1)

$1 - 3 + c = -11 \Rightarrow c = -9$

ملاحظة || يمكن اعتبار المستقيم $g(x)=1-12x$ بالصورة $y=1-12x$ ثم حساب ميله عن طريق قانون ميل المستقيم ويصبح $m = -12$ بعد ان نجعل المتغيرين x, y بنفس الجهة علما ان الطالب مخير بين استخدام المشتقة او قانون ميل المستقيم

إذا كان للدالة $f(x) = ax^3 + 3x^2 + c$ نهاية عظمى محلية تساوي (8) ونقطة انقلاب عند $x = 1$ جد قيمتي $a, c \in \mathbb{R}$.

2015 دور 2 خارج

2015 دور 2 داخل

sol: $y = 8$

$f'(x) = 3ax^2 + 6x \Rightarrow 3ax^2 + 6x = 0$ (1)

$f''(x) = 6ax + 6 \Rightarrow f''(1) = 0 \Rightarrow 6a + 6 = 0 \Rightarrow 6a = -6 \Rightarrow a = -1$ (تعويض في المعادلة 1)

$-3x^2 + 6x = 0 \Rightarrow -3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0$ OR $x = 2$

$f''(x) = -6x + 6 \Rightarrow f''(0) = 6 > 0$, $f''(2) = -12 + 6 = -6 < 0$

$(2, 8) \Rightarrow$ نقطة النهاية العظمى المحلية

$-8 + 12 + c = 8 \Rightarrow c = 4$

الاسئلة الوزارية الخاصة بالتطبيقات العلمية

خطوات

- (1) نفرض المتغيرات باسماء معينة.
- (2) ايجاد علاقة بين المتغيرات بالاستفادة من أي عدد في السؤال لجعل احد المتغيرات بدلالة الآخر .
- (3) كتابة القاعدة (الدالة) الملازمة لكلمة اكبر او اصغر او احدى مرادفاتها .
- (4) وضع القاعدة (الدالة) بدلالة متغير واحد بالاستفادة من الخطوة (2) ، أي دمج (2) مع (3) .
- (5) اشتقاق القاعدة ثم مساواتها بالصفر ثم حل المعادلة لإيجاد قيمة المتغير الموحد .
- (6) الرجوع الى الخطوتين (2) ثم (1) والتعويض عن المعلوم لإيجاد المجهول .
- (7) عرض النتائج على خط الاعداد او المشتقة الثانية للتأكد من كون الناتج اكبر او اصغر مايمكن علما ان اغلب الاسئلة يتم اختيار القيمة المطلوبة الناتجة من الخطوة (5) ذهنيا دون الحاجة الى الخطوة (7)

1997 دور 2

في ظل الحصار الجائر المفروض على قطرنا المناضل صمم عامل بناء مبدع نموذجا لصندوق بضاعة على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة الشكل ومن غير غطاء فإذا كان حجمه $\frac{1}{16} m^3$ جد ابعاد الصندوق لتكون مساحة المادة المستخدمة في صناعته اقل مايمكن .

الحل | نفرض ان طول ضلع القاعدة يساوي x ونفرض ان الارتفاع يساوي h
حجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = x^2 h \Rightarrow \frac{1}{16} = x^2 h \Rightarrow 16x^2 h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{16x} \quad \text{لاحظ انه جعلنا } h \text{ بدلالة } x \text{ لكي نتجنب جذر الطرفين}$$

المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات = المساحة الجانبية + ضعف مساحة القاعدة

ولأن الصندوق بدون غطاء لذا سوف نحذف الضعف من القانون وعليه سوف يكون

المساحة السطحية للصندوق = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة = محيط القاعدة \times الارتفاع + مساحة القاعدة

$$A = 4xh + x^2 \Rightarrow A = 4x \frac{1}{16x^2} + x^2 \Rightarrow A = \frac{1}{4} x^{-1} + x^2$$

$$A' = -\frac{1}{4} x^{-2} + 2x, \therefore A' = 0$$

$$-\frac{1}{4} x^{-2} + 2x = 0 \Rightarrow \left[\frac{-1}{4x^2} + 2x = 0 \right] \cdot 4x^2 \Rightarrow -1 + 8x^3 = 0 \Rightarrow 8x^3 = 1$$

$$x^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \quad \therefore h = \frac{1}{16x^2} = \frac{1}{16(\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{16 \cdot \frac{1}{4}} = \frac{1}{4}$$

اي ان طول ضلع القاعدة المربعة يساوي $\frac{1}{2} m$ وارتفاع الصندوق يساوي $\frac{1}{4} m$

وللتحقق من صحة الحل نحيل النتائج المستخرجة على خط الاعداد للمشتقة الاولى او المشتقة الثانية للتأكد من كونه

اكبر (عظمى) اصغر (صغرى) مايمكن

$$A'' = \frac{1}{2} x^{-3} + 2 = \frac{1}{2x^3} + 2 \Rightarrow A''\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{8}} + 2 = 6 > 0 \quad \text{نهاية صغرى (اقل مايمكن)}$$

Mob: 07902162268

128

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

حاوية على هيئة اسطوانة دائرية قائمة حجمها $216 \pi \text{ cm}^3$ جد ابعادها اذا كانت مساحة المعدن المستخدم في صنعها اقل ما يمكن ، مع العلم ان الحاوية مفتوحة من الاعلى .

1998 دور 1

2016 دور 2

الحل :- نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة = x ، نفرض ان ارتفاع الاسطوانة = h
 $V = \pi x^2 h$ حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$216\pi = \pi x^2 h \Rightarrow h = \frac{216}{x^2}$$

المساحة السطحية (بدون غطاء) = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة

المساحة السطحية (بدون غطاء) = محيط القاعدة \times الارتفاع + مساحة القاعدة

$$A = 2\pi x h + \pi x^2$$


$$A = 2\pi x \left(\frac{216}{x^2}\right) + \pi x^2 \Rightarrow A = \pi (432 x^{-1} + x^2)$$

$$A' = \pi (-432 x^{-2} + 2x)$$

$$\left[\frac{-432}{x^2} + 2x = 0\right] \cdot x^2 \Rightarrow -432 + 2x^3 = 0$$

$$2x^3 = 432 \Rightarrow x^3 = 216$$

$$x = 6 \text{ cm} \text{ ارتفاعها } h = \frac{216}{6} = 6 \text{ cm} \text{ نصف قطر قاعدتها}$$



خزان من الحديد ذو غطاء كامل على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة وحجمه 216 m^3 جد ابعاده لتكون مساحة الصفائح المستخدمة في صنعه اقل ما يمكن .

2000 دور 2

الحل | نفرض ان طول ضلع القاعدة يساوي x ونفرض ان الارتفاع يساوي h

حجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = x^2 h \Rightarrow 216 = x^2 h \Rightarrow h = \frac{216}{x^2}$$

المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات = المساحة الجانبية + ضعف مساحة القاعدة

المساحة السطحية للخزان = محيط القاعدة \times الارتفاع + $2 \times$ مساحة القاعدة

$$A = 4xh + 2x^2 \Rightarrow A = 4x \frac{216}{x^2} + 2x^2 \Rightarrow A = 864 x^{-1} + 2x^2$$


$$A' = -864 x^{-2} + 4x, \therefore A' = 0$$

$$-864 x^{-2} + 4x = 0 \Rightarrow \left[\frac{-864}{x^2} + 4x = 0\right] \cdot x^2$$

$$\Rightarrow -864 + 4x^3 = 0 \Rightarrow 4x^3 = 864$$

$$x^3 = 216 \Rightarrow x = 6 \therefore h = \frac{216}{x^2} = \frac{216}{36} = 6$$

اي ان طول ضلع القاعدة المربعة يساوي 6 m وارتفاع الصندوق يساوي 6 m اي ان الشكل مكعبا



وللتحقق من صحة الحل نحيل النتائج المستخرجة على خط الاعداد للمشتقة الاولى او المشتقة الثانية للتأكد من كونه اكبر (عظمى) اصغر (صغرى) ما يمكن

$$A'' = 1728x^{-3} + 4 = \frac{1728}{x^3} + 4 \Rightarrow A''(6) = \frac{1728}{216} + 4 = 12 > 0 \text{ (اقل ما يمكن)}$$

اذا كان نصف قطر كرة يساوي نصف قاعدة اسطوانة دائرية قائمة وكان مجموع حجمي الكرة والاسطوانة يساوي $90\pi \text{ cm}^3$ جد طول نصف قطر الكرة عندما يكون مجموع مساحتيهما الكلية اصغر ما يمكن .

1999 دور 2

الحل | نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة يساوي نصف قطر الكرة ويساوي r ، نفرض ارتفاع الاسطوانة h
حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع ، حجم الكرة = $\frac{4\pi}{3} (\text{نصف القطر})^3$

$$[90\pi = \pi r^2 h + \frac{4\pi}{3} r^3] \cdot \frac{3}{\pi} \Rightarrow 270 = 3r^2 h + 4r^3$$

$$3r^2 h = 270 - 4r^3 \Rightarrow h = \frac{270 - 4r^3}{3r^2} \Rightarrow h = \frac{270}{3r^2} - \frac{4r^3}{3r^2} \Rightarrow h = 90r^{-2} - \frac{4}{3}r$$

المساحة السطحية للأسطوانة A_1 = المساحة الجانبية + $2 \times$ مساحة القاعدة

المساحة السطحية للكرة $A_2 = 4\pi r^2$

$$A = A_1 + A_2 = (2\pi r h + 2\pi r^2) + 4\pi r^2 = 2\pi r h + 6\pi r^2$$

$$A = 2\pi (r h + 3r^2) \Rightarrow A = 2\pi [r(90r^{-2} - \frac{4}{3}r) + 3r^2]$$

$$A = 2\pi [90r^{-1} - \frac{4}{3}r^2 + 3r^2]$$

$$A' = 2\pi [-90r^{-2} - \frac{8}{3}r + 6r] , A' = 0$$

$$2\pi [-90r^{-2} - \frac{8}{3}r + 6r] = 0 \Rightarrow -90r^{-2} - \frac{8}{3}r + 6r = 0$$

$$[-\frac{90}{r^2} - \frac{8}{3}r + 6r = 0] \cdot 3r^2 \Rightarrow -270 - 8r^3 + 18r^3 = 0$$

$$10r^3 = 270 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3 \text{ cm} \text{ نصف قطر كل من الكرة والاسطوانة}$$

برنامج رحلتي في السادس

2002 دور 2

2015 خارج دا

خزان على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة الشكل وله غطاء كامل ، جد ابعاد الخزان لتكون مساحة المادة المستعملة في صناعته اقل مايمكن علما ان سعة الخزان $27 m^3$

الحل | نفرض ان طول ضلع القاعدة يساوي x ونفرض ان الارتفاع يساوي h
حجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = x^2 h \Rightarrow 27 = x^2 h \Rightarrow h = \frac{27}{x^2}$$

المساحة السطحية لمتوازي المستطيلات = المساحة الجانبية + ضعف مساحة القاعدة

المساحة السطحية للخزان = محيط القاعدة \times الارتفاع + $2 \times$ مساحة القاعدة


$$A = 4xh + 2x^2 \Rightarrow A = 4x \frac{27}{x^2} + 2x^2 \Rightarrow A = 108 x^{-1} + 2x^2$$

$$A' = -108 x^{-2} + 4x, \therefore A' = 0$$

$$-108 x^{-2} + 4x = 0 \Rightarrow \left[\frac{-108}{x^2} + 4x = 0 \right] \cdot x^2$$

$$\Rightarrow -108 + 4x^3 = 0 \Rightarrow 4x^3 = 108$$

$$x^3 = 27 \Rightarrow x = 3 \quad \therefore h = \frac{27}{x^2} = \frac{27}{9} = 3$$



اي ان طول ضلع القاعدة المربعة يساوي $3 m$ وارتفاع الصندوق يساوي $3 m$ اي ان الشكل مكعبا وللتحقق من صحة الحل نحيل النتائج المستخرجة على خط الاعداد للمشتقة الاولى او المشتقة الثانية للتأكد من كونه اكبر (عظمى) اصغر (صغرى) مايمكن

$$A'' = 216 x^{-3} + 4 = \frac{216}{x^3} + 4 \Rightarrow A''(3) = \frac{216}{27} + 4 = 12 > 0 \text{ (اقل مايمكن)}$$

جد بعدي علبة اسطوانة دائرية قائمة مسدودة من نهايتها ، مساحتها السطحية $24\pi cm^2$ عندما يكون حجمها اكبر مايمكن .

2001 دور 1

2004 دور 2

الحل | نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة r وارتفاعها h

حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع

المساحة السطحية للاسطوانة = المساحة الجانبية + $2 \times$ مساحة القاعدة

المساحة السطحية للاسطوانة = (محيط القاعدة \times الارتفاع) + $2 \times$ مساحة القاعدة

$$[24\pi = 2\pi rh + 2\pi r^2] \div 2\pi \Rightarrow 12 = rh + r^2 \Rightarrow rh = 12 - r^2$$

$$h = \frac{12 - r^2}{r}$$

$$V = \pi r^2 h \Rightarrow V = \pi r^2 \cdot \left(\frac{12 - r^2}{r} \right) = \pi (12r - r^3)$$

$$V' = \pi (12 - 3r^2), \quad V' = 0 \Rightarrow \pi (12 - 3r^2) = 0 \Rightarrow 3r^2 = 12$$

$$r^2 = 4 \Rightarrow r = 2 cm \quad \Rightarrow h = \frac{12 - 4}{2} = 4 cm \text{ ارتفاع الاسطوانة}$$

وللتحقق من صحة الحل نعرض النتائج على المشتقة الثانية ويجب ان تكون اشارتها موجبة اي ان النهاية عظمى

$$V'' = \pi (-6r) \Rightarrow V''(2) = -12\pi < 0 \text{ اي ان الحجم يكون اكبر مايمكن}$$

2004 دور 1

قطعة سلك طولها 8 cm قطعت الى قطعتين صنع من الاولى دائرة ومن الثانية مستطيل طوله ضعف عرضه ، جد طول كل قطعة ليكون مجموع مساحتي المستطيل والدائرة اقل ما يمكن .

الحل | نفرض ان طول المستطيل x وعرضه y بحيث ان $x = 2y$ ونفرض ان نصف قطر الدائرة r بما ان طول قطعة السلك 8 امتار وقطعت الى قطعتين فإن مجموع محيطي القطعتين هي نفسها طول السلك وعليه تكون العلاقة في السؤال هي مجموع المحيطين والقاعدة التي يتم اشتقاقها مجموع المساحتين

$$2(2y + y) + 2\pi r = 8 \Rightarrow 6y + 2\pi r = 8 \Rightarrow 3y + \pi r = 4$$

$$3y = 4 - \pi r \Rightarrow y = \frac{1}{3} (4 - \pi r)$$

$$A = 2y(y) + \pi r^2 \Rightarrow A = \frac{2}{9} (4 - \pi r)^2 + \pi r^2 \Rightarrow A = \frac{2}{9} (16 - 8\pi r + \pi^2 r^2) + \pi r^2$$

$$A' = \frac{2}{9} (-8\pi + 2\pi^2 r) + 2\pi r \Rightarrow \left[\frac{2}{9} (-8\pi + 2\pi^2 r) + 2\pi r = 0 \right] \cdot \frac{9}{2\pi}$$

$$-8 + 2\pi r + 9r = 0 \Rightarrow r(2\pi + 9) = 8 \Rightarrow r = \frac{8}{2\pi + 9}$$

$$y = \frac{1}{3} \left(4 - \frac{8\pi}{2\pi + 9} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{8\pi + 36 - 8\pi}{\pi + 9} \right) = \frac{12}{2\pi + 9}$$

$$6y = \frac{72}{2\pi + 9} \text{ محيط المستطيل والذي يمثل طول القطعة الاولى}$$

$$2\pi r = \frac{16\pi}{2\pi + 9} \text{ محيط الدائرة والذي يمثل طول القطعة الثانية}$$

$$A'' = \frac{2}{9} (2\pi^2) + 2\pi > 0 \text{ (اصغر ما يمكن) اي ان مجموعة المساحتين في نهايته الصغرى}$$

مجموع محيطي دائرة ومربع 60 cm اثبت انه عندما يكون مجموع مساحتي الشكلين اصغر مايمكن فان طول قطر الدائرة يساوي طول ضلع المربع .

2013 دور 3

2015 دور 3

الحل :- نفرض ان طول ضلع المربع = x ، نفرض ان طول نصف قطر الدائرة = y العلاقة مجموع المحيطين والقاعدة مجموع المساحتين

$$4x + 2\pi y = 60 \Rightarrow 2x + \pi y = 30 \Rightarrow 2x = 30 - \pi y \Rightarrow x = 15 - \frac{\pi}{2} y$$

$$A = x^2 + \pi y^2 \Rightarrow A = \left(15 - \frac{\pi}{2} y \right)^2 + \pi y^2 \Rightarrow A = 225 - 15\pi y + \frac{\pi^2}{4} y^2 + \pi y^2$$

$$A' = -15\pi + \frac{\pi^2}{2} y + 2\pi y \Rightarrow \left[-15\pi + \frac{\pi^2}{2} y + 2\pi y = 0 \right] \cdot \frac{2}{\pi}$$

$$-30 + \pi y + 4y = 0 \Rightarrow (4 + \pi) y = 30 \Rightarrow y = \frac{30}{(4 + \pi)}$$

$$x = 15 - \frac{\pi}{2} \left(\frac{30}{(4 + \pi)} \right) = 15 - \frac{15\pi}{(4 + \pi)} = \frac{15\pi + 60 - 15\pi}{(4 + \pi)} \Rightarrow x = \frac{60}{(4 + \pi)}$$

$$2y = x = \frac{60}{(4 + \pi)} \text{ أي ان}$$

$$A'' = \frac{\pi^2}{2} + 2\pi > 0 \text{ اي ان للدالة نهاية صغرى محلية والجواب هو اصغر مايمكن}$$

تلميح || يمكنك ان تراجع اسلوب حل الكتاب للمثال حيث بدأ الحل بأن يجعل نصف القطر بدلالة طول ضلع المربع ، حاول ذلك قبل ان تطلع على حل الكتاب .

برهن ان اكبر مستطيل محيطه 40 cm يكون مربعا

2005 تمهيدي

الحل | نفرض ان بعدي المستطيل x, y

$$40 = 2(x + y) \Rightarrow 20 = x + y \Rightarrow x = 20 - y \quad \text{محيط المستطيل} = 2 \text{ (الطول + العرض)}$$

$$A = x \cdot y \quad \text{مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$A = (20 - y) y = 20y - y^2$$

$$A' = 20 - 2y, \quad A' = 0 \Rightarrow 20 - 2y = 0 \Rightarrow y = 10$$

بما ان البعدين متساويين فإن المستطيل المطلوب مربعا $x = 20 - 10 = 10$ اي ان المستطيل يكون مربعا عندما يكون في نهايته العظمى (مساحته اكبر ما يمكن) $A'' = -2 < 0$

جد ابعاد مستطيل محيطه 100 سم ومساحته اكبر ما يمكن .

2010 تمهيدي

الحل | نفرض ان بعدي المستطيل x, y

$$100 = 2(x + y) \Rightarrow 50 = x + y \Rightarrow x = 50 - y \quad \text{محيط المستطيل} = 2 \text{ (الطول + العرض)}$$

$$A = x \cdot y \quad \text{مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$A = (50 - y) y = 50y - y^2$$

$$A' = 50 - 2y, \quad A' = 0 \Rightarrow 50 - 2y = 0 \Rightarrow y = 25 \text{ cm}$$

بما ان البعدين متساويين فإن المستطيل المطلوب مربعا $x = 50 - 25 = 25 \text{ cm}$ اي ان المستطيل يكون مربعا عندما يكون في نهايته العظمى (مساحته اكبر ما يمكن) $A'' = -2 < 0$

تلميح || لو وجدت قطعة ارض مستطيلة الشكل يحدها نهر من احدى جهاتها واريد تسييجها بسياج طوله 100 متر
مثلا للحصول على اكبر مساحة لهذا المستطيل تكون العلاقة (محيط المستطيل ناقص ضلع $100 = 2x + y$)

جد اقل محيط ممكن لمستطيل مساحته 16 cm^2 الحل || نفرض ان طول المستطيل x ، عرض المستطيل y

2005 دور 1

2006 دور 2

2014 تمهيدي

$$16 = x y \Rightarrow y = \frac{16}{x}$$

مساحة المستطيل = الطول \times العرض

$$P = 2(x + y)$$

محيط المستطيل = $2 \times (\text{الطول} + \text{العرض})$

$$P = 2\left(x + \frac{16}{x}\right) = 2\left(x + 16x^{-1}\right)$$

$$P' = 2\left(1 - 16x^{-2}\right) = 0 \Rightarrow 1 - \frac{16}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 - 16 = 0 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$$

$$y = \frac{16}{4} = 4$$

$$P = 2(4 + 4) = 16 \text{ cm}$$

$$p'' = 2(32x^{-3}) = \frac{64}{x^3} \Rightarrow p''(4) = 1 > 0 \quad \text{اي ان المحيط في نهايته الصغرى (اقل محيط ممكن)}$$

2005 دور 2

صفحة مستوية معدنية مربعة الشكل طول ضلعها 60 cm قطعت من اركانها الاربعة مربعات متساوية المساحة ثم تثبت الاجزاء البارزة لتكون علبة بدون غطاء احسب طول ضلع المربع المقطوع لكي يكون حجم العلبة اكبر مايمكن .

الحل :- نفرض ان طول ضلع المربع المقطوع x

بعد ثني الاجزاء البارزة تكونت علبة على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مربعة طول ضلع القاعدة يساوي

$60 - 2x$ وارتفاعها يساوي x

حجم متوازي المستطيلات V = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = (60 - 2x)^2 \cdot x$$

$$V = (3600 - 240x + 4x^2) \cdot x$$

$$V = 3600x - 240x^2 + 4x^3$$



$$V' = 3600 - 480x + 12x^2$$

$$[3600 - 480x + 12x^2 = 0] \div 12$$

$$300 - 40x + x^2 = 0 \Rightarrow (30 - x)(10 - x) = 0$$

$x = 30$ (طول ضلع المربع المقطوع) OR $x = 10$ (يهمل ذهنيا)

الحجم اكبر مايمكن $V'' = -480 + 24x \Rightarrow V''(10) = -480 + 240 = -240 < 0$



صفحة مستوية معدنية مستطيلة الشكل بعديها 80 cm , 50 cm قطعت من اركانها الاربعة مربعات متساوية المساحة ثم تثبت الاجزاء البارزة لتكون علبة بدون غطاء احسب طول ضلع المربع المقطوع لكي يكون حجم العلبة اكبر مايمكن .

2009 تمميد

الحل ١ نفرض ان طول ضلع المربع المقطوع x

في العلبة الناتجة يكون طول ضلع القاعدة $80 - 2x$ وعرضها $50 - 2x$ وارتفاعها x

حجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = (80 - 2x)(50 - 2x)(x) = (4000 - 160x - 100x + 4x^2) x$$

$$= (4000 - 260x + 4x^2) x = (4000x - 260x^2 + 4x^3)$$

$$V' = 4000 - 520x + 12x^2, \quad V' = 0 \Rightarrow [4000 - 520x + 12x^2 = 0] \div 4$$

$$1000 - 130x + 3x^2 = 0 \Rightarrow (100 - 3x)(10 - x) = 0$$

طول ضلع المربع المقطوع $x = 10$ cm OR $x = \frac{100}{3}$ (يهمل ذهنيا لانه اكبر من نصف العرض)

الحجم اكبر مايمكن $V'' = -520 + 24x \Rightarrow V''(10) = -520 + 240 < 0$

جد العدد الذي زيادته على مربعه اكبر مايمكن

الحل :- نفرض العدد x ومربعه x^2

2007 تممحي

$$h = x - x^2$$

$$h' = 1 - 2x \Rightarrow 1 - 2x = 0 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

العدد الناتج هو اكبر مايمكن $\Rightarrow h'' = -2 < 0$

عزيزي الطالب | قد يحور السؤال السابق ليكون جد العدد الذي نقصانه على مربعه اصغر مايمكن فتكون القاعدة $h = x^2 - x$ عندها ستكون المشتقة الثانية في نهايتها الصغرى

جد العدد الذي اذا اضيف الى نظيره الضربي يكون الناتج اكبر مايمكن

الحل | نفرض ان العدد x ونظيره الضربي $\frac{1}{x}$

2014 دور 3

2013 خارج الحظر

$$A = x + \frac{1}{x} \Rightarrow A = x + x^{-1}$$

$$A' = 1 - x^{-2} \Rightarrow [1 - \frac{1}{x^2} = 0] \cdot x^2 \Rightarrow x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$A'' = 2x^{-3} \Rightarrow A'' = \frac{2}{x^3}$$

في نهايته الصغرى (اصغر مايمكن) $A''(1) = 2 > 0$ في نهايته العظمى (اكبر مايمكن) $A''(-1) = -2 < 0$

اي ان العدد المطلوب يساوي (-1)

تلميح || هذا الحل هو الذي يعتمد في الجواب النموذجي ومايريده واضع السؤال ولكن السؤال لا يخلو من خلل لغوي لان الاختبار اظهر ان العدد -1 هو اكبر عدد مطلوب لكن عند اجراء اختبار على العدد 1 مثلاً نجد ان ناتج اضافته الى نظيره الضربي ينتج عنه 2 وهو اكبر من ناتج اضافة -1 الى نظيره الضربي وهو -2 وان كل الاعداد الموجبة الاخرى تظهر نتائج اكبر من ذلك لذا فان السؤال بوضعه اللفظي الحالي يخالف المنطق الرياضي ولتدارك هذا الخلل يجب ان يكون السؤال باحدى الصيغتين التاليتين

جد اكبر عدد سالب عند اضافته الى نظيره الضربي يكون الناتج في نهايته العظمى

جد اصغر عدد موجب عند اضافته الى نظيره الضربي يكون الناتج في نهايته الصغرى

برنامج رحلتي في السادس

جد العددين الموجبين اللذين مجموعهما 75 وحاصل ضرب احدهما في مربع الاخر اكبر مايمكن
الحل :- نفرض العدد الاول x ونفرض العدد الثاني y

2014 دور 4 انبار

$$x + y = 75 \Rightarrow x = 75 - y$$

$$h = x y^2 \Rightarrow h = (75 - y) y^2 = 75y^2 - y^3$$

$$h' = 150y - 3y^2 \Rightarrow 150y - 3y^2 = 0 \Rightarrow 3y(50 - y) = 0$$

$$y = 0 \text{ يهمل } \text{OR } y = 50$$

$$x = 75 - 50 = 25 \Rightarrow \{ 50, 25 \} \text{ العدان هما}$$

$$h'' = 150 - 6y \Rightarrow h''(50) = 150 - 300 = -150 < 0 \Rightarrow \text{الجواب يمثل اكبر مايمكن}$$

لتكن $y^2 = 8x$ جد نقطة تنتمي الى المنحني وتكون اقرب مايمكن الى النقطة (6,0).

p(x, y) نفرض النقطة

الحل :-

2002 دور 1

$$y^2 = 8x \Rightarrow$$

$$P = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x - 6)^2 + (y - 0)^2}$$

$$P = \sqrt{x^2 - 12x + 36 + y^2}$$

$$P = \sqrt{x^2 - 12x + 36 + 8x} = \sqrt{x^2 - 4x + 36}$$

$$P' = \frac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+36}} \Rightarrow \frac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+36}} = 0 \Rightarrow 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 4$$

$$\{ (2, 4), (2, -4) \} \text{ مجموعة الحل}$$

اذا كان $y + 4x = 24$ فجد قيمتي x, y التي تجعل $y x^2$ اكبر مايمكن.

2008 تميمي

$$y + 4x = 24 \Rightarrow y = 24 - 4x$$

$$A = y x^2$$

$$A = (24 - 4x)x^2 \Rightarrow A = 24x^2 - 4x^3$$

$$A' = 48x - 12x^2 \Rightarrow 12x(4 - x) = 0$$

$$\text{either } x = 0 \text{ تهمل}$$

$$\text{or } x = 4 \Rightarrow y = 24 - 16 = 8$$

$$A'' = 48 - 24x \Rightarrow A''(4) = 48 - 96 = -48 \text{ اي ان القيم الناتجة في نهايتها العظمى}$$

جد نقطة او اكثر تنتمي الى القطع الزائد $y^2 - x^2 = 3$ بحيث تكون اقرب مايمكن الى النقطة (0,4)

2011 دور 2

2013 دور 1

2012 تمهيدي

2015 دور 2 في

2016 دور 2 في

نفرض النقطة $p(x, y)$

$$y^2 - x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = y^2 - 3 \Rightarrow x = \pm \sqrt{y^2 - 3}$$

$$P = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 4)^2}$$

$$P = \sqrt{x^2 + y^2 - 8y + 16}$$

$$P = \sqrt{y^2 - 3 + y^2 - 8y + 16} = \sqrt{2y^2 - 8y + 13}$$

$$P' = \frac{4y-8}{2\sqrt{2y^2-8y+13}} \Rightarrow \frac{4y-8}{2\sqrt{2y^2-8y+13}} = 0 \Rightarrow 4y-8=0 \Rightarrow y=2$$

$$x = \pm \sqrt{4-3} \Rightarrow x = \pm 1$$

مجموعة الحل $\{(1, 2), (-1, 2)\}$

جد نقطة تنتمي الى المنحني $y^2 - x^2 = 5$ لكي تكون اقرب مايمكن من النقطة (4, 0)

2015 دور 2

ans: المنحني $\in (2, 3), (2, -3)$

جد بعدي اكبر مستطيل يوضع داخل المنطقة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = 12 - x^2$ ومحور السينات بحيث ان رأسان من رؤوسه على المنحني والرأسان الآخران على محور السينات ثم جد محيطه .

2012 دور 2

2007 خارج القطر

حل :- نفرض ان العرض $= 2x$ والطول $= y$ (لأن المنحني متناظر حول محور الصادات)

$$y = 12 - x^2$$

$$A = 2x \cdot y$$

مساحة المستطيل = الطول \times العرض

$$A = 2x(12 - x^2) \Rightarrow A = 24x - 2x^3$$

$$A' = 24 - 6x^2 \Rightarrow 24 - 6x^2$$


$$6x^2 = 24 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$y = 12 - 4 \Rightarrow y = 8$$

$$2x = 4 \text{ العرض , } y = 8 \text{ الطول}$$

$$M = (y + 2x) \cdot 2 \quad \text{محيط المستطيل} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$$

$$M = (8 + 4) (2) = 24 \text{ وحدة طول}$$



س // مثلث متساوي الساقين abc فيه
bc يوازي محور السينات من الاعلى ، a
تقع على نقطة الاصل ، c ، b يتبين الى
المنحني $y = 12 - x^2$ جد اكبر مساحة
لسطح المثلث .
الجواب { 16 } وحدة مربعة

جد ابعاد اسطوانة دائرية قائمة مساحتها الجانبية اكبر مايمكن موضوعة داخل كرة مجوفة
صف قطرها $6\sqrt{2} \text{ cm}$

1999 دور 1

الحل :- نفرض ان نصف قطر الاسطوانة x ، نفرض ارتفاع الاسطوانة $2h$

$$(6\sqrt{2})^2 = x^2 + h^2 \Rightarrow 72 = x^2 + h^2$$

$$x^2 = 72 - h^2 \Rightarrow x = \sqrt{72 - h^2}$$

المساحة الجانبية = محيط القاعدة \times الارتفاع

$$A = 2\pi x (2h) = 4\pi xh$$

$$A = 4\pi h\sqrt{72 - h^2} \Rightarrow A = 4\pi \sqrt{h^2(72 - h^2)}$$

$$A = 4\pi \sqrt{72h^2 - h^4}$$


$$A' = 4\pi \frac{144h - 4h^3}{2\sqrt{72h^2 - h^4}} \Rightarrow 4\pi \frac{144h - 4h^3}{2\sqrt{72h^2 - h^4}} = 0$$

$$144h - 4h^3 = 0 \Rightarrow 4h(36 - h^2) = 0$$

$$h^2 = 36 \Rightarrow h = 6$$

$$x^2 = 72 - 36 = 36 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow 2h = 12$$
 ارتفاع الاسطوانة

تلميح || لاحظ ان القاعدة التي تم اشتقاقها هي المساحة الجانبية للاسطوانة ، فلو كان السؤال جد المساحة الجانبية لأكبر اسطوانة دائرية
توضع داخل كرة نصف قطرها $6\sqrt{2}$ لكنت القاعدة قانون حجم الاسطوانة وبعد ايجاد الابعاد نعوضها بقانون المساحة الجانبية



جد بعدي اكبر اسطوانة دائرية قائمة يمكن وضعها داخل كرة مجوفة طول نصف قطرها $2\sqrt{3} \text{ cm}$

2001 دور 2

الحل :- نفرض ان نصف قطر الاسطوانة x ، نفرض ارتفاع الاسطوانة $2h$

$$(2\sqrt{3})^2 = x^2 + h^2 \Rightarrow 12 = x^2 + h^2$$

$$x^2 = 12 - h^2$$

حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = \pi x^2 (2h) = 2\pi x^2 h$$

$$V = 2\pi h(12 - h^2) \Rightarrow V = 2\pi (12h - h^3)$$


$$V' = 2\pi (12 - 3h^2) \Rightarrow 2\pi (12 - 3h^2) = 0$$

$$12 - 3h^2 = 0 \Rightarrow 3h^2 = 12 \Rightarrow h^2 = 4 \Rightarrow h = 2$$

$$x^2 = 12 - 4 = 8 \Rightarrow x = 2\sqrt{2}$$
 نصف قطر قاعدة الاسطوانة

$$2h = 4$$
 ارتفاع الاسطوانة

تلميح || لو طلب ايجاد بعدي اكبر اسطوانة يمكن وضعها داخل كرة نصف قطرها معلوم عندها سنفرض ان نصف قطر الكرة a
ونكمل الحل حسب ماتقدم ويكون الجواب النهائي بدلالة a



جد ارتفاع اكبر اسطوانة دائرية قائمة يمكن وضعها داخل كرة مجوفة طول نصف قطرها $4\sqrt{3} \text{ cm}$

2012 دور 3

الحل :- نفرض ان نصف قطر الاسطوانة x ، نفرض ارتفاع الاسطوانة $2h$

$$(4\sqrt{3})^2 = x^2 + h^2 \Rightarrow 48 = x^2 + h^2$$

$$x^2 = 48 - h^2$$

حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = \pi x^2 (2h) = 2\pi x^2 h$$


$$V = 2\pi h(48 - h^2) \Rightarrow V = 2\pi (48h - h^3)$$

$$V' = 2\pi (48 - 3h^2) \Rightarrow 2\pi (48 - 3h^2) = 0$$

$$48 - 3h^2 = 0 \Rightarrow 3h^2 = 48 \Rightarrow h^2 = 16 \Rightarrow h = 4$$

$$x^2 = 48 - 16 = 32 \Rightarrow x = 4\sqrt{2} \text{ نصف قطر قاعدة الاسطوانة}$$

$$2h = 8 \text{ ارتفاع الاسطوانة}$$




تأكيد || اكبر اسطوانة توضع داخل كرة يكون مركز الكرة منصف لارتفاع الاسطوانة وعليه فرضنا الارتفاع $2h$ لاننا سنحتاج الى احد القسمين لرسم المثلث القائم الزاوية . ويمكن استبدال الرسم بالشكل التالي فتتغير الفرضية

في هذه الحالة نبقى الارتفاع h لان القطر الكامل هو الذي يكون المثلث القائم وعليه ستكون العلاقة في السؤال

$$128 = h^2 + (2r)^2 \Rightarrow 128 = h^2 + 4r^2$$

$$r^2 = \frac{1}{4} (128 - h^2)$$

$$v = \pi r^2 h \text{ اكمل الحل وسترى نفس النتائج}$$



برنامج رحلتي في السادس

جد حجم اكبر مخروط دائري قائم يمكن وضعه داخل كرة مجوفة نصف قطرها 3 cm .

2008 دور 1

ان نصف قطر قاعدة المخروط x ، ارتفاع المخروط h

$$9 = x^2 + (h - 3)^2 \Rightarrow 9 = x^2 + h^2 - 6h + 9$$

$$x^2 = 6h - h^2$$

$$V = \frac{\pi}{3} x^2 h$$


$$V = \frac{\pi}{3} (6h - h^2) h \Rightarrow V = \frac{\pi}{3} (6h^2 - h^3)$$

$$V' = \frac{\pi}{3} (12h - 3h^2) = 0 \Rightarrow 12h - 3h^2 = 0 \Rightarrow 3h(4 - h) = 0$$

either $h = 0$ يهمل

$$\text{OR } h = 4 \Rightarrow x^2 = 24 - 16 = 8$$

$$V = \frac{\pi}{3} (8)(4) = \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^3$$



جد اكبر مساحة لمثلث متساوي الساقين طول كل من ساقيه $8\sqrt{2}$ cm .

2016 تمهيدي

الحل :- نفرض ان طول القاعدة $2x$ ، الارتفاع y

$$(8\sqrt{2})^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 128 = x^2 + y^2$$

$$x^2 = 128 - y^2 \Rightarrow x = \sqrt{128 - y^2}$$

$$A = \frac{1}{2} 2x \cdot y \quad \text{مساحة المثلث} = \text{نصف طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$A = y \sqrt{128 - y^2} \Rightarrow A = \sqrt{y^2} \sqrt{128 - y^2} \Rightarrow A = \sqrt{128y^2 - y^4}$$


$$A' = \frac{(256y - 4y^3)}{2\sqrt{128y^2 - y^4}} = 0$$

$$256y - 4y^3 = 0 \Rightarrow 4y(64 - y^2) = 0$$

$$4y = 0 \Rightarrow y = 0 \quad \text{يهمل} \quad \text{OR } y^2 = 64 \Rightarrow y = 8$$

$$x = \sqrt{128 - 64} = \sqrt{64} \Rightarrow x = 8$$

$$2x = 16 \text{ cm} \quad \text{طول القاعدة} , y = 8 \text{ cm} \quad \text{الارتفاع} , A = 64 \text{ cm}^2$$



Mob: 07902162268

140

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

ند مساحة اكبر مثلث متساوي الساقين يمكن رسمه داخل دائرة نصف قطرها 6 cm .

2003 دور 1

2006 تمهيدي

2010 دور 2

الحل :- نفرض ان طول قاعدة المثلث = $2x$ ، ارتفاع المثلث = h

$$(6)^2 = x^2 + (h - 6)^2$$

$$36 = x^2 + h^2 - 12h + 36$$

$$x^2 = 12h - h^2 \Rightarrow x = \sqrt{12h - h^2}$$

$$A = \frac{1}{2} (2x) (h) \quad \text{مساحة المثلث} = \text{نصف القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$A = h \sqrt{12h - h^2}$$


$$A = \sqrt{h^2 \sqrt{12h - h^2}} = \sqrt{12h^3 - h^4} ; h > 0$$

$$A' = \frac{36h^2 - 4h^3}{2\sqrt{24h^3 - h^4}} = 0 \Rightarrow 36h^2 - 4h^3 = 0 \Rightarrow 4h^2(9 - h) = 0$$

$$4h^2 = 0 \Rightarrow h = 0 \quad \text{يهمل} \quad \text{OR} \quad 9 - h = 0 \Rightarrow h = 9 \text{ cm}$$

$$x = \sqrt{108 - 81} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \text{ cm} \Rightarrow 2x = 2 \cdot 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \text{ cm} \quad \text{طول القاعدة}$$

$$A = 27\sqrt{3} \text{ cm}^2$$



ند بعدي اكبر مثلث متساوي الساقين يمكن وضعه داخل دائرة نصف قطرها 12 cm نفس فكرة السؤال السابق

2012 خارج المنهج

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

141

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2011 دور 1

2014 دور 1

مثلث قائم الزاوية طول وتره $6\sqrt{3} \text{ cm}$ ادير حول احد ضلعيه القائمين فتكون مخروط دائري قائم ، جد طولي الضلعين القائمين بحيث يكون حجم المخروط المتكون اكبر ما يمكن .

الحل :- عند دوران المثلث القائم حول احد اضلاعه القائمة فان الشكل المتكون هو مخروط نصف قطر قاعدته وارتفاعه هما الضلعين القائمين

نفرض ان نصف قطر قاعدة المخروط = x ، ارتفاع المخروط = h

$$(6\sqrt{3})^2 = x^2 + h^2 \Rightarrow 108 = x^2 + h^2$$

$$x^2 = 108 - h^2$$

حجم المخروط = ثلث مساحة القاعدة \times الارتفاع

$$V = \frac{\pi}{3} x^2 h$$


$$V = \frac{\pi}{3} h (108 - h^2) \Rightarrow V = \frac{\pi}{3} (108h - h^3)$$

$$V' = \frac{\pi}{3} (108 - 3h^2) \Rightarrow \frac{\pi}{3} (108 - 3h^2) = 0$$

$$108 - 3h^2 = 0 \Rightarrow 3h^2 = 108 \Rightarrow h^2 = 36 \Rightarrow h = 6$$

$$x^2 = 108 - 36 = 72 \Rightarrow x = 6\sqrt{2}$$
 نصف قطر قاعدة الاسطوانة

$$V = \frac{\pi}{3} (72)(6) \Rightarrow V = 144\pi \text{ cm}^3$$



خروط دائري قائم طول مولده $9\sqrt{3} \text{ cm}$ جد ارتفاع هذا المخروط لكي يكون حجمه اكبر مايمكن

2006 دور 1

مثلث قائم الزاوية طول وتره $4\sqrt{3} \text{ cm}$ ادير حول احد ضلعيه القائمين فتكون مخروط دائري قائم ، جد طولي الضلعين القائمين بحيث يكون حجم المخروط المتكون اكبر ما يمكن .

2009 دور 2

تلميح ١١ فكرة هذا السؤال تردت في اربع نماذج وزارية باختلاف طول المولد او الوتر في المثلث القائم مع التأكيد ان المثلث القائم الزاوية اذا ادير حول احد ضلعيه القائمين فان الشكل المتكون هو مخروط اما المربع اذا ادير حول احد اضلاعه الاربعة فان الشكل المتكون هو اسطوانة ارتفاعها يساوي طول نصف قطر قاعدتها ، اما المستطيل اذا ادير حول احد اضلاعه فان الشكل المتكون هو اسطوانة .

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

142

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد مساحة اكبر مستطيل يمكن رسمه داخل نصف دائرة نصف قطرها $4\sqrt{2}\text{cm}$

2012 دور 1

2013 تمميدى

لحل :- نفرض ان الطول $2x$ والعرض y

مركز الدائرة يقسم الطول الى قسمين متساويين ونصف قطر الدائرة يصنع مع البعدين x , y مثلث قائم الزاوية

$$(4\sqrt{2})^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 32 = x^2 + y^2$$

$$x^2 = 32 - y^2 \Rightarrow x = \sqrt{32 - y^2}$$

مساحة المستطيل = الطول \times العرض $A = 2x \cdot y$

$$A = 2y \sqrt{32 - y^2} \Rightarrow A = 2 \sqrt{y^2} \sqrt{32 - y^2} \Rightarrow A = 2\sqrt{32y^2 - y^4}$$


$$A' = \frac{2(64y - 4y^3)}{2\sqrt{32y^2 - y^4}} = 0$$

$$64y - 4y^3 = 0 \Rightarrow 4y(16 - y^2) = 0$$

$$4y = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ يهمل OR } y^2 = 16 \Rightarrow y = 4$$

$$x = \sqrt{32 - 16} = \sqrt{16} \Rightarrow x = 4$$

$$2x = 8\text{cm} \text{ الطول , } y = 4\text{cm} \text{ العرض}$$



جد مساحة اكبر مستطيل يمكن رسمه داخل نصف دائرة نصف قطرها 6 cm **نفس الاسلوب**

2009 دور 1

تأكيد || لو ان المستطيل يرسم داخل دائرة كاملة سنفرض بعديه $2x$, $2y$ وتكون مساحته

2015 دورة 4

$$A = 2x \cdot 2y = 4xy \text{ ساوي}$$

جد مساحة اكبر مستطيل يوضع داخل نصف دائرة نصف قطرها 8 cm .

2016 دور 1

برنامج رحلتي في السادس

جد حجم اكبر اسطوانة دائرية قائمة يمكن وضعها داخل مخروط دائري قائم ارتفاعه 8 سم ونصف قطر قاعدته 6 سم .

1997 دور اول

الحل // نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة x ، ارتفاع الاسطوانة h

من تشابه المثلثين abc , aef

$$\frac{x}{6} = \frac{8-h}{8}$$

$$8x = 6(8 - h) \Rightarrow 4x = 24 - 3h$$

$$3h = 24 - 4x \Rightarrow h = \frac{1}{3}(24 - 4x)$$

حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع $V = \pi x^2 h$

$$V = \pi x^2 \frac{1}{3}(24 - 4x) \Rightarrow V = \frac{\pi}{3} (24x^2 - 4x^3)$$

$$V' = \frac{\pi}{3} (48x - 12x^2) \Rightarrow 48x - 12x^2 = 0$$


$$12x(4 - x) = 0$$

$$12x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ يهمل} \quad \text{OR } x = 4 \text{ cm} \Rightarrow h = \frac{1}{3}(24 - 16) = \frac{8}{3} \text{ cm}$$

المساحة السطحية = محيط القاعدة \times الارتفاع + 2 \times مساحة القاعدة $A = 2\pi x h + 2\pi x^2$

$$A = 2\pi (4)\left(\frac{8}{3}\right) + 2\pi (4)^2 = \frac{160}{3}\pi \text{ cm}^2$$

تلميح // السؤال الوزاري الاصلي فيه نصف القطر 9 وارتفاع المخروط 12 تم استبدال القيم لينطبق مع سؤال التمارين في الكتاب المنهجي .



جد ابعاد اكبر اسطوانة دائرية قائمة توضع داخل مخروط دائري قائم ارتفاعه

6cm وطول قطر قاعدته يساوي 8cm .

2015 ناربعين ح1

الحل // نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة x ، ارتفاع الاسطوانة h

من تشابه المثلثين abc , adf

$$\frac{x}{4} = \frac{6-h}{6}$$

$$6x = 4(6 - h) \Rightarrow 6x = 24 - 4h$$

$$4h = 24 - 6x \Rightarrow h = \frac{1}{2}(12 - 3x)$$


حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة \times الارتفاع $V = \pi x^2 h$

$$V = \pi x^2 \frac{1}{2}(12 - 3x) \Rightarrow V = \frac{\pi}{2} (12x^2 - 3x^3)$$

$$V' = \frac{\pi}{2} (24x - 9x^2) \Rightarrow 24x - 9x^2 = 0$$

$$3x(8 - 3x) = 0$$

$$3x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ يهمل} \quad \text{OR } x = \frac{8}{3} \text{ cm} \Rightarrow h = \frac{1}{2}(12 - 8) = 2 \text{ cm}$$



جد ابعاد اكبر اسطوانة دائرية قائمة توضع داخل مخروط دائري قائم ارتفاعه 6cm وطول قطر قاعدته يساوي 10cm .

2016 دور اول

الحل // نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة x ، ارتفاع الاسطوانة h

من تشابه المثلثين abc , adf

$$\frac{x}{5} = \frac{6-h}{6}$$

$$6x = 5(6 - h) \Rightarrow 6x = 30 - 5h$$

$$5h = 30 - 6x \Rightarrow h = \frac{2}{5}(15 - 3x)$$


حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة x الارتفاع

$$V = \pi x^2 \left[\frac{2}{5}(15 - 3x) \right] \Rightarrow V = \frac{2\pi}{5} (15x^2 - 3x^3)$$

$$V' = \frac{2\pi}{5} (30x - 9x^2) \Rightarrow 30x - 9x^2 = 0$$

$$3x(10 - 3x) = 0$$

$$3x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ يهمل} \quad \text{OR} \quad x = \frac{10}{3} \text{ cm} \Rightarrow h = \frac{2}{5}(15 - 10) =$$



السؤال منهجي جدا وتم تغيير بسيط في ارتفاع المخروط وطول قطر قاعدته وقد ورد هذا السؤال مرتين في الامتحان الوزاري احدهما نصا من الكتاب والآخر تغيير بسيط في الارقام .

مخروط دائري قائم نصف قطر قاعدته 4 cm وارتفاعه 12 cm يراد قطع مخروط دائري منه يرتكز رأسه في مركز قاعدة المخروط الاصلي وقاعدته توازي قاعدة المخروط الاصلي ، جد ابعاد المخروط المقطوع بحيث يكون حجمه اكبر مايمكن .

2003 دور 2

الحل // نفرض ان نصف قطر قاعدة الاسطوانة x ، ارتفاع الاسطوانة h

من تشابه المثلثين abc , aef

$$\frac{x}{4} = \frac{12-h}{12}$$

$$12x = 4(12 - h) \Rightarrow 3x = 12 - h$$

$$h = 12 - 3x$$


حجم الاسطوانة = مساحة القاعدة x الارتفاع

$$V = \frac{\pi}{3} x^2 (12 - 3x) \Rightarrow V = \frac{\pi}{3} (12x^2 - 3x^3)$$

$$V' = \frac{\pi}{3} (24x - 9x^2) \Rightarrow 24x - 9x^2 = 0$$

$$3x(8 - 3x) = 0$$

$$3x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ يهمل} \quad \text{OR} \quad x = \frac{8}{3} \text{ cm} \Rightarrow h = (12 - 8) = 4 \text{ cm} \text{ بعدي المخروط المطلوب}$$



1998 دور 2

ند ابعاد مخروط دائري قائم حجمه اقل ما يمكن ويحيط بكرة نصف قطرها 3 سم .

الحل || نفرض ان نصف قطر قاعدة المخروط = x ، وارتفاعه = h

abc في المثلث

$$(h - 3)^2 = 9 + (ab)^2 \Rightarrow h^2 - 6h + 9 = 9 + (ab)^2$$

$$(ab)^2 = h^2 - 6h \Rightarrow ab = \sqrt{h^2 - 6h}$$

من تشابه المثلثين abc , ade

$$\frac{h}{\sqrt{h^2 - 6h}} = \frac{x}{3} \Rightarrow x \sqrt{h^2 - 6h} = 3h$$

$$x = \frac{3h}{\sqrt{h^2 - 6h}}$$

$$v = \frac{\pi}{3} x^2 h \Rightarrow v = \frac{\pi}{3} h \left(\frac{9h^2}{h^2 - 6h} \right)$$


$$v = 3\pi \left(\frac{h^2}{h - 6} \right)$$

$$v' = 3\pi \left(\frac{(h-6)2h - h^2 \cdot 1}{(h-6)^2} \right) = 0$$

$$2h^2 - 12h - h^2 = 0 \Rightarrow h^2 - 12h = 0$$

$$h(h - 12) = 0 \Rightarrow \text{يهمل } h = 0 \text{ OR } h = 12 \text{ ارتفاع المخروط}$$

$$x = \frac{36}{\sqrt{72}} = \frac{36}{6\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$



برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

146

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

ند مساحة اصغر مثلث متساوي الساقين يمكن رسمه خارج دائرة نصف قطرها 3 سم .

حل ١١ نفرض ان طول قاعدة المثلث = $2x$ ، وارتفاعه = h

2008 خارج القطر

acb في المثلث

$$(h - 3)^2 = 9 + (ac)^2 \Rightarrow h^2 - 6h + 9 = 9 + (ac)^2$$

$$(ac)^2 = h^2 - 6h \Rightarrow ac = \sqrt{h^2 - 6h}$$

من تشابه المثلثين acb , ade

$$\frac{h}{\sqrt{h^2 - 6h}} = \frac{x}{3} \Rightarrow x \sqrt{h^2 - 6h} = 3h$$

$$x = \frac{3h}{\sqrt{h^2 - 6h}}$$

$$A = \frac{1}{2} 2x \cdot h = xh \Rightarrow A = \left(\frac{3h}{\sqrt{h^2 - 6h}} \cdot h \right)$$

$$A = \left(\frac{3h^2}{\sqrt{h^2 - 6h}} \right)$$

$$A' = \frac{\sqrt{h^2 - 6h} \cdot 6h - 3h^2 \cdot \frac{2h-6}{2\sqrt{h^2 - 6h}}}{\sqrt{h^2 - 6h}} = 0$$


$$[\sqrt{h^2 - 6h} \cdot 6h - 3h^2 \cdot \frac{2h-6}{2\sqrt{h^2 - 6h}} = 0] \cdot 2\sqrt{h^2 - 6h}$$

$$12h(h^2 - 6h) - 3h^2(2h - 6) = 0$$

$$12h^3 - 72h^2 - 6h^3 + 18h^2 = 0$$

$$6h^3 - 54h^2 = 0 \Rightarrow 6h^2(h - 9) = 0 \Rightarrow \text{either } h = 0 \text{ يهمل OR } h = 9 \text{ cm}$$

$$x = \frac{27}{\sqrt{81-54}} = \frac{27}{\sqrt{27}} = 3\sqrt{3} \text{ cm} \Rightarrow A = 3\sqrt{3} \cdot 9 = 27\sqrt{3} \text{ cm}^2$$



برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

147

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

abc مثلث فيه $ad = 20 \text{ cm}$ ، $bc = 12 \text{ cm}$ ، $ad \perp bc$ ، $ab = ac$ جد بعدي اكبر
كبر مستطيل يمكن رسمه داخل هذا المثلث .

2000 دور 1

2007 دور 1 \ جد اكبر مستطيل يمكن رسمه داخل مثلث متساوي الساقين طول قاعدته 20 سم وارتفاعه 12 سم.

الحل :- نفرض ان بعدي المستطيل $2x$, y

من تشابه المثلثين abd , aei

$$\frac{20-y}{20} = \frac{2x}{12} \Rightarrow [40x = 12(20 - y)] \div 4$$

$$10x = 3(20 - y) \Rightarrow x = \frac{3}{10} (20 - y)$$


مساحة المستطيل = الطول \times العرض $A = 2x \cdot y$

$$A = \frac{3}{5} (20 - y) \cdot y = \frac{3}{5} (20y - y^2)$$

$$A' = \frac{3}{5} (20 - 2y) = 0 \Rightarrow 20 - 2y = 0$$

$$y = 10 \text{ cm} \Rightarrow x = \frac{3}{10} (20 - 10) \Rightarrow x = 3 \text{ cm}$$

$2x = 6 \text{ cm}$, $y = 10 \text{ cm}$ بعدي المستطيل هما



تلميح 1 || لو علم في المثلث طول كل من الساقين والقاعدة او طول كل من الساقين والارتفاع فيجب احتساب الارتفاع في الحالة الاولى واحتساب القاعدة في الحالة الثانية عن طريق فيثاغورس قبل البدء برسم المستطيل مع التأكيد على ان العمود النازل من رأس مثلث متساوي الساقين على القاعدة ينصفها ، حيث انه لا يمكن ايجاد ابعاد اكبر مستطيل يرسم داخل مثلث الا اذا علم في المثلث طول قاعدته وارتفاعه .

تلميح 2 || لو علم بعدي هذا المستطيل في السؤال وهما 6 , 10 وطلب ايجاد مساحة اصغر مثلث يحيط بهذا المستطيل بحيث ان رأسين من رؤوس المستطيل يقعان على قاعدة المثلث والرأسين الاخرين على ساقيه لفرضنا ان طول قاعدة المثلث $2x$ والارتفاع h عندها سينتج من التشابه $\frac{6}{2x} = \frac{h-10}{h}$ حاول تكمل الحل للحصول على مثلث طول قاعدته 12 سم وطول ارتفاعه 20 سم ... وقتا ممتعا اتمناه لكم .

برنامج رحلتي في السادس

د مساحة اكبر مستطيل يمكن رسمه داخل مثلث متساوي الاضلاع ارتفاعه $(4\sqrt{3} \text{ cm})$

2008 دور 2

الحل :- نفرض ان طول كل من اضلاع المثلث $2L$ فيكون في المثلث agi

$$(2L)^2 = L^2 + 48 \Rightarrow 4L^2 = L^2 + 48 \Rightarrow 3L^2 = 48 \Rightarrow L^2 = 16 \Rightarrow L = 4 \Rightarrow 2L = 8$$

نفرض ان بعدي المستطيل $2x, y$

من تشابه المثلثين abd, aei

$$\frac{4\sqrt{3}-y}{4\sqrt{3}} = \frac{2x}{8} \Rightarrow [8\sqrt{3}x = 8(4\sqrt{3}-y)] \div 8$$

$$\sqrt{3}x = (4\sqrt{3}-y) \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}-y)$$


مساحة المستطيل = الطول \times العرض $A = 2x \cdot y$

$$A = \frac{2}{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}-y) \cdot y = \frac{2}{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}y - y^2)$$

$$A' = \frac{2}{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}-2y) = 0 \Rightarrow 4\sqrt{3}-2y = 0$$

$$y = 2\sqrt{3} \text{ cm} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}-2\sqrt{3}) \Rightarrow x = 2 \text{ cm}$$

$2x = 4 \text{ cm}$, $y = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ بعدي المستطيل هما



د بعدي اكبر مستطيل يمكن رسمه داخل مثلث طول قاعدته 24 cm وارتفاعه 18 cm بحيث أسين متجاورين من رؤوسه يقعان على القاعدة والرأسان الآخران يقعان على ساقيه

2013 دور 2

المستطيل $x = a$ ، نفرض عرض المستطيل y

2015 تمهيدي

من تشابه المثلثين abc, aef

$$\frac{18-y}{18} = \frac{x}{24} \Rightarrow [18x = 24(18-y)] \div 6$$

$$3x = 4(18-y) \Rightarrow x = \frac{4}{3}(18-y)$$


مساحة المستطيل = الطول \times العرض $A = x \cdot y$

$$A = \frac{4}{3}(18-y) \cdot y = \frac{4}{3}(18y - y^2)$$

$$A' = \frac{4}{3}(18-2y) = 0 \Rightarrow 18-2y = 0$$

$$y = 9 \text{ cm} \Rightarrow x = \frac{4}{3}(18-9) \Rightarrow x = 12 \text{ cm}$$

أي ان للمنحني نهاية عظمى وبالتالي تكون لهذا الابعاد اكبر مساحة ممكنة لسطح المستطيل $A'' = \frac{4}{3}(-2) < 0$



2011 خارج العطر

ند معادلة المستقيم المار بالنقطة (6,8) والذي يصنع مع المحورين في الربع الاول اصغر مثلث

الحل :- نفرض نقطة التقاطع مع محور السينات (x, 0) ،

نفرض نقطة التقاطع مع محور الصادات (0, y)

من تشابه المثلثين abc , aef

$$\frac{6}{x} = \frac{y-8}{y} \Rightarrow 6y = x(y-8) \Rightarrow x = \frac{6y}{y-8}$$

$$A = \frac{1}{2} x y \quad \text{مساحة المثلث} = \text{نصف القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$A = \frac{1}{2} y \left(\frac{6y}{y-8} \right) \Rightarrow A = \frac{3y^2}{y-8}$$

$$A' = \frac{(y-8) \cdot 6y - 3y^2 \cdot 1}{(y-8)^2} = \frac{6y^2 - 48y - 3y^2}{(y-8)^2}$$

$$\frac{6y^2 - 48y - 3y^2}{(y-8)^2} = 0 \Rightarrow 3y^2 - 48y = 0$$


$$3y(y - 16) = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ يهمل} \text{ OR } y = 16$$

$$x = \frac{(6)(16)}{16-8} \Rightarrow x = 12 \Rightarrow (12, 0) , (0, 16)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{16-0}{0-12} = -\frac{4}{3}$$

$$(y - y_1) = m(x - x_1) \Rightarrow (y - 16) = -\frac{4}{3}(x - 0)$$

$$3y - 48 = -4x \Rightarrow 4x + 3y - 48 = 0 \text{ معادلة المستقيم}$$



برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

150

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

حلول الاسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الرابع (التكامل وتطبيقاته)

جد قيمة تقريبية للتكامل $\int_1^3 \frac{3}{x} dx$ باستخدام التجزئة $\sigma = (1, 2, 3)$

2011 خارج القطر

الحل :-

$$\because f(x) = \frac{3}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{-3}{x^2} \Rightarrow \frac{-3}{x^2} \neq 0$$

ولان $\sigma = (1, 2, 3)$ لنك سوف نقسم الفترة $[1, 3]$ الى قسمين وكما يلي

وسيتم حساب كلا من المجموع الاعلى والمجموع الاسفل حسب الجدول التالي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(b)$	$M_i = f(a)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[1 , 2]	$2 - 1 = 1$	$m_1 = \frac{3}{2}$	$M_1 = 3$	$L_1 = (1)(\frac{3}{2}) = \frac{3}{2}$	$U_1 = (1)(3) = 3$
[2 , 3]	$3 - 2 = 1$	$m_2 = 1$	$M_2 = \frac{3}{2}$	$L_2 = (1)(1) = 1$	$U_2 = (1)(\frac{3}{2}) = \frac{3}{2}$
				$L(\sigma, f) = \frac{5}{2}$	$U(\sigma, f) = \frac{9}{2}$

$$\int_1^3 \frac{3}{x} dx = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{\frac{5}{2} + \frac{9}{2}}{2} = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ unit}^2$$

برنامج رحلتي في السادس

جد $L(\sigma, f)$ ، $U(\sigma, f)$ حيث ان $f: [-2, 1] \Rightarrow \mathbb{R}$ ، $f(x) = 3 - x$ ، $\sigma = (-2, 0, 1)$ ،

2012 خارج العطر

sol :

$$\sigma = (-2, 0, 1)$$

$$\because f(x) = 3 - x \Rightarrow f'(x) = -1 < 0$$

أي ان الدالة متناقصة في كل مجالها ولا توجد نقاط حرجة لذلك فان اصغر واكبر قيمة ستكون عند احد طرفي كل فترة ولان $\sigma = (-2, 0, 1)$ لذلك سوف نقسم الفترة $[-2, 1]$ الى قسمين وكما يلي وسيتم حساب كلا من المجموع الاعلى والمجموع الاسفل حسب الجدول التالي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(b)$	$M_i = f(a)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
$[-2, 0]$	$0 - (-2) = 2$	$m_1 = 3 - 0 = 3$	$M_1 = 3 - (-2) = 5$	$L_1 = (2)(3) = 6$	$U_1 = (2)(5) = 10$
$[0, 1]$	$1 - 0 = 1$	$m_2 = 3 - 1 = 2$	$M_2 = 3 - 0 = 3$	$L_2 = (1)(2) = 2$	$U_2 = (1)(3) = 3$
				$L(\sigma, f) = \sum h_i m_i = 8$	$U(\sigma, f) = \sum h_i M_i = 13$

نلاحظ ان $L(\sigma, f) = 8$ ، $U(\sigma, f) = 13$

$L(\sigma, f) \leq U(\sigma, f)$ وهما يمثلان المساحة العليا والمساحة السفلى لعدم وجود قيم سالبة للدالة .

تلميح **** اذا طلب ايجاد المساحة تحت منحنى الدالة في هذا السؤال فيمكن حسابها بالقانون التالي

$$\text{مساحة المنطقة تحت المنحنى } f = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{8 + 13}{2} = \frac{21}{2} = 10.5 \text{ unit}^2$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

152

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

قيمة التكامل التالي باستخدام اربعة تجزئات منتظمة $\int_1^5 x^3 dx$

2013 خارج العر

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{5-1}{4} = 1 \Rightarrow \sigma = (1, 2, 3, 4, 5)$$

لذلك سوف نقسم الفترة [1, 5] الى اربعة اقسام وكما يلي

$$[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5]$$

$$\because f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \Rightarrow 3x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \notin [1, 5]$$

وسيتم حساب كلا من المجموع الاعلى والمجموع الاسفل حسب الجدول التالي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(a)$	$M_i = f(b)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[1 , 2]	2 - 1 = 1	$m_1 = 1$	$M_1 = 8$	$L_1 = (1)(1) = 1$	$U_1 = (1)(8) = 8$
[2 , 3]	3 - 2 = 1	$m_2 = 8$	$M_2 = 27$	$L_2 = (1)(8) = 8$	$U_2 = (1)(27) = 27$
[3 , 4]	4 - 3 = 1	$m_3 = 27$	$M_3 = 64$	$L_3 = (1)(27) = 27$	$U_3 = (1)(64) = 64$
[4 , 5]	5 - 4 = 1	$m_4 = 64$	$M_4 = 125$	$L_4 = (1)(64) = 64$	$U_4 = (1)(125) = 125$
				$L(\sigma, f) = 100$	$U(\sigma, f) = 224$

$$\int_1^5 f = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{100 + 224}{2} = \frac{324}{2} = 162 \text{ unit}^2$$

لتكن $f: [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 3$

وجد قيمة تقريبية للتكامل $\int_1^4 f$ باستخدام التجزئة $\sigma = (1, 2, 3, 4)$

2014 تمهيدي في

sol: $f(x) = 3x - 3 \Rightarrow f'(x) = 3 > 0$ الدالة متزايدة في كل مجالها

وسيتم حساب كلا من المجموع الاعلى والمجموع الاسفل حسب الجدول التالي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(a)$	$M_i = f(b)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[1 , 2]	2 - 1 = 1	$m_1 = 0$	$M_1 = 3$	$L_1 = (1)(0) = 0$	$U_1 = (1)(3) = 3$
[2 , 3]	3 - 2 = 1	$m_2 = 3$	$M_2 = 6$	$L_2 = (1)(3) = 3$	$U_2 = (1)(6) = 6$
[3 , 4]	4 - 3 = 1	$m_3 = 6$	$M_3 = 9$	$L_3 = (1)(6) = 6$	$U_3 = (1)(9) = 9$
				$L(\sigma, f) = 9$	$U(\sigma, f) = 18$

$$\int_1^4 f = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{9 + 18}{2} = \frac{27}{2} = 13.5 \text{ unit}^2$$

نكن $R \Rightarrow [1,3]$ حيث $f(x) = 2x^2$ ، جد قيمة تقريبية للتكامل : $\int_1^3 f(x) dx$
إذا قسمت الفترة $[1,3]$ الى فترتين جزئيتين منتظمتين

2012 دور 1

sol : $h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-1}{2} = 1$

$\therefore f(x) = 2x^2 \Rightarrow f'(x) = 4x \Rightarrow 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \notin [1, 3]$

ولان $\sigma = (1, 2, 3)$ لذلك سوف نقسم الفترة $[1, 3]$ الى قسمين وكما يلي

وسيتم حساب كلا من المجموع الاعلى والمجموع الاسفل حسب الجدول التالي $[1, 2]$, $[2, 3]$

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(a)$	$M_i = f(b)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[1 , 2]	$2 - 1 = 1$	$m_1 = 2$	$M_1 = 8$	$L_1 = (1)(2) = 2$	$U_1 = (1)(8) = 8$
[2 , 3]	$3 - 2 = 1$	$m_2 = 8$	$M_2 = 18$	$L_2 = (1)(8) = 8$	$U_2 = (1)(18) = 18$
				$L(\sigma, f) = 10$	$U(\sigma, f) = 26$

$$\int_1^3 2x^2 dx = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{10 + 26}{2} = \frac{36}{2} = 18 \text{ unit}^2$$

إذا كانت $f(x)$ دالة مستمرة على الفترة $[1,5]$ بحيث ان $F(x) = 3x^2$ دالة مقابلة للدالة $f(x)$
جد $\int_1^5 f(x) dx$

2014 دور 4 انابار

الحل :-
 $\int_1^5 f(x) dx = [F(x)]_1^5 = [3x^2]_1^5 = (75) - (3) = 72$

بـ $f(x) = 2x + 5$ ، $f:[1, 4] \Rightarrow \mathbb{R}$ حيث ان $U(\sigma, f)$ ، $L(\sigma, f)$
 $\sigma = (1, 2, 3, 4)$ ،

2014 نازحين

$$\because f(x) = 5 + 2x \Rightarrow f'(x) = 2 > 0$$

الحل :-

أي ان الدالة متزايدة في كل مجالها ولا توجد نقاط حرجة لذلك فان اصغر واكبر قيمة ستكون عند احد طرفي كل فترة
 $[1, 2]$ ، $[2, 3]$ ، $[3, 4]$ وسيتم حساب كلا من المجموع الاعلى والمجموع الاسفل حسب الجدول التالي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(a)$	$M_i = f(b)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[1 , 2]	$2 - 1 = 1$	$m_1 = 5 + 2 = 7$	$M_1 = 5 + 4 = 9$	$L_1 = (1)(7) = 7$	$U_1 = (1)(9) = 9$
[2 , 3]	$3 - 2 = 1$	$m_2 = 5 + 4 = 9$	$M_2 = 5 + 6 = 11$	$L_2 = (1)(9) = 9$	$U_2 = (1)(11) = 11$
[3 , 4]	$4 - 3 = 1$	$m_3 = 5 + 6 = 11$	$M_3 = 5 + 8 = 13$	$L_3 = (1)(11) = 11$	$U_3 = (1)(13) = 13$
				$L(\sigma, f) = \sum h_i m_i = 27$	$U(\sigma, f) = \sum h_i M_i = 33$

قصي هاشم التميمي

وجد قيمة التكامل $\int_2^4 (3x^2 - 3) dx$ باستخدام التجزئة $\sigma = (2, 3, 4)$

2015 نارين حد

2015 دور 3

$$\therefore f(x) = (3x^2 - 3) \Rightarrow f'(x) = 6x \Rightarrow 6x = 0 \Rightarrow x = 0 \notin [2, 4]$$

ولان $\sigma = (2, 3, 4)$ لذلك سوف نقسم الفترة $[2, 4]$ الى قسمين وكما يلي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(a)$	$M_i = f(b)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[2 , 3]	3 - 2 = 1	$m_1 = 9$	$M_1 = 24$	$L_1 = (1)(9) = 9$	$U_1 = (1)(24) = 24$
[3 , 4]	4 - 3 = 1	$m_2 = 24$	$M_2 = 45$	$L_2 = (1)(24) = 24$	$U_2 = (1)(45) = 45$
				$L(\sigma, f) = 33$	$U(\sigma, f) = 69$

$$\int_2^4 (3x^2 - 3) dx = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{33 + 69}{2} = \frac{102}{2} = 51 \text{ unit}^2$$

جد قيمة تقريبية للتكامل $\int_3^5 (2x^2 - 2) dx$ باستخدام التجزئة $\sigma = (3, 4, 5)$

2016 دور اول

$$\therefore f(x) = (2x^2 - 2) \Rightarrow f'(x) = 4x \Rightarrow 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \notin [3, 5]$$

ولان $\sigma = (3, 4, 5)$ لذلك سوف نقسم الفترة $[3, 5]$ الى قسمين وكما يلي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(a)$	$M_i = f(b)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[3 , 4]	4 - 3 = 1	$m_1 = 16$	$M_1 = 30$	$L_1 = (1)(16) = 16$	$U_1 = (1)(30) = 30$
[4 , 5]	5 - 4 = 1	$m_2 = 30$	$M_2 = 48$	$L_2 = (1)(30) = 30$	$U_2 = (1)(48) = 48$
				$L(\sigma, f) = 46$	$U(\sigma, f) = 78$

$$\int_3^5 (2x^2 - 2) dx = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{46 + 78}{2} = \frac{124}{2} = 62 \text{ unit}^2$$

2015 دور 2 خارج

 $f : [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$ لتكن

جد القيمة التقريبية للتكامل باستخدام تجزئتين منتظميتين

$$\text{sol : } h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-1}{2} = 1 \Rightarrow \sigma = (1, 2, 3)$$

$$\because f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \notin [1, 3]$$

ولان $\sigma = (1, 2, 3)$ لذلك سوف نقسم الفترة $[1, 3]$ الى قسمين وكما يلي $[1, 2]$, $[2, 3]$ وسيتم حساب كلا من المجموع الاعلى والمجموع الاسفل حسب الجدول التالي

الفترة الجزئية [a , b]	طول الفترة $h_i = b - a$	$m_i = f(a)$	$M_i = f(b)$	$h_i m_i$	$h_i M_i$
[1 , 2]	$2 - 1 = 1$	$m_1 = 1$	$M_1 = 4$	$L_1 = (1)(1) = 1$	$U_1 = (1)(4) = 4$
[2 , 3]	$3 - 2 = 1$	$m_2 = 4$	$M_2 = 9$	$L_2 = (1)(4) = 4$	$U_2 = (1)(9) = 9$
				$L(\sigma, f) = 5$	$U(\sigma, f) = 13$

$$\int_1^3 x^2 dx = \frac{L(\sigma, f) + U(\sigma, f)}{2} = \frac{5 + 13}{2} = \frac{18}{2} = 9 \text{ unit}^2$$

قصي هاشم التميمي

جد التكاملات التالية

1996 دور 1

$$\int (\sin x - 3 \sec^2 x) dx = -\cos x - 3 \tan x + c$$

$$\begin{aligned} \int \cos 6x \cos 3x dx &= \int (1 - 2 \sin^2 3x) \cos 3x dx \\ &= \int \cos 3x dx - 2 \int \sin^2 3x \cos 3x dx \\ &= \frac{1}{3} \int \cos 3x \cdot 3 dx - 2 \cdot \frac{1}{3} \int \sin^2 3x \cdot 3 \cos 3x dx \\ &= \frac{1}{3} \sin 3x - \frac{2}{9} \sin^3 3x + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx &= \int_0^3 (x+1)^{-\frac{1}{2}} dx = 2 \left[(x+1)^{\frac{1}{2}} \right]_0^3 \\ &= 2 \left[\sqrt{x+1} \right]_0^3 = 2(2-1) = 2 \end{aligned}$$

جد التكامل

1996 دور 2

$$\begin{aligned} \int (\sec x - \sin x)(\sec x + \sin x) dx &= \int (\sec^2 x - \sin^2 x) dx \\ &= \int \left[\sec^2 x - \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \right] dx = \int \left[\sec^2 x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \right] dx \\ &= \tan x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + c \end{aligned}$$

$$\int_4^8 x \sqrt{x^2 - 15} dx$$

1997 دور 1

$$\begin{aligned} \text{sol: } \int_4^8 x \sqrt{x^2 - 15} dx &= \frac{1}{2} \int_4^8 2x (x^2 - 15)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left[(x^2 - 15)^{\frac{3}{2}} \right]_4^8 \\ &= \frac{1}{3} \left[\sqrt{(x^2 - 15)^3} \right]_4^8 = \frac{1}{3} \left[\sqrt{(64 - 15)^3} - \sqrt{(16 - 15)^3} \right] \\ &= \frac{1}{3} (343 - 1) = \frac{342}{3} = 114 \end{aligned}$$

$$a \in \mathbb{R} \quad \text{جد قيمة} \quad \int_{-1}^a (x - x^3) dx = \frac{-9}{4} \quad \text{اذا كان}$$

1998 دور 1

$$\begin{aligned} \text{sol: } \int_{-1}^a (x - x^3) dx &= \frac{-9}{4} \Rightarrow \left[\left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{4} x^4 \right) \right]_{-1}^a = \frac{-9}{4} \\ \left(\frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{4} a^4 \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) &= \frac{-9}{4} \Rightarrow \left(\frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{4} a^4 \right) - \frac{1}{4} = \frac{-9}{4} \\ \left(\frac{1}{2} a^2 - \frac{1}{4} a^4 \right) &= -2 \Rightarrow 2a^2 - a^4 = -8 \Rightarrow a^4 - 2a^2 - 8 = 0 \\ (a^2 - 4)(a^2 + 2) &= 0 \Rightarrow a^2 - 4 = 0 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = \pm 2, \quad a^2 + 2 \neq 0 \end{aligned}$$

اذا كان $\int_a^b (2x + 3) dx = 12$ ، وكان $a + 2b = 3$ جد قيمتي $a, b \in \mathbb{R}$

1998 دور 2

sol: $\int_a^b (2x + 3) dx = 12 \Rightarrow [x^2 + 3x]_a^b = 12$

$$(b^2 + 3b) - (a^2 + 3a) = 12 \Rightarrow b^2 + 3b - a^2 - 3a = 12 \dots (1)$$

$$a = 3 - 2b \dots (2) \text{ in } 1$$

$$b^2 + 3b - (3 - 2b)^2 - 3(3 - 2b) = 12$$

$$b^2 + 3b - (9 - 12b + 4b^2) - 9 + 6b - 12 = 0$$

$$b^2 + 3b - 9 + 12b - 4b^2 - 9 + 6b - 12 = 0$$

$$-3b^2 + 21b - 30 = 0 \quad] \div (-3) \Rightarrow b^2 - 7b + 10 = 0$$

$$(b - 2)(b - 5) = 0 \Rightarrow \text{either } b = 2 \Rightarrow a = -1 \text{ OR } b = 5 \Rightarrow a = -7$$

جد $\int_0^4 x \sqrt{x^2 + 9} dx$

2000 دور 2

2002 دور 1

2005 دور 2

sol: $\int_0^4 x \sqrt{x^2 + 9} dx = \int_0^4 (x^2 + 9)^{\frac{1}{2}} x dx = \frac{1}{2} \int_0^4 (x^2 + 9)^{\frac{1}{2}} 2x dx$

$$= \left[\left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{2}{3} \right) (x^2 + 9)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = \frac{1}{3} [\sqrt{(x^2 + 9)^3}]_0^4$$

$$= \frac{1}{3} [(\sqrt{(16 + 9)^3}) - (\sqrt{(0 + 9)^3})] = \frac{1}{3} [\sqrt{25^3} - \sqrt{9^3}] = \frac{1}{3} (125 - 27) = \frac{98}{3}$$

اذا كان $\int_a^4 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} dx = 2$ جد قيمة $a \in \mathbb{R}$

2004 دور 1

$$\int_a^4 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} dx = 2 \Rightarrow \int_a^4 (x^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} x dx = 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \int_a^4 (x^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} 2x dx = 2$$

$$= \left[\left(\frac{1}{2} \right) (2) (x^2 + 9)^{\frac{1}{2}} \right]_a^4 = 2 \Rightarrow [\sqrt{x^2 + 9}]_a^4 = 2$$

$$= (\sqrt{16 + 9}) - (\sqrt{a^2 + 9}) = 2 \Rightarrow \sqrt{25} - \sqrt{a^2 + 9} = 2$$

$$\sqrt{a^2 + 9} = 3 \Rightarrow a^2 + 9 = 9 \Rightarrow a^2 = 0 \Rightarrow a = 0$$

جد قيمة $\int_0^4 \sqrt{x^2 + 5x} (2x + 5) dx$

2001 دور 1

sol: $\int_0^4 \sqrt{x^2 + 5x} (2x + 5) dx = \int_0^4 (x^2 + 5x)^{\frac{1}{2}} (2x + 5) dx$

$$\frac{2}{3} \left[(x^2 + 5x)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = \frac{2}{3} \left[\sqrt{(x^2 + 5x)^3} \right]_0^4 = \frac{2}{3} (\sqrt{(36)^3} - \sqrt{(0)^3}) = \frac{2}{3} (216) = 144$$

جد $\int_{-1}^1 \frac{dx}{9-12x+4x^2}$

2001 دور 2

sol: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{9-12x+4x^2} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(3-2x)^2} = \int_{-1}^1 (3-2x)^{-2} dx$
 $= \frac{-1}{2} \int_{-1}^1 (3-2x)^{-2} (-2) dx = \frac{1}{2} [(3-2x)^{-1}]_{-1}^1$
 $= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3-2x} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3-2} - \frac{1}{3+2} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$

جد $\int_0^1 \frac{dx}{9-12x+4x^2}$

2003 دور 2

sol: $\int_0^1 \frac{dx}{9-12x+4x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{(3-2x)^2} = \int_0^1 (3-2x)^{-2} dx$
 $= \frac{-1}{2} \int_0^1 (3-2x)^{-2} (-2) dx = \frac{1}{2} [(3-2x)^{-1}]_0^1$
 $= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3-2x} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3-2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

جد قيمة $\int_0^4 \sqrt{x} (x+6) dx$

2002 دور 2

sol: $\int_0^4 x^{\frac{1}{2}} (x+6) dx = \int_0^4 (x^{\frac{3}{2}} + 6x^{\frac{1}{2}}) dx = \left[\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + 6 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^4$
 $= \left[\frac{2}{5} \sqrt{x^5} + 4 \sqrt{x^3} \right]_0^4 = \left(\frac{2}{5} \sqrt{4^5} + 4 \sqrt{4^3} \right) - (0)$
 $= \frac{64}{5} + 32 = \frac{224}{5}$

جد $\int x(x^2+3)^3 dx$

2003 دور 1

sol: $\int x(x^2+3)^3 dx = \frac{1}{2} \int (x^2+3)^3 2x dx = \frac{1}{8} (x^2+3)^4 + c$

جد $\int_{-1}^1 \sqrt[3]{3x^3-2x^5} dx$

2004 دور 2

2015 خارج

sol: $\int_{-1}^1 \sqrt[3]{3x^3-2x^5} dx = \int_{-1}^1 (3-2x^2)^{\frac{1}{3}} x dx$
 $= \frac{-1}{4} \int_{-1}^1 (3-2x^2)^{\frac{1}{3}} (-4) x dx$
 $= \frac{-1}{4} \frac{3}{4} \left[(3-2x^2)^{\frac{4}{3}} \right]_{-1}^1 = \frac{-1}{16} (1-1) = 0$

2006 دور 1

$$\int_1^2 \frac{1}{(5-2x)^2} dx$$

sol: $\int_1^2 \frac{1}{(5-2x)^2} dx = \int_1^2 \frac{dx}{(5-2x)^2} = \int_1^2 (5-2x)^{-2} dx$
 $= \frac{-1}{2} \int_1^2 (5-2x)^{-2} (-2) dx = \frac{1}{2} [(5-2x)^{-1}]_1^2$
 $= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{5-2x} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5-4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

2009 دور 1

$$\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$$

sol: $\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \int_0^1 (x^2+1)^{-2} x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2+1)^{-2} 2x dx$
 $= \frac{-1}{2} [(x^2+1)^{-1}]_0^1$
 $= \frac{-1}{2} \left[\frac{1}{x^2+1} \right]_0^1 = \frac{-1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{1} \right) = \frac{1}{4}$

2006 دور 2

$$\int_1^2 \frac{dx}{(3x-4)^2}$$

sol: $\int_1^2 \frac{1}{(3x-4)^2} dx = \int_1^2 \frac{dx}{(3x-4)^2} = \int_1^2 (3x-4)^{-2} dx$
 $= \frac{1}{3} \int_1^2 (3x-4)^{-2} (3) dx = \frac{-1}{3} [(3x-4)^{-1}]_1^2$
 $= \frac{-1}{3} \left[\frac{1}{3x-4} \right]_1^2 = \frac{-1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{-1} \right) = \frac{-1}{3} \left(\frac{3}{2} \right) = \frac{-1}{2}$

2007 دور 1

$$\int x(x^2+1)^{\frac{3}{4}} dx$$

sol: $\int x(x^2+1)^{\frac{3}{4}} dx = \frac{1}{2} \int (x^2+1)^{\frac{3}{4}} 2x dx$
 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} (x^2+1)^{\frac{7}{4}} + c = \frac{4}{7} \sqrt[4]{(x^2+1)^7} + c$

2008 تمهيدي

$$\int_0^7 \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}} dx$$

sol: $\int_0^7 \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}} dx = \int_0^7 (x+1)^{-\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{2} [(x+1)^{\frac{2}{3}}]_0^7$
 $= \frac{3}{2} \left[\sqrt[3]{(x+1)^2} \right]_0^7 = \frac{3}{2} (4 - 1) = \frac{9}{2}$

2008 دور 1 : كانت $\int_a^b f(x) dx = 5$ ، $\int_c^b f(x) dx = 3$ وكانت $c \in [a, b]$ جد قيمة $\int_a^c f(x) dx$

sol : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \Rightarrow 5 = \int_a^c f(x) dx + 3 \Rightarrow \int_a^c f(x) dx = 2$

2009 دور 2 : جد قيمة $\int_3^8 \frac{x}{\sqrt{x^3 + x^2}} dx$

sol : $\int_3^8 \frac{x}{\sqrt{x^3 + x^2}} dx = \int_3^8 \frac{x}{\sqrt{x^2(x+1)}} dx = \int_3^8 \frac{x}{|x|\sqrt{x+1}} dx$
 $= \int_3^8 \frac{x}{x\sqrt{x+1}} dx = \int_3^8 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx = \int_3^8 (x+1)^{-\frac{1}{2}} dx$
 $= 2 \left[(x+1)^{\frac{1}{2}} \right]_3^8 = 2 \left[\sqrt{x+1} \right]_3^8 = 2(3-2) = 2$

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

لاحظ عزيزي الطالب ان القيمة المطلقة للمتغير x تم تعويضها بالصورة الموجبة لان جميع العناصر داخل فترة حدود التكامل موجبة الان اريك ان تجرب فيما لو كانت حدود التكامل $[-3, 0]$ ماذا سيكون الحل ؟ ولو كانت حدود التكامل $[-3, 8]$ فماذا سيكون الحل برأيك ؟ فكر ولا تتسرع .

2014 خارج القطر : جد $\int_1^2 x e^{-\ln x} dx$

$\int_1^2 x e^{-\ln x} dx = \int_1^2 x (e^{\ln x})^{-1} dx = \int_1^2 x \cdot x^{-1} dx = \int_1^2 dx = [x]_1^2 = 2 - 1 = 1$

2015 بازمنه 1 : جد $\int_2^5 x e^{-\ln x} dx$

$\int_2^5 x e^{-\ln x} dx = \int_2^5 x (e^{\ln x})^{-1} dx = \int_2^5 x \cdot x^{-1} dx = \int_2^5 dx = [x]_2^5 = 5 - 2 = 3$

2010 دور 2 : انا كان $\int_1^3 f(x) dx = 6$ ، $\int_1^3 g(x) dx = 2$ جد $\int_1^3 [f(x) - g(x) + 4x] dx$

sol : $\int_1^3 [f(x) - g(x) + 4x] dx = \int_1^3 f(x) dx - \int_1^3 g(x) dx + \int_1^3 4x dx$
 $= 6 - 2 + [2x^2]_1^3 = 4 + (18 - 2) = 20$

2010 التميمي : جد $\int (4x + 6)\sqrt{2x + 3} dx$

sol : $\int (4x + 6)\sqrt{2x + 3} dx = \int 2(2x + 3)(2x + 3)^{\frac{1}{2}} dx$
 $= \int (2x + 3)^{\frac{3}{2}} 2dx = \left(\frac{2}{5}\right)(2x + 3)^{\frac{5}{2}} + c = \frac{2}{5}\sqrt{(2x + 3)^5} + c$

$$\int \frac{x}{(3x^2+5)} dx$$

2014 دور 4 انبار

$$\text{sol : } \int \frac{x}{(3x^2+5)} dx = \frac{1}{6} \int \frac{6x}{(3x^2+5)} dx = \frac{1}{6} \ln(3x^2 + 5) + c$$

لاحظ اننا لم نضع القيمة المطلقة بعد اجراء التكامل لان الناتج مجموع مربعين ويكون موجبا دائما

$$\int_0^4 \frac{2x}{x^2+9} dx$$

2012 تمميد

2015 تمميد

$$\text{sol : } \int_0^4 \frac{2x}{x^2+9} dx = [\ln|x^2 + 9|]_0^4 = (\ln 25) - (\ln 9) = \ln \frac{25}{9}$$

$$\int_0^1 (1 + e^x)^2 e^x dx = \left[\frac{1}{3} (1 + e^x)^3 \right]_0^1$$

$$\text{Let } u = 1 + e^x$$

$$du = e^x dx$$

$$= \frac{1}{3} [(1 + e^1)^3 - (1 + e^0)^3]$$

$$= \frac{1}{3} [(1 + e^1)^3 - (1 + 1)^3]$$

$$= \frac{1}{3} [(1 + e^1)^3 - 8]$$

2011 دور 1

2013 دور 2

2016 تمميد

$$\int_{-3}^4 |x| dx$$

2011 دور 1

الحل :-

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x & , x < 0 \\ x & , x \geq 0 \end{cases}$$

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^{(+)}} f(x) = 0 \quad L_1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^{(-)}} f(x) = 0 \quad L_2$$

$$\therefore L_1 = L_2 = 0 \Rightarrow \text{الدالة مستمرة} \therefore f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\int_{-3}^4 f(x) dx = \int_{-3}^0 f(x) dx + \int_0^4 f(x) dx = \int_{-3}^0 (-x) dx + \int_0^4 x dx$$

$$= \left[-\frac{1}{2} x^2 \right]_{-3}^0 + \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^4 = [(0) - (-\frac{9}{2})] + [(8) - (0)]$$

$$= \frac{9}{2} + 8 = \frac{25}{2} = 12.5$$

يمكن ذكر ان الدالة
مستمرة على الفترة
[-3,4]
فقط دون ذكر
تفصيل الاستمرارية
والافضل اثبت
الاستمرارية

$$\int_0^1 \frac{3x^2 + 4}{x^3 + 4x + 1} dx = [\ln|x^3 + 4x + 1|]_0^1 = \ln 6 - \ln 1 = \ln 6$$

2011 دور 2

2013 دور 1

$$\int_{\ln 3}^{\ln 5} e^{2x} dx = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_{\ln 3}^{\ln 5} = \frac{1}{2} (e^{2\ln 5} - e^{2\ln 3})$$

$$= \frac{1}{2} [(e^{\ln 5})^2 - (e^{\ln 3})^2] = \frac{1}{2} [(5)^2 - (3)^2]$$

$$= \frac{1}{2} [25 - 9] = \left(\frac{1}{2}\right)(16) = 8$$

2012 دور 1

2014 دور 2

2016 دور 2

$$\int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} dx = [e^{\sqrt{x}}]_1^4$$

$$u = \sqrt{x}, du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$= (e^{\sqrt{4}}) - (e^{\sqrt{1}}) = e^2 - e$$

2012 دور 2

2012 خارج

2015 دور 2

$$\int x \cdot e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int 2x \cdot e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$$

2013 دور 3

$$\cdot \int_1^a \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x dx \quad \text{جد قيمة } a \in \mathbb{R} \text{ اذا علمت ان}$$

2014 التميمي

$$\text{RHS : } 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x dx = 2 [\tan x]_0^{\frac{\pi}{4}} = 2 [(\tan \frac{\pi}{4}) - (\tan 0)] = 2(1 - 0) = 2$$

$$\text{LHS : } \int_1^a \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x\right]_1^a = \left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \\ = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a - 1$$

2015 دور 1

$$\therefore \int_1^a \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x dx \Rightarrow \left[\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a - 1 = 2\right] \cdot 2$$

$$a^2 + a - 2 = 4 \Rightarrow a^2 + a - 6 = 0 \Rightarrow (a + 3)(a - 2) = 0$$

$$a = -3$$

OR

$$a = 2$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

164

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2014 دور 1

$$\int_{-1}^3 f(x) dx \text{ جد } f(x) = \begin{cases} 3x^2, & \forall x \geq 0 \\ 2x, & \forall x < 0 \end{cases} \text{ اذا كانت}$$

الحل :-

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^{(+)}} f(x) = 0 \quad L_1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^{(-)}} f(x) = 0 \quad L_2$$

$$\therefore L_1 = L_2 = 0 \Rightarrow \text{الغاية موجودة}$$

$$\therefore f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \Rightarrow (0) \text{ الدالة مستمرة عند الـ}$$

وكذلك الدالة مستمرة لكل $x < 0$, $x > 0$ لانهما كثيرتا حدود

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 f(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx = \int_{-1}^0 (2x) dx + \int_0^3 (3x^2) dx \\ &= [x^2]_{-1}^0 + [x^3]_0^3 = [(0) - (1)] + [(27) - (0)] = -1 + 27 = 26 \end{aligned}$$

2014 دور 3

$$\text{sol : } \int \sqrt{e^{2x-4}} dx = \int \sqrt{e^{2(x-2)}} dx = \int e^{x-2} dx = e^{x-2} + c$$

2014 دور 3

$$\int_{-2}^4 |3x - 6| dx = 30$$

sol :

$$|3x - 6| = \begin{cases} 3x - 6, & x \geq 2 \\ -x + 6, & x < 2 \end{cases}$$

$$f(2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^{(+)}} f(x) = 0 \quad L_1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^{(-)}} f(x) = 0 \quad L_2 \therefore L_1 = L_2 = 0 \Rightarrow \text{الغاية موجودة}$$

$$\therefore f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0 \Rightarrow \text{الدالة مستمرة}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_{-2}^4 |3x - 6| dx &= \int_{-2}^2 (-3x + 6) dx + \int_2^4 (3x - 6) dx \\ &= \left[-\frac{3}{2}x^2 + 6x \right]_{-2}^2 + \left[\frac{3}{2}x^2 - 6x \right]_2^4 \\ &= [(-6 + 12) - (-6 - 12)] + [(24 - 24) - (6 - 12)] \\ &= (6 + 18) + (6) = 30 \end{aligned}$$

$$\int_1^8 \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x^2}} dx = 2 \quad \text{اثبت ان :}$$

2015 دور 2 خارج

$$\begin{aligned} \text{sol : } \int_1^8 \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x^2}} dx &= \int_1^8 (x^{\frac{1}{3}} - 1)^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{2}{3}} dx = 3 \int_1^8 (x^{\frac{1}{3}} - 1)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \\ &= \left[3 \cdot \frac{2}{3} (x^{\frac{1}{3}} - 1)^{\frac{3}{2}} \right]_1^8 = \left[2 \sqrt{(\sqrt[3]{x}-1)^3} \right]_1^8 \\ &= (2 \sqrt{(\sqrt[3]{8}-1)^3}) - (2 \sqrt{(\sqrt[3]{1}-1)^3}) \\ &= (2 \sqrt{(1)^3}) - (2 \sqrt{(0)^3}) = 2 \end{aligned}$$

جد التكامل التالي $\int \frac{3x-6}{\sqrt[3]{x-2}} dx$

2015 دور 2

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-6}{\sqrt[3]{x-2}} dx &= \int \frac{3(x-2)}{(x-2)^{\frac{1}{3}}} dx = 3 \int (x-2)^{\frac{2}{3}} dx \\ &= 3 \left(\frac{3}{5} \right) (x-2)^{\frac{5}{3}} + c = \frac{9}{5} \sqrt[3]{(x-2)^5} + c \end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x} \sqrt{3+\sqrt{x}}} = \int \frac{dx}{\sqrt{2} \sqrt{x} \sqrt{3+\sqrt{x}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int (3+x^{\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}} dx$$

2016 دور 2

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{\sqrt{2}} \int (3+x^{\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2}} (2) (3+x^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} + c \\ &= 2\sqrt{2} \sqrt{3+\sqrt{x}} + c \end{aligned}$$

قصي هاشم التميمي

$$1) \int \frac{(x-3)}{(2x-6)^3} dx = \int \frac{(x-3)}{2^3(x-3)^3} dx = \frac{1}{8} \int \frac{1}{(x-3)^2} dx = \frac{1}{8} \int (x-3)^{-2} dx$$

$$= \frac{1}{8} (-1) (x-3)^{-1} + c = \frac{-1}{8(x-3)} + c$$

$$2) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cot x dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x} dx = [\ln |\sin x|]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \ln \left| \sin \frac{\pi}{2} \right| - \ln \left| \sin \frac{\pi}{6} \right|$$

$$= \ln 1 - \ln \frac{1}{2} = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2$$

$$\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{-\sin x}{\cos x} dx = -\ln |\cos x| + c$$

2016 تمميد

$$\int \cos 2x \sin^2 x dx$$

1997 دور 1

$$\int \cos 2x \cdot \sin^2 x dx = \int \cos 2x \cdot \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \cos^2 2x \right) dx = \int \left[\frac{1}{2} \cos 2x - \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) (1 + \cos 4x) \right] dx$$

$$= \int \left[\frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cos 4x \right] dx = \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{4} x - \frac{1}{16} \sin 4x + c$$

$$\int (1 + \cos 3x)^2 dx$$

1997 دور 2

2013 دور 2

$$\int (1 + \cos 3x)^2 dx = \int (1 + 2\cos 3x + \cos^2 3x) dx$$

$$= \int \left[1 + 2\cos 3x + \frac{1}{2} (1 + \cos 6x) \right] dx = \int \left(1 + 2\cos 3x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 6x \right) dx$$

$$= \int \left(\frac{3}{2} + 2\cos 3x + \frac{1}{2} \cos 6x \right) dx = \frac{3}{2} x + \frac{2}{3} \sin 3x + \frac{1}{12} \sin 6x + c$$

$$\int (\cos x - \sin 2x)^2 dx \quad \text{جد}$$

1998 حور 1

$$\begin{aligned} \text{sol: } \int (\cos x - \sin 2x)^2 dx &= \int (\cos^2 x - 2 \sin 2x \cos x + \sin^2 2x) dx \\ &= \int \left[\frac{1}{2}(1 + \cos 2x) - 2 \cdot 2 \sin x \cos x \cos x + \frac{1}{2}(1 - \cos 4x) \right] dx \\ &= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x - 4 \cos^2 x \sin x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 4x \right) dx \\ &= \int \left(1 + \frac{1}{2} \cos 2x - 4 \cos^2 x \sin x - \frac{1}{2} \cos 4x \right) dx \\ &= x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{4}{3} \cos^3 x - \frac{1}{8} \sin 4x + c \end{aligned}$$

$$\int (\sin^2 x + \cos^4 x) dx \quad \text{جد}$$

1999 حور 2

$$\begin{aligned} \text{sol: } \int (\sin^2 x + \cos^4 x) dx &= \int \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) + (\cos^2 x)^2 \right] dx \\ &= \int \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) + \left(\frac{1}{2}(1 + \cos 2x) \right)^2 \right] dx \\ &= \int \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) + \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x) \right] dx \\ &= \int \left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x \right) \right] dx \\ &= \int \left[\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos^2 2x \right] dx = \int \left[\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 4x) \right] dx \\ &= \int \left[\frac{3}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \cos 4x \right] dx = \int \left[\frac{7}{8} + \frac{1}{8} \cos 4x \right] dx = \frac{7}{8} x + \frac{1}{32} \sin 4x + c \end{aligned}$$

$$\int \sin^4 x dx \quad \text{جد}$$

2000 حور 1

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x dx &= \int [\sin^2 x]^2 dx = \int \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \right]^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} \int \left[1 - 2\cos 2x + \frac{1}{2}(1 + \cos 4x) \right] dx = \frac{1}{4} \int \left[1 - 2\cos 2x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4x \right] dx \\ &= \frac{1}{4} \int \left[\frac{3}{2} - 2\cos 2x + \frac{1}{2} \cos 4x \right] dx = \frac{1}{4} \left[\frac{3}{2} x - \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right] + c \end{aligned}$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x dx \quad \text{جد}$$

2001 حور 1

$$\begin{aligned} \int \sin^2 x \cdot \cos^2 x dx &= \int (\sin x \cdot \cos x)^2 dx = \int \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int \sin^2 2x dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{2} (1 - \cos 4x) dx = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{4} \sin 4x \right) + c \end{aligned}$$

$$\int (\sin^2 x + 1) dx$$

2006 تمهيدي

$$\int (\sin^2 x + 1) dx = \int \left[\frac{1}{2} (1 - \cos 2x) + 1 \right] dx = \frac{1}{2} (x - \frac{1}{2} \sin 2x) + x + c$$

لاحظ ان العدد $\frac{1}{2}$ لم نقم باخراجه خارج التكامل عن التحويل بسبب وجود ملحق مع $\sin^2 x$ وهو العدد (1)

$$\int \tan 3x \sec^5 3x dx$$

2009 تمهيدي

$$\begin{aligned} \int \tan 3x \sec^5 3x dx &= \int \sec^4 3x \sec 3x \tan 3x dx \\ &= \frac{1}{3} \int \sec^4 3x \sec 3x \tan 3x dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \sec^5 3x + c = \frac{1}{15} \sec^5 3x + c \end{aligned}$$

$$\int \tan 2x \sec^3 2x dx$$

2008 خارج القطر

$$\begin{aligned} \int \tan 2x \sec^3 2x dx &= \int \sec^2 2x \sec 2x \tan 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sec^2 2x \sec 2x \tan 2x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \sec^3 2x + c = \frac{1}{6} \sec^3 2x + c \end{aligned}$$

$$\int \cot x \csc^3 x dx$$

2012 دور 2

$$\begin{aligned} \int \cot x \csc^3 x dx &= \int \csc^2 x (\csc x \cot x) dx = - \int \csc^2 x (-\csc x \cot x) dx \\ &= -\frac{1}{3} \csc^3 x + c \end{aligned}$$

$$\int \cos^3 x dx$$

2008 خارج القطر

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \int \cos x \cdot \cos^2 x dx = \int \cos x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= \int (\cos x - \sin^2 x \cos x) dx = \sin x - \left(\frac{1}{3} \right) \sin^3 x + c \end{aligned}$$

$$\int \cos^2 2x \sin x dx$$

2008 دور 2

$$\begin{aligned} \text{sol : } \int \cos^2 2x \sin x dx &= \int (\cos 2x)^2 \sin x dx \\ &= \int (2\cos^2 x - 1)^2 \sin x dx = \int (4\cos^4 x - 4\cos^2 x + 1) \sin x dx \\ &= 4 \int \cos^4 x \sin x dx - 4 \int \cos^2 x \sin x dx + \int \sin x dx \\ &= -4 \int \cos^4 x (-) \sin x dx + 4 \int \cos^2 x (-) \sin x dx + \int \sin x dx \\ &= -\frac{4}{5} \cos^5 x + \frac{4}{3} \cos^3 x - \cos x + c \end{aligned}$$

عزيزي الطالب ماذا لو كان السؤال السابق بالصور $\int \cos^2 2x \cos x dx$ ، $\int \cos^2 2x \sin 4x dx$

2010 دور 1

جد $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x)^2 dx$

sol: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + \cos x)^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x) dx$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin 2x) dx = \left[x - \frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cos \pi \right) - \left(0 - \frac{1}{2} \cos 0 \right)$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{2} + 1$$

جد $\int \frac{\cos^3 x}{1 - \sin x} dx$

2010 تممدي

2014 خارج القطر

$$\int \frac{\cos^3 x}{1 - \sin x} dx = \int \frac{\cos x \cdot \cos^2 x}{1 - \sin x} dx$$

$$= \int \frac{\cos x \cdot (1 - \sin^2 x)}{1 - \sin x} dx = \int \frac{\cos x \cdot (1 - \sin x)(1 + \sin x)}{1 - \sin x} dx$$

$$= \int (1 + \sin x) \cos x dx = \frac{1}{2} (1 + \sin x)^2 + c$$

ملاحظة || يمكن حل السؤال السابق بطريقة (ضرب البسط والمقام بمرافق المقام $1 + \sin x$ فيصبح المقام عندها $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$ ليتم اختصاره مع البسط للوصول الى نفس النتيجة ، اما الخطوة قبل الاخيرة فيمكن اجراء التكامل بطرق اخرى (حاول ذلك)

جد $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\cos x} \sin x dx$

2011 خارج القطر

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\cos x} \sin x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\cos x} (-\sin x) dx = [-e^{\cos x}]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= (-e^{\cos \frac{\pi}{2}}) - (-e^{\cos 0}) = -e^0 + e^1 = -1 + e$$

جد $\int \sqrt{1 - \sin 2x} dx$

2013 خارج القطر

2014 دور 4 انبار

$$\int \sqrt{1 - \sin 2x} dx = \int \sqrt{(\sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \cos^2 x)} dx$$

$$= \int \sqrt{(\sin x - \cos x)^2} dx = \pm \int (\sin x - \cos x) dx = \pm (-\cos x - \sin x) + c$$

عزيزي الطالب : ماذا لو كان السؤال السابق $\int \sqrt{1 - \sin 4x} dx$ او $\int \sqrt{9 - 9 \sin 6x} dx$ ؟؟؟؟

2011 دور 1

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{(2+\tan x)} dx &= [\ln(2 + \tan x)]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= [\ln(2 + \tan \frac{\pi}{4}) - \ln(2 + \tan(-\frac{\pi}{4}))] \\ &= [\ln(2 + \tan \frac{\pi}{4}) - \ln(2 - \tan \frac{\pi}{4})] = \ln(2+1) - \ln(2-1) \\ &= \ln 3 - \ln 1 = \ln 3 \end{aligned}$$

2012 تمهيدي

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec x \sin x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan x dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= [-\ln|\cos x|]_0^{\frac{\pi}{3}} = -[(\ln|\cos \frac{\pi}{3}|) - (\ln|\cos 0|)] \\ &= -[(\ln|\frac{1}{2}|) - (\ln|1|)] = -(\ln \frac{1}{2} - 0) = -\ln \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2013 دور 1

$$\begin{aligned} \int \csc^2 x \cdot \cos x dx &= \int \left(\frac{1}{\sin^2 x} \cdot \cos x \right) dx = \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx \\ &= \int \left(\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\sin x} \right) dx = \int \cot x \cdot \csc x dx = -\csc x + c \end{aligned}$$

2013 دور 3

2014 دور 2

$$\text{sol: } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \sec^2 x dx = \frac{1}{2} [\tan x]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \left(\tan \frac{\pi}{4} - \tan 0 \right) = \frac{1}{2}$$

2014 دور 1

2015 دور 1

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos 4x}{\cos 2x - \sin 2x} dx &= \int \frac{\cos^2 2x - \sin^2 2x}{\cos 2x - \sin 2x} dx \\ &= \int \frac{(\cos 2x - \sin 2x)(\cos 2x + \sin 2x)}{\cos 2x - \sin 2x} dx \\ &= \int (\cos 2x + \sin 2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x + c \end{aligned}$$

$$\int \sin 6x \cos^2 3x \, dx$$

2014 دور 3

sol : $\int \sin 6x \cos^2 3x \, dx = \int 2 \sin 3x \cos 3x \cos^2 3x \, dx$
 $= 2 \int \cos^3 3x \sin 3x \, dx = 2 \left(\frac{-1}{3} \right) \int \cos^3 3x (-3) \sin 3x \, dx$
 $= \frac{-2}{3} \cdot \frac{1}{4} \cos^4 3x + c = \frac{-1}{6} \cdot \cos^4 3x + c$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} \, dx$$

2015 تمهيدي

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} \, dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^{-\frac{1}{2}} \cos x \, dx = [2(\sin x)^{\frac{1}{2}}]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = [2\sqrt{\sin x}]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= (2\sqrt{\sin \frac{\pi}{2}}) - (2\sqrt{\sin \frac{\pi}{6}}) = (2\sqrt{1}) - (2\sqrt{\frac{1}{2}}) = 2 - \frac{2}{\sqrt{2}} = 2 - \sqrt{2}$$

$$\int \frac{\cos x}{\sqrt[3]{\sin x}} \, dx$$

2015 بازعين حد 1

$$\int \frac{\cos x}{\sqrt[3]{\sin x}} \, dx = \int (\sin x)^{-\frac{1}{3}} \cos x \, dx = \frac{3}{2} (\sin x)^{\frac{2}{3}} + c = \frac{3}{2} \sqrt[3]{\sin^2 x} + c$$

$$\int \sec^2 8x e^{\tan 8x} \, dx$$

2015 خارج حد 1

$$\int \sec^2 8x e^{\tan 8x} \, dx = \frac{1}{8} \int 8 \sec^2 8x e^{\tan 8x} \, dx = \frac{1}{8} e^{\tan 8x} + c$$

جد التكمالات التالية :

2015 حد 4 مراجعة

$$1) \int_3^2 \frac{2x^3 - 1}{x-1} \, dx = -\int_2^3 \frac{2x^3 - 1}{x-1} \, dx = -\int_2^3 \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} \, dx = -\int_2^3 (x^2 + x + 1) \, dx$$

$$= -\left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_2^3 = -\left[\left(9 + \frac{9}{2} + 3\right) - \left(\frac{8}{3} + 2 + 2\right) \right]$$

$$= -\left[12 + \frac{9}{2} - \frac{8}{3} - 4 \right] = -8 - \frac{9}{2} + \frac{8}{3} = \frac{-48 - 27 + 16}{6} = \frac{-59}{6}$$

$$2) \int (\sin 2x + \cos 2x)^2 \, dx = \int (\sin^2 2x + 2\sin 2x \cdot \cos 2x + \cos^2 2x) \, dx$$

$$= \int (1 + \sin 4x) \, dx = x - \frac{1}{4} \cos 4x + c$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \int \sin 6x \cos^2 3x \, dx &= \int 2 \sin 3x \cos 3x \cos^2 3x \, dx \\
 &= 2 \int \cos^3 3x \sin 3x \, dx \\
 &= (2) \left(\frac{-1}{3} \right) \int \cos^3 3x (-3 \sin 3x) \, dx \\
 &= \left(\frac{-2}{3} \right) \left(\frac{1}{4} \right) \cos^4 3x + c = \left(\frac{-1}{6} \right) \cos^4 3x + c
 \end{aligned}$$

$$u = \cos 3x$$

$$du = -3 \sin 3x \, dx$$

تأكيد || يمكن حل السؤال بأكثر من طريقة فالطريقة اعلاه تم توحيد الزوايا بدلالة $3x$ وهناك طريقة اخرى باستخدام القانون $\cos^2 3x = \frac{1}{2} (1 + \cos 6x)$ كما سيرد ذكرها الانه

$$\begin{aligned}
 \int \sin 6x \cos^2 3x \, dx &= \int \sin 6x \left[\frac{1}{2} (1 + \cos 6x) \right] dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \sin 6x \, dx + \frac{1}{2} \int \sin 6x \cos 6x \, dx \\
 &= \frac{1}{12} \int \sin 6x \cdot 6 \, dx + \frac{1}{12} \int \sin 6x (6 \cos 6x) \, dx \\
 &= -\frac{1}{12} \cos 6x + \frac{1}{24} \sin^2 6x + c
 \end{aligned}$$

تأكيد || يمكن حل $\frac{1}{2} \int \sin 6x \cos 6x \, dx$ بطريقتين اضافيتين الاولى نجعل القوس الاصلي هو $\cos 6x$ ويكون الجواب $\frac{-1}{24} \cos^2 6x$ والاخرى تحويل $\sin 6x \cos 6x = \frac{1}{2} \sin 12x$ ثم اجراء التكامل

$$\begin{aligned}
 \text{b) } \int \frac{\sqrt{\cot 2x}}{1 - \cos^2 2x} \, dx &= \int \frac{\sqrt{\cot 2x}}{\sin^2 2x} \, dx = \int (\cot 2x)^{\frac{1}{2}} \csc^2 2x \, dx \\
 &= \frac{-1}{2} \int (\cot 2x)^{\frac{1}{2}} (-2) \csc^2 2x \, dx = \frac{-1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cot^{\frac{3}{2}} 2x + c \\
 &= \frac{-1}{3} \sqrt{\cot^3 2x} + c
 \end{aligned}$$

برنامج رحلتي في السادس

إذا كان للمنحنى $f(x) = (x - 3)^3 + 1$ يمتلك نقطة انقلاب (a, b) جد القيمة العددية للمقدار

2015 ح4 مراجعة

$$\int_0^b f'(x) dx - \int_0^a f''(x) dx$$

الحل :- نقطة الانقلاب ناتجة من مساواة المشتقة الثانية بالصفر

$$f'(x) = 3(x - 3)^2 \Rightarrow f''(x) = 6(x - 3) \Rightarrow 6(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$f(3) = (3 - 3)^3 + 1 = 1 \Rightarrow (3, 1) \text{ نقطة انقلاب}$$

$$(3, 1) = (a, b) \Rightarrow a = 3, b = 1$$

$$\begin{aligned} \int_0^b f'(x) dx - \int_0^a f''(x) dx &= \int_0^1 3(x - 3)^2 dx - \int_0^3 6(x - 3) dx \\ &= [(x - 3)^3]_0^1 - [3(x - 3)^2]_0^3 \\ &= [(1 - 3)^3 - (0 - 3)^3] - [3(3 - 3)^2 - 3(0 - 3)^2] \\ &= [-8 + 27] - [0 - 27] = 19 + 27 = 46 \end{aligned}$$

$f(x)$ دالة مستمرة على الفترة $[-2, 6]$ فإذا كان $\int_1^6 f(x) dx = 6$

2016 حور 1

وكان $\int_{-2}^6 [f(x) + 3] dx = 32$ جد $\int_{-2}^1 f(x) dx$.

$$\text{sol : } \int_{-2}^6 [f(x) + 3] dx = 32 \Rightarrow \int_{-2}^6 [f(x)] dx + \int_{-2}^6 [3] dx = 32$$

$$\Rightarrow \int_{-2}^6 [f(x)] dx + [3x]_{-2}^6 = 32 \Rightarrow \int_{-2}^6 [f(x)] dx + (18) - (-6) = 32$$

$$\Rightarrow \int_{-2}^6 [f(x)] dx + 24 = 32 \Rightarrow \int_{-2}^6 [f(x)] dx = 8, \quad \because \int_1^6 f(x) dx = 6$$

$$\int_{-2}^6 f(x) dx = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^6 f(x) dx \Rightarrow 8 = \int_{-2}^1 f(x) dx + 6 \Rightarrow \int_{-2}^1 f(x) dx = 2$$

برنامج رحلتي في السادس

2016 تمهيدي

تكن $f(x) = x^2 + 2x + k$ حيث $k \in \mathbb{R}$ ، دالة نهايتها الصغرى (-5) جد $\int_{-1}^2 f(x) dx$.

الحل :- بما ان الدالة تمتلك نهاية صغرى فان $f'(x) = 0$

$$f'(x) = 2x + 2 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$$

الدالة تمتلك نهاية صغرى محلية $\Rightarrow f''(x) = 2 > 0$

$\therefore f(x) \in$ نقطة النهاية الصغرى المحلية (-5 , -1)

$$-5 = 1 - 2 + k \Rightarrow k = -4 \Rightarrow f(x) = x^2 + 2x - 4$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 f(x) dx &= \int_{-1}^2 (x^2 + 2x - 4) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(\frac{1}{3}(2)^3 + (2)^2 - 4(2) \right) - \left(\frac{1}{3}(-1)^3 + (-1)^2 - 4(-1) \right) \\ &= \left(\frac{8}{3} + 4 - 8 \right) - \left(-\frac{1}{3} + 1 + 4 \right) = \frac{8}{3} - 4 + \frac{1}{3} - 5 = 3 - 9 = -6 \end{aligned}$$

يمكن ملاحظة العلاقة بين سؤال الكتاب ادناه مع السؤال اعلاه

لتكن $f(x) = x^2 + 2x + k$ حيث $k \in \mathbb{R}$ ، دالة نهايتها الصغرى (-5) جد $\int_1^3 f(x) dx$.

اذا كانت $f(x) = \begin{cases} 2x & , \forall x \geq 3 \\ 6 & , \forall x < 3 \end{cases}$ جد $\int_1^4 f(x) dx$

2016 دور 2 خارج

$$f(3) = (2)(3) = 6$$

الحل :-

$$\lim_{x \rightarrow 3^{(+)}} f(x) = (2)(3) = 6 \quad L_1 \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 3^{(-)}} f(x) = 6 \quad L_2$$

$$\therefore L_1 = L_2 = 6 \Rightarrow \text{الغاية موجودة}$$

$$\therefore f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6 \Rightarrow \text{الدالة مستمرة عند الـ (3)}$$

وكذلك الدالة مستمرة لكل $x < 3$, $x > 3$ لانهما كثيرتا حدود

$$\begin{aligned} \int_1^4 f(x) dx &= \int_1^3 f(x) dx + \int_3^4 f(x) dx = \int_1^3 6 dx + \int_3^4 2x dx \\ &= [6x]_1^3 + [x^2]_3^4 = [(18) - (6)] + [(16) - (9)] \\ &= 12 + 7 = 19 \end{aligned}$$

جد المساحة المحددة بمنحني الدالتين $f(x) = x^2$, $g(x) = x^4 - 12$

$$\text{sol : } h(x) = x^4 - 12 - x^2 \Rightarrow x^4 - x^2 - 12 = 0 \Rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 3) = 0$$

يهمل

$$\Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$A = \left| \int_{-2}^2 f(x) dx \right| \Rightarrow A = \left| \int_{-2}^2 (x^4 - x^2 - 12) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 - 12x \right]_{-2}^2 \right|$$

$$= \left| \left(\frac{32}{5} - \frac{8}{3} - 24 \right) - \left(-\frac{32}{5} + \frac{8}{3} + 24 \right) \right| = \left| \frac{32}{5} - \frac{8}{3} - 24 + \frac{32}{5} - \frac{8}{3} - 24 \right|$$

$$= \left| \frac{64}{5} - \frac{16}{3} - 48 \right| = \left| \frac{192 - 80 - 720}{15} \right| = \left| \frac{-608}{15} \right| = \frac{608}{15} \text{ وحدة مساحة}$$

1997 دور 2

2008 دور 1

2008 خارج

2015 دور 2 خارج

2015 دور 3

2016 دور 2 خارج

جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = x^4 - 4x^2$ ومحور السينات بالفترة $[1, 3]$

$$\text{sol : if } y = 0 \Rightarrow x^4 - 4x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 4) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \notin [1, 3] \text{ OR } x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \in [1, 3], x = -2 \notin [1, 3]$$

$$A = \left| \int_1^2 f(x) dx \right| + \left| \int_2^3 f(x) dx \right|$$

$$A = \left| \int_1^2 (x^4 - 4x^2) dx \right| + \left| \int_2^3 (x^4 - 4x^2) dx \right|$$

$$A = |A_1| + |A_2|$$

$$A_1 = \int_1^2 (x^4 - 4x^2) dx = \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 \right]_1^2$$

$$= \left(\frac{32}{5} - \frac{32}{3} \right) - \left(\frac{1}{5} - \frac{4}{3} \right) = \left(\frac{32}{5} - \frac{32}{3} - \frac{1}{5} + \frac{4}{3} \right) = \frac{31}{5} - \frac{28}{3} = \frac{93 - 140}{15} = \frac{-47}{15}$$

$$A_2 = \int_2^3 (x^4 - 4x^2) dx = \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 \right]_2^3$$

$$= \left(\frac{243}{5} - \frac{108}{3} \right) - \left(\frac{32}{5} - \frac{32}{3} \right) = \left(\frac{243}{5} - \frac{108}{3} - \frac{32}{5} + \frac{32}{3} \right) = \frac{211}{5} - \frac{76}{3} = \frac{633 - 380}{15} = \frac{253}{15}$$

$$A = |A_1| + |A_2| = \left| \frac{-47}{15} \right| + \left| \frac{253}{15} \right| = \frac{47}{15} + \frac{253}{15} = \frac{300}{15} = 20 \text{ وحدة مساحة}$$

1998 دور 1

ند المساحة المحددة بمنحني الدالتين $f(x) = x$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$ بالفترة $[-1, 1]$

بتربيع الطرفين $[\sqrt[3]{x} = x] \Rightarrow \sqrt[3]{x} - x = 0 \Rightarrow h(x) = x - \sqrt[3]{x}$ **sol :**

1999 دور 1

2005 تمميد

$$x = x^3 \Rightarrow x - x^3 = 0 \Rightarrow x(1 - x^2) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ OR } x = \pm 1 \in [-1, 1] \text{ لا تجزأ}$$

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_{-1}^0 h(x) dx \right| + \left| \int_0^1 h(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{-1}^0 \left(x^{\frac{1}{3}} - x \right) dx \right| + \left| \int_0^1 \left(x^{\frac{1}{3}} - x \right) dx \right| \\ &= \left[\frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} - \frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 \\ &= \left| (0 - 0) - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) \right| + \left| \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) - (0 - 0) \right| \\ &= \left| -\frac{1}{4} \right| + \left| \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ وحدة مساحة} \end{aligned}$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

177

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

2011 دور 1

المساحة المحددة بمنحني الدالتين $f(x) = x$, $g(x) = \sqrt{x}$ بتربيع الطرفين $[\sqrt{x} = x] \Rightarrow \sqrt{x} - x = 0 \Rightarrow \sqrt{x} - x = 0$

$$x = x^2 \Rightarrow x - x^2 = 0 \Rightarrow x(1 - x) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ OR } x = 1$$

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_0^1 h(x) dx \right| = \left| \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx \right| = \left| \int_0^1 (x^{\frac{1}{2}} - x) dx \right| \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 = \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 \\ &= \left| \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) - (0 - 0) \right| = \left| \frac{4-3}{6} \right| = \frac{1}{6} \text{ وحدة مساحة} \end{aligned}$$

المساحة المحددة بمنحني الدالتين $f(x) = 2 - x^2$, $g(x) = x$ بالفترة $[-2, 2]$

1999 دور 2

sol : $h(x) = x - (2 - x^2) = x^2 + x - 2$, $x^2 + x - 2 = 0$ $(x + 2)(x - 1) = 0 \Rightarrow$ either $x = -2 \in [-2, 2]$, or $x = 1 \in [-2, 2]$

$$A = \left| \int_{-2}^1 h(x) dx \right| + \left| \int_1^2 h(x) dx \right|$$

$$= \left| \int_{-2}^1 (x^2 + x - 2) dx \right| + \left| \int_1^2 (x^2 + x - 2) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 - 2x \right]_{-2}^1 \right| + \left| \left[\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 - 2x \right]_1^2 \right|$$

$$= \left| \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) - \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) \right| + \left| \left(\frac{8}{3} + 2 - 4 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) \right|$$

$$= \left| \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 + \frac{8}{3} - 6 \right) \right| + \left| \left(\frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) \right| = \dots = \frac{19}{3} \text{ unit}^2$$

برنامج رحلتي في السادس

جد المساحة المحددة بالمنحني $f(x) = x^3 - 9x$ ومحور السينات بالفترة $[-3, 3]$

2001 دور 1

2015 دور 2

sol : if $y = 0 \Rightarrow x^3 - 9x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 9) = 0$

لا يجزأ $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \in [-3, 3]$ OR يجزأ $x = 0 \in [-3, 3]$

$$A = \left| \int_{-3}^0 f(x) dx \right| + \left| \int_0^3 f(x) dx \right| = \left| \int_{-3}^0 (x^3 - 9x) dx \right| + \left| \int_0^3 (x^3 - 9x) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 \right]_{-3}^0 \right| + \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{9}{2}x^2 \right]_0^3 \right|$$

$$= \left| (0) - \left(\frac{81}{4} - \frac{81}{2} \right) \right| + \left| \left(\frac{81}{4} - \frac{81}{2} \right) - (0) \right| = \left| \frac{81}{4} \right| + \left| -\frac{81}{4} \right| = \frac{81}{4} + \frac{81}{4} = \frac{81}{2} \text{ وحدة مساحة}$$

جد المساحة المحددة بالمنحني $f(x) = x^3 - 4x$ ومحور السينات بالفترة $[-2, 2]$

2007 تمهيدي

sol : if $y = 0 \Rightarrow x^3 - 4x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 4) = 0$

لا يجزأ $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \in [-2, 2]$ OR يجزأ $x = 0 \in [-2, 2]$

$$A = \left| \int_{-2}^0 f(x) dx \right| + \left| \int_0^2 f(x) dx \right| = \left| \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx \right| + \left| \int_0^2 (x^3 - 4x) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 \right]_{-2}^0 \right| + \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 \right]_0^2 \right|$$

$$= \left| (0) - (4 - 8) \right| + \left| (4 - 8) - (0) \right| = |4| + |-4| = 4 + 4 = 8 \text{ وحدة مساحة}$$

جد المساحة المحددة بمنحني الدالتين $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x$ بالفترة $[1, 3]$

2002 دور 1

sol : $h(x) = g(x) - f(x) = x^2 - 2x$

$$\Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x - 2) = 0$$

either $x = 0 \notin [1, 3]$, or $x = 2 \in [1, 3]$

$$A = \left| \int_1^2 h(x) dx \right| + \left| \int_2^3 h(x) dx \right| = \left| \int_1^2 (x^2 - 2x) dx \right| + \left| \int_2^3 (x^2 - 2x) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_1^2 \right| + \left| \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 \right|$$

$$= \left| \left(\frac{8}{3} - 4 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right| + \left| (9 - 9) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) \right| = \dots = 2 \text{ unit}^2$$

جد المساحة المحددة بمنحني الدالتين $f(x) = 3x^2$, $g(x) = x^4 - 4$

2002 دور 2

sol : $h(x) = g(x) - f(x) = x^4 - 4 - 3x^2 = x^4 - 3x^2 - 4$

if $h(x) = 0 \Rightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 1) = 0$
يهمل

$\Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \text{ OR } x = -2$

$$A = \left| \int_{-2}^2 f(x) dx \right| = \left| \int_{-2}^2 (x^4 - 3x^2 - 4) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{5}x^5 - x^3 - 4x \right]_{-2}^2 \right| = \left| \left(\frac{32}{5} - 8 - 8 \right) - \left(-\frac{32}{5} + 8 + 8 \right) \right|$$

$$= \left| \frac{32}{5} - 8 - 8 + \frac{32}{5} - 8 - 8 \right| = \left| \frac{64}{5} - 32 \right| = \left| \frac{64 - 160}{5} \right| = \left| \frac{-96}{5} \right| = \frac{96}{5} \text{ unit}^2$$

جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = x^3 + 4x^2 + 3x$ ومحور السينات

2005 دور 1

sol : if $y = 0 \Rightarrow x^3 + 4x^2 + 3x = 0$

$\Rightarrow x(x^2 + 4x + 3) = 0 \Rightarrow x(x + 3)(x + 1) = 0$

$x = 0 \quad \text{OR} \quad x = -3 \quad \text{OR} \quad x = -1$

$A = \left| \int_{-3}^{-1} f(x) dx \right| + \left| \int_{-1}^0 f(x) dx \right|$

$A = \left| \int_{-3}^{-1} (x^3 + 4x^2 + 3x) dx \right| + \left| \int_{-1}^0 (x^3 + 4x^2 + 3x) dx \right|$

$= \left| \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_{-3}^{-1} \right| + \left| \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_{-1}^0 \right|$

$= \left| \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{3} + \frac{3}{2} \right) - \left(\frac{81}{4} - \frac{108}{3} + \frac{27}{2} \right) \right| + \left| \left(0 \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{3} + \frac{3}{2} \right) \right|$

$= \left| \left(\frac{1}{4} - \frac{4}{3} + \frac{3}{2} - \frac{81}{4} + \frac{108}{3} - \frac{27}{2} \right) \right| + \left| -\frac{1}{4} + \frac{4}{3} - \frac{3}{2} \right|$

$= \left| \frac{-80}{4} + \frac{104}{3} - \frac{24}{2} \right| + \left| \frac{-3+16-18}{12} \right| = \left| -32 + \frac{104}{3} \right| + \left| \frac{-5}{12} \right|$

$= \left| \frac{8}{3} \right| + \left| \frac{-5}{12} \right| = \frac{8}{3} + \frac{5}{12} = \frac{32+5}{12} = \frac{37}{12} \text{ وحدة مساحة}$

ند المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ ومحور السينات

2006 تمهيدي

2013 دور 1

sol : if $y = 0 \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2x = 0$

$$\Rightarrow x(x^2 - 3x + 2) = 0 \Rightarrow x(x - 2)(x - 1) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{OR} \quad x = 2 \quad \text{OR} \quad x = 1$$

$$A = \left| \int_0^1 f(x) dx \right| + \left| \int_1^2 f(x) dx \right|$$

$$A = \left| \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx \right| + \left| \int_1^2 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right]_0^1 \right| + \left| \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right]_1^2 \right|$$

$$= \left| \left(\frac{1}{4} - 1 + 1 \right) - (0) \right| + \left| \left(4 - 8 + 4 \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 + 1 \right) \right|$$

$$= \left| \frac{1}{4} \right| + \left| -\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ وحدة مساحة}$$

ند المساحة المحددة بالمنحني $f(x) = 3x^2 + 4$ ومحور السينات بالفترة $[-2, 2]$

sol : $y \neq 0$ دائما $3x^2 + 4 > 0$ حيث

2008 تمهيدي

2010 تمهيدي

$$A = \left| \int_{-2}^2 f(x) dx \right| = \left| \int_{-2}^2 (3x^2 + 4) dx \right|$$

$$= \left| \left[x^3 + 4x \right]_{-2}^2 \right| = \left| (8 + 8) - (-8 - 8) \right| = \left| 16 + 16 \right| = 32 \text{ وحدة مساحة}$$

ند المساحة المحددة بين منحني القطع المكافئ $y = x^2$ والمستقيم الذي معادلته $y = 2x + 3$

sol : $h(x) = g(x) - f(x) = x^2 - 2x - 3$

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = 3, x = -1$$

$$A = \left| \int_{-1}^3 (x^2 - 2x - 3) dx \right| = \dots$$

2014 خارج المقرر

2015 تمهيدي

جد المساحة المحصورة بين المنحنيين $y = x^3$, $y = x$

$$\text{sol: } h(x) = x^3 - x \Rightarrow x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x(x - 1)(x + 1) = 0$$

$$x = 0 \text{ OR } x = 1 \text{ OR } x = -1$$

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_{-1}^0 h(x) dx \right| + \left| \int_0^1 h(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx \right| + \left| \int_0^1 (x^3 - x) dx \right| \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ &= \left| (0 - 0) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \right| + \left| \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) - (0 - 0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{4} \right| + \left| \frac{-1}{4} \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ وحدة مساحة} \end{aligned}$$

2012 تمهيدي

جد المساحة المحددة بالمنحنيين $y = x^4 - 8$, $y = 2x^2$

$$\text{sol: } h(x) = x^4 - 2x^2 - 8 \Rightarrow x^4 - 2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 2) = 0$$

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_{-2}^2 h(x) dx \right| = \left| \int_{-2}^2 (x^4 - 2x^2 - 8) dx \right| \\ &= \left| \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 - 8x \right]_{-2}^2 \right| = \dots \end{aligned}$$

2012 حور 1

جد المساحة المحددة بالمنحني $f(x) = (x - 1)^3$ ومحور السينات في الفترة $[-1, 3]$

$$\text{sol: } (x - 1)^3 = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \in [-1, 3]$$

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| + \left| \int_1^3 f(x) dx \right| = \left| \int_{-1}^1 (x - 1)^3 dx \right| + \left| \int_1^3 (x - 1)^3 dx \right| \\ &= \left| \left[\frac{1}{4} (x - 1)^4 \right]_{-1}^1 \right| + \left| \left[\frac{1}{4} (x - 1)^4 \right]_1^3 \right| = \dots = 8 \text{ unit}^2 \end{aligned}$$

2013 حور 3

جد المساحة المحددة بالمنحني $f(x) = x^2$ ومحور السينات والمستقيمين $x = 1$, $x = 3$

$$\text{sol: } \text{if } y = 0 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \notin [1, 3]$$

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_1^3 f(x) dx \right| = \left| \int_1^3 (x^2) dx \right| \\ &= \left| \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_1^3 \right| = \left| (9) - \left(\frac{1}{3} \right) \right| = \left| \frac{26}{3} \right| = \frac{26}{3} \text{ وحدة مساحة} \end{aligned}$$

2014 تمميد

جد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنى $f(x) = x^2 - 4$ ومحور السينات وعلى الفترة $[-2, 3]$

$$\text{sol: if } y = 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$$

$$\Rightarrow x = 2 \in [-2, 3] \text{ , لا تجزأ } , x = -2 \in [-2, 3]$$

$$A = \left| \int_{-2}^2 f(x) dx \right| + \left| \int_2^3 f(x) dx \right|$$

$$= \left| \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx \right| + \left| \int_2^3 (x^2 - 4) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x \right]_{-2}^2 \right| + \left| \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x \right]_2^3 \right|$$

$$= \left| \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) \right| + \left| (9 - 12) - \left(\frac{8}{3} - 8 \right) \right|$$

$$= \left| -\frac{16}{3} - \frac{16}{3} \right| + \left| -3 + \frac{16}{3} \right|$$

$$= \frac{32}{3} + \frac{7}{3} = \frac{39}{3} = 13 \text{ وحدة مساحة}$$

جد المساحة المحددة بالمنحنيين $y = \sin x$, $y = \sin x \cdot \cos x$ بالفترة $[0, 2\pi]$

$$\text{sol: } h(x) = \sin x \cos x - \sin x = \sin x (\cos x - 1)$$

$$\Rightarrow \sin x (\cos x - 1) = 0$$

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = 0 \in [0, 2\pi] \text{ OR } x = \pi \in [0, 2\pi] \text{ OR } x = 2\pi \in [0, 2\pi]$$

$$\cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = 1 \Rightarrow x = 0$$

$$A = \left| \int_0^\pi h(x) dx \right| + \left| \int_\pi^{2\pi} h(x) dx \right|$$

$$= \left| \int_0^\pi \sin x (\cos x - 1) dx \right| + \left| \int_\pi^{2\pi} \sin x (\cos x - 1) dx \right|$$

$$= \left| -\int_0^\pi (\cos x - 1)(-\sin x) dx \right| + \left| -\int_\pi^{2\pi} (\cos x - 1)(-\sin x) dx \right|$$

$$= \left| \left[-\frac{1}{2} (\cos x - 1)^2 \right]_0^\pi \right| + \left| \left[-\frac{1}{2} (\cos x - 1)^2 \right]_\pi^{2\pi} \right|$$

$$= \frac{1}{2} \left| [(\cos \pi - 1)^2 - (\cos 0 - 1)^2] \right| + \frac{1}{2} \left| [(\cos 2\pi - 1)^2 - (\cos \pi - 1)^2] \right|$$

$$= \frac{1}{2} \left| [(-1 - 1)^2 - (1 - 1)^2] \right| + \frac{1}{2} \left| [(1 - 1)^2 - (-1 - 1)^2] \right|$$

$$= \frac{1}{2} | 4 | + \frac{1}{2} | 4 | = 2 + 2 = 4 \text{ وحدة مساحة}$$

1998 دور 2

2004 دور 1

2009 تمميد

2014 دور 1

2015 خارج

Mob: 07902162268

183

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

ند المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = 1 - 2\sin^2 x$ ومحور السينات بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2001 دور 2

2016 دور 2

sol : if $y = 0 \Rightarrow y = 1 - 2\sin^2 x = 0 \Rightarrow \cos 2x = 0$

$$2x = \frac{\pi}{2} + n\pi, n = 0, 1, 2$$

$n = 0 \Rightarrow 2x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ [يجزأ التكامل]

$n = 1 \Rightarrow 2x = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4} \notin [0, \frac{\pi}{2}]$ [لايجزأ التكامل]

$n = 2 \Rightarrow 2x = \frac{5\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{4} \notin [0, \frac{\pi}{2}]$ [لايجزأ التكامل]

لاحظ عدم تعويض القيم السالبة لـ (n) لان الفترة في السؤال موجبة .

$$A = \left| \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \right| = \left| \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2x) dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos 2x) dx \right|$$

$$= \left| \left[\frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \right| + \left| \left[\frac{1}{2} \sin 2x \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \right|$$

$$= \frac{1}{2} \left| \left(\sin \frac{\pi}{2} \right) - (\sin 0) \right| + \frac{1}{2} \left| \left(\sin \pi \right) - \left(\sin \frac{\pi}{2} \right) \right| = \frac{1}{2} \left| (1) - (0) \right| + \frac{1}{2} \left| (0) - (1) \right|$$

$$= \frac{1}{2} \left| 1 \right| + \frac{1}{2} \left| -1 \right| = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ وحدة مساحة}$$

((ملاحظة ممكن ان يكون السؤال السابق بالصيغ التالية)))

$$\{ \textcircled{1} y = 1 - 2\sin^2 x, \textcircled{2} y = \cos^2 x - \sin^2 x, \textcircled{3} y = \cos^4 x - \sin^4 x \} = \cos 2x$$

$$\{ \textcircled{4} y = 2\sin^2 x - 1, \textcircled{5} y = 1 - 2\cos^2 x, \textcircled{6} y = \sin^2 x - \cos^2 x \} = -\cos 2x$$

ند المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = \cos 2x$ ومحور السينات بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2003 دور 2

ند المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = 2\cos^2 x - 1$ ومحور السينات بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2006 دور 2

2016 دور 1

ند المساحة المحددة بالمنحنيين $f(x) = \cos^2 x, g(x) = \sin^2 x$ ومحور السينات

بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2009 دور 2

ند المساحة المحددة بمنحني الدالتين $y = 1 + \cos x$, $y = -\cos x$ بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2004 دور 2

sol : $h(x) = 1 + \cos x + \cos x = 1 + 2\cos x$

$1 + 2\cos x = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3}$ زاوية الاسناد تساوي

$x = \frac{2\pi}{3} \notin [0, \frac{\pi}{2}]$ or $x = \frac{4\pi}{3} \notin [0, \frac{\pi}{2}]$

$A = | \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x) dx | = | \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \cos x) dx |$

$= | [x + 2 \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} | = | (0) - (\frac{\pi}{2} + 2 \sin \frac{\pi}{2}) | = \frac{\pi}{2} + 2 \text{ unit}^2$

ند المساحة المحددة بالمنحنيين $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \sin x$ بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2005 دور 2

sol : $h(x) = \sin 2x - \sin x = 2\sin x \cos x - \sin x = \sin x(2\cos x - 1)$

2006 دور 1

$\sin x(2\cos x - 1) = 0$

$\sin x = 0 \Rightarrow x = 0 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ OR $x = \pi \notin [0, \frac{\pi}{2}]$

زاوية الاسناد $\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow 2\cos x = 1 \Rightarrow 2\cos x - 1 = 0$ او

$x = \frac{\pi}{3} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ (الربع الاول) OR $x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \notin [0, \frac{\pi}{2}]$ (الربع الرابع)

$A = | \int_0^{\frac{\pi}{3}} h(x) dx | + | \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} h(x) dx |$

$= | \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x(2\cos x - 1) dx | + | \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x(2\cos x - 1) dx |$

$= | -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2\cos x - 1)(-2\sin x) dx | + | -\frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos x - 1)(-2\sin x) dx |$

$= | [-\frac{1}{4} (2\cos x - 1)^2]_0^{\frac{\pi}{3}} | + | [-\frac{1}{4} (2\cos x - 1)^2]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} |$

$= \frac{1}{4} | [(2\cos \frac{\pi}{3} - 1)^2 - (2\cos 0 - 1)^2] | + \frac{1}{4} | [(2\cos \frac{\pi}{2} - 1)^2 - (2\cos \frac{\pi}{3} - 1)^2] |$

$= \frac{1}{4} | [(1 - 1)^2 - (2 - 1)^2] | + \frac{1}{4} | [(0 - 1)^2 - (1 - 1)^2] | = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ وحدة مساحة

ند المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = \sin 4x$ ومحور السينات بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2007 دور 1

sol : if $y = 0 \Rightarrow \sin 4x = 0 \Rightarrow 4x = 0 + n\pi, n = 0, 1, 2$

$n = 0 \Rightarrow 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ التكامل

$n = 1 \Rightarrow 4x = \pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ يجزأ التكامل

$n = 2 \Rightarrow 4x = 2\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ التكامل

لاحظ عدم تعويض القيم السالبة لـ (n)
لان الفترة في السؤال موجبة .

$$A = \left| \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \right| = \left| \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 4x) dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin 4x) dx \right|$$

$$= \left| \left[-\frac{1}{4} \cos 4x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \right| + \left| \left[-\frac{1}{4} \cos 4x \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \right|$$

$$= \frac{1}{4} |(\cos \pi) - (\cos 0)| + \frac{1}{4} |(\cos 2\pi) - (\cos \pi)| = \frac{1}{4} |(-1) - (1)| + \frac{1}{4} |(1) - (-1)|$$

$$= \frac{1}{4} |-2| + \frac{1}{4} |2| = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \text{ وحدة مساحة}$$

ند المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = \sin 2x$ ومحور السينات بالفترة $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

2008 دور 2

sol : if $y = 0 \Rightarrow \sin 2x = 0 \Rightarrow 2x = 0 + n\pi, n = 0, 1, 2$

$n = 0 \Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ يجزأ التكامل

$n = 1 \Rightarrow 2x = \pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ التكامل

$n = -1 \Rightarrow 2x = -\pi \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ التكامل

لاحظ انه سنقوم بتعويض القيم السالبة لـ (n)
لان الفترة في السؤال موجبة وسالبة .

$$A = \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f(x) dx \right| + \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \right| = \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin 2x) dx \right| + \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x) dx \right|$$

$$= \left| \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_{-\frac{\pi}{2}}^0 \right| + \left| \left[-\frac{1}{2} \cos 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right|$$

$$= \frac{1}{2} |(\cos 0) - (\cos -\pi)| + \frac{1}{2} |(\cos \pi) - (\cos 0)|$$

$$= \frac{1}{2} |(1) - (-1)| + \frac{1}{2} |(-1) - (1)|$$

$$= \frac{1}{2} |2| + \frac{1}{2} |-2| = 1 + 1 = 2 \text{ وحدة مساحة}$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

186

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

بـ المساحة المحددة بين المنحنيين $y = \sin^2 x$, $y = \sin x$ بالفترة $[0, \frac{\pi}{2}]$

2012 خارج القطر

sol : $h(x) = \sin^2 x - \sin x = \sin x (\sin x - 1)$

$\sin x (\sin x - 1) = 0 \Rightarrow \text{either } \sin x = 0 \Rightarrow x = 0 + n\pi$

$n = 0 \Rightarrow x = 0 \in [0, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ التكامل

$n = 1 \Rightarrow x = \pi \notin [0, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ التكامل

OR $\sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ لايجزأ التكامل

لاحظ عدم تعويض القيم السالبة لـ (n)
لان الفترة في السؤال موجبة .

$A = \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 x - \sin x) dx \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} (1 - \cos 2x) - \sin x \right] dx$

$\left| \left[\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right| = \left| \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \pi \right) + \cos \frac{\pi}{2} \right] - \left[\frac{1}{2} \left(0 - \frac{1}{2} \sin 0 \right) + \cos 0 \right] \right|$

$= \left| \frac{\pi}{4} - 1 \right| = 1 - \frac{\pi}{4} \text{ unit}^2$

لاحظ ان النصف قبل اجراء التكامل لم نستطع ان نخرجه الى خارج التكامل لأنه غير تابع لكل مابعد

بـ المساحة المحددة بالمنحنيين $f(x) = 2\sin x + 1$, $g(x) = \sin x$ على الفترة $[0, \frac{3\pi}{2}]$

2013 دور 2

2015 نازحين 1

sol : $h(x) = 2\sin x + 1 - \sin x = \sin x + 1$

$\sin x + 1 = 0 \Rightarrow \sin x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2} \in [0, \frac{3\pi}{2}]$ لاتجزئ التكامل

$A = \left| \int_0^{\frac{3\pi}{2}} h(x) dx \right| = \left| \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (\sin x + 1) dx \right|$

$= \left| \left[-\cos x + x \right]_0^{\frac{3\pi}{2}} \right|$

$= \left| \left(-\cos \frac{3\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} \right) - (-\cos 0 + 0) \right| = \left| \left(\frac{3\pi}{2} \right) - (-1) \right| = \frac{3\pi+2}{2}$ وحدة مساحة

برنامج رحلتي في السادس

جد المساحة المحدد بالمنحني $f(x) = \cos x$ والمنحني $g(x) = \sin x$

2014 تمميد في

وعلى الفترة $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

sol : $h(x) = \cos x - \sin x \Rightarrow \cos x - \sin x = 0 \Rightarrow \cos x = \sin x \Rightarrow \tan x = 1$

زاوية الاسناد $\theta = \frac{\pi}{4}$ ودالة الظل تكون موجبة في الربعين الاول والثالث لذلك فان

$$x = \frac{\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \quad \text{OR} \quad x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \notin [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$A = \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} h(x) dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} h(x) dx \right|$$

$$= \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - \sin x) dx \right|$$

$$= \left| \left[\sin x + \cos x \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \right| + \left| \left[\sin x + \cos x \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \right|$$

$$= \left| \left(\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \right) - \left(\sin(-\frac{\pi}{2}) + \cos(-\frac{\pi}{2}) \right) \right| + \left| \left(\sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} \right) - \left(\sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$= \left| \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) - (-1 + 0) \right| + \left| (1 + 0) - \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right|$$

$$= \left| \left(\frac{2}{\sqrt{2}} + 1 \right) \right| + \left| 1 - \frac{2}{\sqrt{2}} \right| = \left| \sqrt{2} + 1 \right| + \left| 1 - \sqrt{2} \right|$$

$$= (\sqrt{2} + 1) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} \text{ وحدة مساحة}$$

جسم يتحرك على خط مستقيم وكانت سرعته $v(t) = \frac{3}{2} \sqrt{t} + \frac{3}{\sqrt{t}} \text{ m/sec}$ وكان بعده بعد

مرور 4 ثواني من بدء الحركة يساوي 20 m جد ازاحته عند كل t

2003 دور 1

2010 تمميد في

حل اذا علمت معادلة السرعة وطلب ايجاد الازاحة في ثانية محددة او الازاحة في اي زمن وعلم

في السؤال بعد الجسم والزمن المقطوع عنده فان نوع التكامل يكون غير محدد علما ان هذا الاحتمال تم تجاهله في

المنهج الحالي ولا بأس بالتطرق اليه للاحتياط

$$s(t) = \int v(t) dt = \int \left(\frac{3}{2} t^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{t^{\frac{1}{2}}} \right) dt = \int \left(\frac{3}{2} t^{\frac{1}{2}} + 3 t^{-\frac{1}{2}} \right) dt = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + 3 \cdot 2 t^{\frac{1}{2}} + c$$

$$s(t) = \sqrt{t^3} + 6 \sqrt{t} + c \Rightarrow 20 = 8 + 12 + c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow s(t) = \sqrt{t^3} + 6 \sqrt{t}$$

جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل قدره 18 m/sec^2 (18) فإذا كانت سرعته قد أصبحت 82 m/sec بعد مرور 4 sec من بدء الحركة جد :

1997 دور 1

(a) المسافة خلال الثانية الرابعة .

(b) بعده عن نقطة بدء الحركة بعد مرور 10 ثواني .

$$v(t) = \int a(t) dt \Rightarrow v(t) = \int 18 dt \Rightarrow v(t) = 18t + c$$

الحل :-

$$v(t) = 82 \text{ عندما } t = 4$$

$$82 = 72 + c \Rightarrow c = 10 \Rightarrow v(t) = 18t + 10$$

$$\begin{aligned} \text{a) } d &= \left| \int_3^4 V(t) dt \right| = \left| \int_3^4 (18t + 10) dt \right| \\ &= \left| \left[9t^2 + 10t \right]_3^4 \right| = \left| (144 + 40) - (81 + 30) \right| \\ &= \left| 184 - 111 \right| = 73 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } s &= \int_0^{10} V(t) dt = \int_0^{10} (18t + 10) dt = \left[9t^2 + 10t \right]_0^{10} \\ &= (900 + 100) - (0 - 0) = 1000 \text{ m} \end{aligned}$$

جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل قدره 18 m/sec^2 (18) فإذا كانت سرعته قد أصبحت 82 m/sec بعد مرور 4 sec من بدء الحركة جد :

2015 دور 1

(1) المسافة خلال الثانية الثانية .

(2) بعده عن نقطة بدء الحركة بعد مرور ثانيتين .

$$v(t) = \int a(t) dt \Rightarrow v(t) = \int 18 dt \Rightarrow v(t) = 18t + c$$

الحل :-

$$v(t) = 82 \text{ عندما } t = 4$$

$$82 = 72 + c \Rightarrow c = 10 \Rightarrow v(t) = 18t + 10$$

$$1) \quad d = \left| \int_1^2 V(t) dt \right| = \dots\dots = 37 \text{ m}$$

$$2) \quad s = \int_0^2 V(t) dt = \int_0^2 (18t + 10) dt = \dots\dots = 56 \text{ m}$$

نسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = (2t - 4) \text{ m/s}$ جد المسافة المقطوعة بالفترة

2000 حور 2

[1,6] ثم جد بعد الجسم بعد مضي 4 ثواني من بدء الحركة

(a) المسافة المقطوعة بالفترة [1 ، 6] .

sol : $v(t) = 0 \Rightarrow 2t - 4 = 0 \Rightarrow t = 2 \in [1, 6]$

$$\begin{aligned} d &= \left| \int_1^2 V(t) dt \right| + \left| \int_2^6 V(t) dt \right| = \left| \int_1^2 (2t - 4) dt \right| + \left| \int_2^6 (2t - 4) dt \right| \\ &= \left| [t^2 - 4t]_1^2 \right| + \left| [t^2 - 4t]_2^6 \right| \\ &= \left| (4 - 8) - (1 - 4) \right| + \left| (36 - 24) - (4 - 8) \right| \\ &= \left| -4 + 3 \right| + \left| 12 + 4 \right| = 1 + 16 = 17 \text{ m} \end{aligned}$$

(b) بعده بعد مضي (4) ثواني من بدء الحركة .

sol : $s = \int_0^4 V(t) dt = \int_0^4 (2t - 4) dt = [t^2 - 4t]_0^4$
 $= (16 - 16) - (0 - 0) = 0 \text{ m}$

ا. كانت سرعة جسم يتحرك على خط مستقيم هي $v(t) = 3t^2 + 6t + 3$ احسب

2003 حور 2

1 المسافة المقطوعة بالفترة [2,4] 2 الازاحة المقطوعة بالفترة [2,4]

3 الزمن اللازم ليصبح التعجيل 18 m/sec^2

sol : $v(t) = 0 \Rightarrow 3t^2 + 6t + 3 = 0 \Rightarrow 3(t^2 + 2t + 1) = 0 \Rightarrow 3(t + 1)^2 = 0$

$\Rightarrow t = -1 \notin [2, 4]$

$$\begin{aligned} d &= \left| \int_2^4 V(t) dt \right| = \left| \int_2^4 (3t^2 + 6t + 3) dt \right| \\ &= \left| [t^3 + 3t^2 + 3t]_2^4 \right| = \left| (64 + 48 + 12) - (8 + 12 + 6) \right| \\ &= \left| 124 - 26 \right| = 98 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s &= \int_2^4 V(t) dt = \int_2^4 (3t^2 + 6t + 3) dt \\ &= [t^3 + 3t^2 + 3t]_2^4 = (64 + 48 + 12) - (8 + 12 + 6) \\ &= 124 - 26 = 98 \text{ m} \end{aligned}$$

$a(t) = v'(t) = 6t + 6 \Rightarrow 18 = 6t + 6 \Rightarrow 6t = 12 \Rightarrow t = 2 \text{ sec}$

قصي هاشم التميمي

نسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل ثابت مقداره 5 m/sec^2 فاذا كان بعده من بدء الحركة يساوي 180 m بعد مرور 6 sec والسرعة عندها 45 m/sec جد السرعة عند $t=2$

2004 دور 2

$$v(t) = \int a(t) dt \Rightarrow v(t) = \int 5 dt \Rightarrow v(t) = 5t + c$$

الحل :-

$$v(t) = 45 \text{ عندما } t = 6$$

$$45 = 30 + c \Rightarrow c = 15 \Rightarrow v(t) = 5t + 15$$

$$v(2) = 10 + 15 = 25 \text{ m/s}$$

تلميح \\\ لو طلب إيجاد الاراحة او البعد في زمن محدد او في اي زمن عندها نجري تكاملا غير محدد لان البعد معلوم 180 بعد مرور 4 ثواني ومنها نستخرج قيمة c وهذا السؤال يدل على ان ليس بالضرورة ان كل المعلومات التي تعطى في السؤال يمكن الاستفادة منها .

نسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل منتظم يساوي $(3t + 2) \text{ m/s}^2$ جد سرعة الجسم بعد مضي 2 sec من بدء الحركة ثم جد المسافة المقطوعة بالفترة $[2,6]$

2005 تمهيدي

$$\text{sol : } v(t) = \int a(t) dt \Rightarrow v(t) = \int (3t + 2) dt \Rightarrow v(t) = \frac{3}{2}t^2 + 2t + c$$

بما ان التعجيل منتظم فإنه في بدء الحركة يكون فيها $v = 0$, $t = 0$ اي انه $c = 0$

$$v(t) = \frac{3}{2}t^2 + 2t$$

$$\text{a) } v(2) = 6 + 4 = 10 \text{ m/s}$$

b) بما ان السرعة مجموع حدين او اكثر فلا داعي الى مساواتها بالصفر عن حساب المسافة المقطوعة بفترة معين لان الزمن وان وجد ستكون قيمته سالبة او صفر وفي الحالتين لايجزأ التكامل .

$$\begin{aligned} d &= \left| \int_2^6 V(t) dt \right| = \left| \int_2^6 \left(\frac{3}{2}t^2 + 2t \right) dt \right| = \left| \left[\frac{1}{2}t^3 + t^2 \right]_2^6 \right| \\ &= \left| (108 + 36) - (4 + 4) \right| = \left| 136 \right| = 136 \text{ m} \end{aligned}$$

تتحرك نقطة مادية من السكون وبعد t ثانية من بدء الحركة اصبحت سرعتها $(100t - 6t^2)$ m/s
جد الزمن اللازم لعودة النقطة الى موضعها الاول الذي بدأت منه ثم احسب التعجيل عندها .

نفرض ان الزمن اللازم لعودة النقطة الى موضعها الاول n **sol :**

$$s = \int_0^n V(t) dt = \int_0^n (100t - 6t^2) dt = [50t^2 - 2t^3]_0^n \\ = (50n^2 - 2n^3) - (0) = 50n^2 - 2n^3$$

∴ الجسم عاد الى النقطة التي تحرك منها فان الازاحة تساوي (0)

$$0 = 50n^2 - 2n^3 \Rightarrow 2n^2 (25 - n) = 0 \Rightarrow n = 0 \text{ يهمل OR } n = 25 \text{ sec}$$

$$a(t) = v'(t) = 100 - 12t \Rightarrow a(25) = 100 - 300 = -200 \text{ m/sec}^2$$

حل آخر //

$$s = \int V(t) dt = \int (100t - 6t^2) dt \Rightarrow s = 50t^2 - 2t^3 + c$$

بما ان الحركة من السكون فان $(s=0, t=0)$

$$0 = 0 + c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow s = 50t^2 - 2t^3 \quad (s=0) \text{ بما ان الجسم عاد الى موضعه الاول فان}$$

$$0 = 50t^2 - 2t^3 \Rightarrow 2t^2 (25 - t) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ يهمل OR } t = 25 \text{ sec}$$

$$a(t) = v'(t) = 100 - 12t \Rightarrow a(25) = 100 - 300 = -200 \text{ m/sec}^2$$

تتحرك سيارة من السكون وبعد (t) دقيقة من بدء الحركة اصبحت سرعتها $(50t - 3t^2)$ km/min
جد الزمن اللازم لعودة السيارة الى موضعها الاول الذي بدأت منه ثم احسب التعجيل عند ذلك الزمن .

ans: $t = 0$ يهمل OR $t = 25 \text{ min}$, $a(t) = -100 \text{ km/min}^2$

2016 دور 2 خارج

سفينة شحن تتحرك بخط مستقيم بسرعة $v(t) = 3t^2 - 6t + 3$ m/m احسب

(1) المسافة المقطوعة ضمن الفترة الزمنية [2,4]

(2) الازاحة المقطوعة بعد مرور خمسة دقائق من بدء الحركة .

sol : $v(t) = 0 \Rightarrow 3t^2 - 6t + 3 = 0 \Rightarrow 3(t^2 - 2t + 1) = 0 \Rightarrow 3(t - 1)^2 = 0$

$\Rightarrow t = 1 \notin [2, 4]$

$d = \left| \int_2^4 V(t) dt \right| = \left| \int_2^4 (3t^2 - 6t + 3) dt \right|$

$= \left| \left[t^3 - 3t^2 + 3t \right]_2^4 \right| = \left| (64 - 48 + 12) - (8 - 12 + 6) \right| = |26| = 26 \text{ m}$

$s = \int_a^b V(t) dt = \int_0^5 (3t^2 - 6t + 3) dt = \left[t^3 - 3t^2 + 3t \right]_0^5$

$= (125 - 75 + 15) - (0) = 65 \text{ m}$

2013 خارج القطر

2014 دور 4 انبار

جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل مقداره 10 m/s^2 وبعد 2 ثانية من بدء الحركة اصبحت سرعته 24 m/s جد المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة ثم بعده بعد مضي 4 ثواني من بدء الحركة .

2007 دور 1

2015 دور 2

الحل :-

$v(t) = \int a(t) dt \Rightarrow v(t) = \int 10 dt \Rightarrow v(t) = 10t + c$

$v(t) = 24$ عندما $t = 2$

$24 = 20 + c \Rightarrow c = 4 \Rightarrow v(t) = 10t + 4$

a) $d = \left| \int_4^5 V(t) dt \right| = \left| \int_4^5 (10t + 4) dt \right|$

$= \left| \left[5t^2 + 4t \right]_4^5 \right| = \left| (125 + 20) - (80 + 16) \right| = 49 \text{ m}$

b) $s = \int_0^4 V(t) dt = \int_0^4 (10t + 4) dt = \left[5t^2 + 4t \right]_0^4$

$= (80 + 16) - (0 - 0) = 96 \text{ m}$

جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = (3t^2 + 4t + 7) \text{ m/s}$ جد المسافة التي يقطعها الجسم بعد مضي 4 ثواني من بدء الحركة ثم جد التعجيل عندها .

2010 دور 2 دور

sol : $v(t) = 0 \Rightarrow 3t^2 + 4t + 7 \neq 0 \Rightarrow$

تلميح || المسافة المقطوعة بعد مرور t ثانية من بدء الحركة تعني بالفترة $[0, t]$ وليس بالضرورة ان يكون تكاملا واحدا

$$d = \left| \int_0^4 V(t) dt \right|$$

$$= \left| \int_0^4 (3t^2 + 4t + 7) dt \right| = \left| [t^3 + 2t^2 + 7t]_0^4 \right|$$

$$= \left| (64 + 32 + 28) - (0) \right| = 124 \text{ m}$$

$$a(t) = v'(t) = 6t + 4 \Rightarrow a(4) = 24 + 4 = 28 \text{ m/sec}^2$$

نسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 \text{ m/min}$ احسب المسافة

2009 دور 1

المقطوعة بالفترة $[0, 2]$ ثم احسب الزمن الذي يصبح فيه التعجيل 18 m/min^2

sol : $v(t) = 0 \Rightarrow 3t^2 - 12t + 9 = 0 \Rightarrow 3(t^2 - 4t + 3) = 0 \Rightarrow 3(t-3)(t-1) = 0$

\Rightarrow either $t = 1 \in [0, 2]$, or $t = 3 \notin [0, 2]$

$$d = \left| \int_0^1 V(t) dt \right| + \left| \int_1^2 V(t) dt \right|$$

$$= \left| \int_0^1 (3t^2 - 12t + 9) dt \right| + \left| \int_1^2 (3t^2 - 12t + 9) dt \right|$$

$$= \left| [t^3 - 6t^2 + 9t]_0^1 \right| + \left| [t^3 - 6t^2 + 9t]_1^2 \right|$$

$$= \left| (1 - 6 + 9) - (0) \right| + \left| (8 - 24 + 18) - (1 - 6 + 9) \right| = |4| + |-2| = 6 \text{ m}$$

$$a(t) = v'(t) = 6t - 12 \Rightarrow 18 = 6t - 12 \Rightarrow 30 = 6t \Rightarrow t = 5 \text{ min}$$

جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل قدره $(4t + 12) \text{ m/sec}^2$ فاذا كانت سرعته قد اصبحت

2011 دور 2

90 m/sec بعد مرور $(4) \text{ sec}$ احسب المسافة المقطوعة بالفترة $[1, 2]$

sol : $v(t) = \int a(t) dt \Rightarrow v(t) = \int (4t + 12) dt \Rightarrow v(t) = 2t^2 + 12t + c$

$v(t) = 90$ عندما $t = 4$

$$90 = 32 + 48 + c \Rightarrow c = 10 \Rightarrow v(t) = 2t^2 + 12t + 10$$

بما ان السرعة مجموع حدين او اكثر فلا داعي الى مساواتها بالصفر عن حساب المسافة المقطوعة بفترة معين لان الزمن وان وجد ستكون قيمته سالبة او صفر وفي الحالتين لايجزأ التكامل .

$$d = \left| \int_1^2 V(t) dt \right| = \left| \int_1^2 (2t^2 + 12t + 10) dt \right| = \left| \left[\frac{2}{3}t^3 + 6t^2 + 10t \right]_1^2 \right|$$

$$= \left| \left(\frac{16}{3} + 24 + 20 \right) - \left(\frac{2}{3} + 6 + 10 \right) \right| = \left| \frac{16}{3} + 44 - \frac{2}{3} - 16 \right|$$

$$= \left| \frac{14}{3} + 28 \right| = \left| \frac{14+84}{3} \right| = \frac{98}{3} = 32.6 \text{ m}$$

جسم يتحرك على خط مستقيم بحيث ان $V(t) = 3t^2 - 6t$ فجد

(1) المسافة المقطوعة بالفترة $[1, 3]$

تممحي 2016

sol : $v(t) = 0 \Rightarrow 3t^2 - 6t = 0 \Rightarrow 3t(t - 2) = 0 \Rightarrow t = 0 \notin [1, 3]$ or $t = 2 \in [1, 3]$

$$d = \left| \int_1^2 V(t) dt \right| + \left| \int_2^3 V(t) dt \right| = \left| \int_1^2 (3t^2 - 6t) dt \right| + \left| \int_2^3 (3t^2 - 6t) dt \right|$$

$$= \left| [t^3 - 3t^2]_1^2 \right| + \left| [t^3 - 3t^2]_2^3 \right|$$

$$= \left| (8 - 12) - (1 - 3) \right| + \left| (27 - 27) - (8 - 12) \right|$$

$$= \left| -4 + 2 \right| + \left| 0 + 4 \right| = 2 + 4 = 6 \text{ وحدة طول}$$

(2) الازاحة المقطوعة بالفترة $[1, 3]$

sol : $s = \int_1^3 V(t) dt = \int_1^3 (3t^2 - 6t) dt = [t^3 - 3t^2]_1^3$

$$= (27 - 27) - (1 - 3) = 2 \text{ وحدة طول}$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

195

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

المنطقة المحددة بالمنحني $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ ومحور السينات دارت حول محور السينات جد حجمها .

2011 خارج القطر

2013 دور 3

sol : $V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^4 = 8\pi$ وحدة مكعبة

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحددة بين المنحني $y = 4x^2$ والمستقيمين $y=0, y=16$

2012 خارج القطر

2015 تميمي

sol : $V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_0^{16} \frac{y}{4} dy = \pi \left[\frac{y^2}{8} \right]_0^{16} = \pi (32 - 0) = 32\pi$

جد الحجم الناتج من دوران المنطقة المحددة بالقطع المكافئ $y^2 = 8x$ والمستقيمين $x=0, x=2$ حول محور السينات

2011 دور 2

2014 تميمي

sol : $V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_0^2 8x dx = \pi [4x^2]_0^2 = 16\pi$ وحدة مكعبة

جد الحجم الناتج من دوران المنطقة المحددة بالقطع المكافئ $y = 2x^2$ والمستقيمين $x=0, x=5$ حول محور السينات

2012 تميمي

sol : $V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_0^5 4x^4 dx = \pi \left[\frac{4}{5} x^5 \right]_0^5 = 2500\pi$ وحدة مكعبة

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين المنحني $y = x^2 + 1$ والمستقيمين $y = 1$, $y = 2$ حول محور الصادات

2012 دور اول

sol : $y = x^2 + 1 \Rightarrow x^2 = y - 1$

$V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_1^2 (y - 1) dy = \pi \left[\frac{1}{2} y^2 - y \right]_1^2 = \pi \left[(2 - 2) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \right] = \frac{1}{2} \pi \text{ unit}^3$

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين المنحني $y = \sqrt{5} x^2$ والمستقيمين $x = 1$, $x = 2$ حول المحور السيني

2012 دور 2

sol : $\because y = \sqrt{5} x^2 \Rightarrow y^2 = 5 x^4$

$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_1^2 5x^4 dx = \pi \left[\frac{5}{5} x^5 \right]_1^2 = (32 - 1) \pi = 31 \pi$ وحدة مكعبة

برنامج رحلتي في السادس

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين المنحني $y = x^2 + 1$ والمسقيم $y = 4$ حول المحور الصادي

2013 دور 1

2015 خارج 1

2016 دور 1

sol : $y = x^2 + 1 \Rightarrow x^2 = y - 1$ if $x = 0 \Rightarrow y = 1$

$$V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_1^4 (y - 1) dy = \pi \left[\frac{1}{2} y^2 - y \right]_1^4 = \pi \left[(8 - 4) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \right] = \frac{9}{2} \pi u^3$$

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين المنحني $y = \frac{1}{x}$ والمستقيمين $y = 1$, $y = 2$ حول المحور الصادي

2013 دور 2

sol : $\because y = \frac{1}{x} \Rightarrow x = \frac{1}{y}$

$$V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_1^2 \frac{1}{y^2} dy = \pi \int_1^2 y^{-2} dy = \pi \left[\frac{-1}{y} \right]_1^2 = \pi \left(\frac{-1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2} \pi$$

جد الحجم الناتج من دوران المنطقة المحددة بالمنحني $y = \frac{1}{x}$ والمستقيمين $x = 1$, $x = \frac{1}{2}$ دورة كاملة حول المحور الصادي .

2015 دور 3

2015 دور 4 مراجعة

sol : $x = 1 \Rightarrow y = 1$, $x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 2$

نفس الحل السابق

تأكيد || اذا كان الدوران حول محور السينات وعلمت قيمتين لـ (y) فنقوم بتعويضهما بالمعادلة الاصلية لاستخراج قيمتي (x) والعكس بالعكس علما ان هذه الملاحظة مثيرة للجدل ويبقى العمل بها مادامت في الكتاب المنهجي .
تأكيد || في الطبعة الجديدة 2016 - 2017 تم حذف هذا السؤال وتم استبداله بالسؤال ادناه

مثال \ اوجد الحجم الناتج من دوران المنطقة المحصورة بين محور الصادات ومنحني الدالة $y = \frac{3}{x}$ حيث $1 \leq y \leq 3$ دورة كاملة حول محور الصادات .

الحل :-

$$y = \frac{3}{x} \Rightarrow xy = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{y}$$

$$V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_1^3 \frac{9}{y^2} dy = \pi \int_1^3 9y^{-2} dy = \pi \left[\frac{-9}{y} \right]_1^3 = \pi \left(\frac{-9}{3} + 9 \right) = 6\pi u^3$$

برنامج رحلتي في السادس

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين المنحني $y^2 = x^3$ والمستقيمين $x = 0$, $x = 2$ حول المحور السيني

2014 دور 2

sol : $V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_0^2 x^3 dx = \pi \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^2 = 4\pi$ وحدة مكعبة

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين المنحني $x = \frac{1}{\sqrt{y}}$ والمستقيمين $y = 1$, $y = 4$ حول المحور الصادي

2014 دور 3

sol : $V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_1^4 \frac{1}{y} dy = \pi [\ln y]_1^4 = \pi (\ln 4 - \ln 1) = \pi \ln 4 = 2\pi \ln 2$

جد الحجم الناتج من دوران المساحة المحصورة بين المنحني $y = 4x^2$ والمستقيمين $y = 0$, $y = 1$ حول محور الصادات

2014 بازيم

sol : $\because y = 4x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{y}{4} = \frac{1}{4} y$

$V = \pi \int_a^b x^2 dy = \pi \int_0^1 \frac{1}{4} y dy = \pi \left[\frac{1}{8} y^2 \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{8} - 0 \right) = \frac{1}{8} \pi \text{ unit}^3$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

198

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

حلول الاسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الخامس (المعادلات التفاضلية)

2005 دور 1

سؤال تابع للمشتقة حينها ويمكن ان يعاد بالصيغة التالية ليكون معادلة تفاضلية

$$y = \frac{\sin x}{a+b \cos x} \quad \text{هل ان} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{a \cos x + b}{(a+b \cos x)^2} \quad \text{حلا للمعادلة التفاضلية}$$

$$\text{sol: } \frac{dy}{dx} = \frac{(a+b \cos x) \cdot \cos x - \sin x (-b \sin x)}{(a+b \cos x)^2} = \frac{a \cos b + b \cos^2 x + b \sin^2 x}{(a+b \cos x)^2}$$

$$= \frac{a \cos b + b(\cos^2 x + \sin^2 x)}{(a+b \cos x)^2} = \frac{a \cos b + b}{(a+b \cos x)^2}$$

اي ان العلاقة المعطاة هي حلا للمعادلة التفاضلية

2007 تمميد

سؤال تابع للمشتقة حينها ويمكن ان يعاد بالصيغة التالية ليكون معادلة تفاضلية

$$y = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} \quad \text{هل ان} \quad \frac{dy}{dx} = 2 \tan x \sec^2 x \quad \text{حلا للمعادلة التفاضلية}$$

$$\text{sol: } y = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \cos^2 x} = \tan^2 x = (\tan x)^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \tan x \sec^2 x \quad \text{اي ان العلاقة المعطاة هي حلا للمعادلة التفاضلية}$$

2008 تمميد

سؤال تابع للمشتقة حينها ويمكن ان يعاد بالصيغة التالية ليكون معادلة تفاضلية

$$y = \cot x \quad \text{هل ان} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = 2 \csc^2 x \cot x \quad \text{حلا للمعادلة التفاضلية}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\csc^2 x = -(\csc x)^2 \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = -2 \csc x (-\csc x \cdot \cot x)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 2 \csc^2 x \cot x \quad \text{اي ان العلاقة المعطاة هي حلا للمعادلة التفاضلية}$$

2009 دور 1

سؤال تابع للمشتقة حينها ويمكن ان يعاد بالصيغة التالية ليكون معادلة تفاضلية

$$y = \frac{\sin x}{1 + \cos x} \quad \text{هل ان} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + \cos x} \quad \text{حلا للمعادلة التفاضلية}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \cos x) \cdot \cos x - \sin x (-\sin x)}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\cos x + 1}{(1 + \cos x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + \cos x} \quad \text{اي ان العلاقة المعطاة هي حلا للمعادلة التفاضلية}$$

هل ان $y = x^3 - x - 2$ هو حلا للمعادلة التفاضلية $\frac{d^2y}{dx^2} - 6x = 0$

2011 دور 1

2014 تمميد

sol : $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 1 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = 6x$

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية LHS: $\frac{d^2y}{dx^2} - 6x = 6x - 6x = 0$: RHS

حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{3y^2 + e^y}$

2011 دور 1

2014 نارحين

sol : $(3y^2 + e^y) dy = \cos x dx$

$\Rightarrow \int (3y^2 + e^y) dy = \int \cos x dx$

لاحظ الفرق بين سؤال الكتاب والسؤال الوزاري الدناه $y^3 + e^y = \sin x + c$

حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x}{3y^2}$

2011 خارج القطر

sol : $3y^2 dy = \cos x dx \Rightarrow \int 3y^2 dy = \int \cos x dx \Rightarrow y^3 = \sin x + c$

$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{6y^2 + e^y}$

حل المعادلة التفاضلية

2015 دور 3

sol : $(6y^2 + e^y) dy = \sin x dx$

$\Rightarrow \int (6y^2 + e^y) dy = \int \sin x dx$

$2y^3 + e^y = -\cos x + c$

هل ان $y^2 = 3x^2 + x^3$ هو حلا للمعادلة التفاضلية $y y'' + (y')^2 - 3x = 5$

2011 دور 2

sol : $2y y' = 6x + 3x^2 \Rightarrow [2y y'' + y' \cdot 2y' = 6 + 6x]$ (2) بالقسمة على

$y y'' + (y')^2 = 3 + 3x \Rightarrow y y'' + (y')^2 - 3x = 3 \neq 5 \therefore \text{LHS} \neq \text{RHS}$

ان العلاقة المعطاة $y^2 = 3x^2 + x^3$ هي ليست حلا للمعادلة التفاضلية $y y'' + (y')^2 - 3x = 5$

هل ان $y^2 = 3x^2 + x^3$ هو حلا للمعادلة التفاضلية $y y'' + (y')^2 - 3x = 3$

2015 دور 1

2015 نارحين 1

ستكون العلاقة المعطاة حلا للمعادلة التفاضلية المعطاة

حل المعادلة التفاضلية $e^x dx - y^3 dy = 0$

2011 دور 2

sol : $y^3 dy = e^x dx \Rightarrow \int y^3 dy = \int e^x dx$

$$\frac{1}{4} y^4 = e^x + c$$

بين ان $y = e^{2x} + e^{-3x}$ هو حلا للمعادلة التفاضلية $y'' + y' - 6y = 0$

sol : $y' = 2e^{2x} - 3e^{-3x}$, $y'' = 4e^{2x} + 9e^{-3x}$

نقوم بتعويضها بطرف المعادلة الأيسر ليكون الجواب صفرا

$$\begin{aligned} \text{LHS : } y'' + y' - 6y &= 4e^{2x} + 9e^{-3x} + 2e^{2x} - 3e^{-3x} - (6)(e^{2x} + e^{-3x}) \\ &= 6e^{2x} + 6e^{-3x} - 6e^{2x} - 6e^{-3x} = 0 = \text{RHS} \end{aligned}$$

∴ LHS = RHS

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

رهن ان $y = 3\cos 2x + 2\sin 2x$ هو حلا للمعادلة التفاضلية $y'' + 4y = 0$

2012 دور 1

sol : $y' = -6\sin 2x + 4\cos 2x$, $y'' = -12\cos 2x - 8\sin 2x$

نقوم بتعويضها بطرف المعادلة الأيسر ليكون الجواب صفرا

$$\begin{aligned} \text{LHS : } y'' + 4y &= (-12\cos 2x - 8\sin 2x) + 4(3\cos 2x + 2\sin 2x) \\ &= -12\cos 2x - 8\sin 2x + 12\cos 2x + 8\sin 2x = 0 = \text{RHS} \end{aligned}$$

∴ LHS = RHS

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

حل المعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = (x+1)(y-1)$ حيث $x=2$, $y=2$

2012 دور 2

sol : $\frac{dy}{y-1} = (x+1) dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y-1} = \int (x+1) dx$

$$\ln|y-1| = \frac{1}{2}x^2 + x + c \Rightarrow \ln|2-1| = \frac{1}{2}(4) + 2 + c \Rightarrow c = -4$$

الحل المطلوب $\ln|y-1| = \frac{1}{2}x^2 + x - 4$

$$y' = \frac{y}{x} + e^{\frac{y}{x}} \quad \text{حل المعادلة التفاضلية}$$

2012 دور 2

2013 دور 1

2016 تمديد

$$\text{sol : } \frac{dy}{dx} = v + e^v \quad \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + e^v \quad \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = e^v \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{dv}{e^v} \Rightarrow \frac{dx}{x} = e^{-v} dv \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int e^{-v} dv$$

$$\ln|x| = -e^{-v} + c \Rightarrow \ln|x| = -e^{-\frac{y}{x}} + c \Rightarrow \ln|x| = \frac{-1}{e^{\frac{y}{x}}} + c$$

بين ان $y = ae^{-x}$ هو حلا للمعادلة $y' + y = 0$ حيث $a \in \mathbb{R}$

نقوم بتعويضها بطرف المعادلة الأيسر ليكون الجواب صفرا

$$\text{sol : } y' = -ae^{-x}$$

$$\text{LHS : } y' + y = -ae^{-x} + ae^{-x} = 0 = \text{RHS}$$

∴ LHS = RSH العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

2012 تمديد

2013 دور 1

برهن ان $y = \sin x$ هو حل للمعادلة $y'' + y = 0$

نقوم بتعويضها بطرف المعادلة الأيسر ليكون الجواب صفرا

$$\text{sol : } y' = \cos x \Rightarrow y'' = -\sin x$$

$$\text{LHS : } y'' + y = -\sin x + \sin x = 0 = \text{RHS}$$

2012 خارج المقرر

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

$$\frac{dy}{dx} + xy = 3x \quad ; x = 1, y = 2 \quad \text{حل المعادلة التفاضلية}$$

2013 دور 2

2014 دور 3

$$\text{sol : } \frac{dy}{dx} = 3x - xy \Rightarrow \frac{dy}{dx} = x(3 - y) \Rightarrow \frac{dy}{3-y} = x dx$$

$$\int \frac{dy}{3-y} = \int x dx \Rightarrow -\ln|3-y| = \frac{1}{2}x^2 + c$$

$$-\ln|3-2| = \frac{1}{2} + c \Rightarrow 0 = \frac{1}{2} + c \Rightarrow c = -\frac{1}{2} \Rightarrow -\ln|3-y| = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

$$x \left(\frac{dy}{dx} - \tan \frac{y}{x} \right) = y \quad \text{حل المعادلة التفاضلية}$$

2012 خارج القطر

2014 دور 14 انبار

$$\text{sol : } \left(\frac{dy}{dx} - \tan \frac{y}{x} \right) = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \tan v + v \quad \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \tan v + v \quad \dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \tan v \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{1}{\tan v} dv \Rightarrow \frac{dx}{x} = \cot v dv \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{\cos v}{\sin v} dv$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{\cos v}{\sin v} dv \Rightarrow \ln|x| = \ln|\sin v| + \ln|c|, \quad c > 0$$

$$\ln|x| = \ln|c(\sin v)| \Rightarrow |x| = |c(\sin v)| \Rightarrow x = \pm c(\sin v) \Rightarrow x = \pm c \left(\sin \frac{y}{x} \right)$$

برنامج رحلتي في السادس

حل المعادلة التفاضلية $(3x - y) y' = x + y$

2013 دور 2

بقسمه البسط والمقام على $x \neq 0$ لينتج
sol : $(3x - y) y' = x + y \Rightarrow y' = \frac{x+y}{3x-y}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x+y}{x}}{\frac{3x-y}{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x}{x} + \frac{y}{x}}{\frac{3x}{x} - \frac{y}{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 + \frac{y}{x}}{3 - \frac{y}{x}} \Rightarrow \text{المعادلة متجانسة}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+v}{3-v} \dots\dots\dots (1) \quad \text{نفرض ان } \frac{y}{x} = v \text{ لينتج}$$

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \dots\dots\dots (2) \quad \text{نشتق العلاقة } y = vx \text{ بالنسبة الى المتغير } x \text{ لينتج}$$

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{3-v} \dots\dots\dots (3) \quad \text{نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج}$$

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{3-v} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{(1+v) - v(3-v)}{3-v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v-3v+v^2}{3-v} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v-3v+v^2}{3-v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1-2v+v^2}{3-v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{(1-v)^2}{3-v}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{(3-v) dv}{(1-v)^2} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{2 + (1-v)}{(1-v)^2} dv \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{2}{(1-v)^2} dv + \frac{(1-v)}{(1-v)^2} dv$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{2}{(1-v)^2} dv + \frac{1}{(1-v)} dv \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int \frac{2}{(1-v)^2} dv + \int \frac{1}{(1-v)} dv$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{x} = 2 \int (1-v)^{-2} dv + \int \frac{1}{(1-v)} dv \Rightarrow \ln|x| = (-2)[-(1-v)^{-1}] - \ln|1-v| + c$$

$$\Rightarrow \ln|x| + \ln|1-v| = \frac{2}{(1-v)} + c \Rightarrow \ln|x(1-v)| = \frac{2}{(1-v)} + c$$

$$\Rightarrow \ln|x(1 - \frac{y}{x})| = \frac{2}{(1 - \frac{y}{x})} + c \Rightarrow \ln|x - y| = \frac{2}{(\frac{x-y}{x})} + c \Rightarrow \ln|x - y| = \frac{2x}{x-y} + c$$

قصي هاشم التميمي

بين ان العلاقة $y = x^2 + 3x$ هي حلا للمعادلة التفاضلية $xy' = x^2 + y$

2013 دور 3

2014 دور 1

بضها بطرفي المعادلة التفاضلية للحصول على طرفين متساويين $y' = 2x + 3$ **sol :**

$$\text{LHS : } xy' = x(2x + 3) = 2x^2 + 3x$$

$$\text{RHS : } x^2 + y = x^2 + x^2 + 3x = 2x^2 + 3x$$

$\therefore \text{LHS} = \text{RHS} \Rightarrow xy' = x^2 + y$ العلاقة $y = x^2 + 3x$ هي حلا للمعادلة التفاضلية

حل المعادلة التفاضلية $xy' = y - x$ حيث $x = 1, y = 1$

2013 دور 3

2015 خارج 1

Sol: $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - 1$

$$\frac{dy}{dx} = v - 1 \quad \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = v - 1 \quad \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = -1 \Rightarrow \frac{dx}{x} = -dv \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = - \int dv$$

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$\ln|x| = -v + c \Rightarrow \ln|x| = -\frac{y}{x} + c \Rightarrow \ln|1| = -1 + c \Rightarrow c=1$$

$$\Rightarrow \ln|x| = -\frac{y}{x} + 1$$

بين ان $\ln|y| = x^2 + c$ حيث $c \in \mathbb{R}$ هو حلا للمعادلة $y'' = 4x^2y + 2y$

2013 خارج القطر

2015 دور 2

sol : $\frac{1}{y} y' = 2x \Rightarrow y' = 2xy \Rightarrow$

$$y'' = 2x y' + 2y \Rightarrow y'' = 2x(2xy) + 2y \Rightarrow y'' = 4x^2 y + 2y$$

نقوم بتعويضها بطرفي المعادلة التفاضلية للحصول على طرفي متساويين

$$\text{LHS : } y'' = 4x^2 y + 2y, \quad \text{RHS : } 4x^2 y + 2y$$

$\therefore \text{LHS} = \text{RHS}$ ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

حل المعادلة التفاضلية $2xy y' - y^2 + x^2 = 0$

2013 خارج القطر

sol : $2xyy' = y^2 - x^2 \Rightarrow y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$

بقسمة البسط والمقام على $x^2 \neq 0$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y^2 - x^2}{x^2}}{\frac{2xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y^2}{x^2} - \frac{x^2}{x^2}}{\frac{2xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{(\frac{y}{x})^2 - 1}{2(\frac{y}{x})} \Rightarrow \text{المعادلة متجانسة}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(v)^2 - 1}{2(v)} \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1}{2v} \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1}{2v} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1 - 2v^2}{2v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{-v^2 - 1}{2v}$$

$$-(v^2 + 1) dx = 2xv dv \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{-2v dv}{v^2 + 1}$$

$$\int \frac{dx}{x} = - \int \frac{2v dv}{v^2 + 1} \Rightarrow \ln|x| = - \ln|v^2 + 1| + \ln c, c > 0$$

$$\ln|c| = \ln|x| + \ln|v^2 + 1|$$

$$\ln|c| = \ln|x(v^2 + 1)| \Rightarrow c = \pm x(v^2 + 1) \Rightarrow c = \pm x[(\frac{y}{x})^2 + 1]$$

$$c = \pm x(\frac{y^2}{x^2} + 1) \Rightarrow c = \pm x(\frac{y^2 + x^2}{x^2}) \Rightarrow c = \pm (\frac{y^2 + x^2}{x})$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

206

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

بين ان $\ln y^2 = x + a$, $a \in \mathbb{R}$ هو حلا للمعادلة $2y' - y = 0$

2014 دور 2

sol : $\left(\frac{1}{y^2}\right) (2y) y' = 1 \Rightarrow \frac{2}{y} y' = 1 \Rightarrow 2y' = y \Rightarrow 2y' - y = 0$

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

حل المعادلة التفاضلية $(y^2 - x^2)dx + xydy = 0$

2014 دور 2

sol : $xydy = -(y^2 - x^2)dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - y^2}{xy}$

بقسمة البسط والمقام على $x^2 \neq 0$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x^2 - y^2}{x^2}}{\frac{xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x^2}{x^2} - \frac{y^2}{x^2}}{\frac{xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2}{\left(\frac{y}{x}\right)} \Rightarrow \text{المعادلة متجانسة}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 - v^2}{v} \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 - v^2}{v} \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1 - v^2}{v} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1 - v^2 - v^2}{v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1 - 2v^2}{v} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{v dv}{1 - 2v^2}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{v dv}{1 - 2v^2} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \frac{-1}{4} \int \frac{-4v dv}{1 - 2v^2} \Rightarrow \ln|x| = \frac{-1}{4} \ln|1 - 2v^2| + \ln c, c > 0$$

$$\ln|x| = -\ln|(1 - 2v^2)^{\frac{1}{4}}| + \ln c \Rightarrow \ln|c| = \ln|(1 - 2v^2)^{\frac{1}{4}}| + \ln|x|$$

$$\ln|c| = \ln|x \sqrt[4]{1 - 2v^2}| \Rightarrow c = \pm x \sqrt[4]{1 - 2v^2} \Rightarrow c = \pm x \sqrt[4]{1 - 2\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

2014 دور 3

اثبت ان $y = x \ln x$ احد حلول المعادلة $x \frac{dy}{dx} = x + y$, $x > 0$

sol : $\frac{dy}{dx} = (x) \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x)(1) = 1 + \ln x$

نقوم بتعويضها بطرفي المعادلة التفاضلية للحصول على طرفين متساويين

LHS : $x \frac{dy}{dx} = x(1 + \ln x) = x + x \ln x$

RHS : $x + y = x + x \ln x = x + x \ln x$

$\therefore \text{LHS} = \text{RHS}$

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

اثبت ان $y = x \ln x - x$ احد حلول المعادلة $x \frac{dy}{dx} = x + y$, $x > 0$

2016 تمميد

sol : $\frac{dy}{dx} = (x) \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x)(1) - 1 = \ln x$

نقوم بتعويضها بطرفي المعادلة التفاضلية للحصول على طرفين متساويين

LHS : $x \frac{dy}{dx} = x \ln x$

RHS : $x + y = x + x \ln x - x = x \ln x$

$\therefore \text{LHS} = \text{RHS}$

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $\tan^2 y \, dy = \sin^3 x \, dx$

2014 دور 4 انبار

sol : $\int \tan^2 y \, dy = \int \sin^3 x \, dx \Rightarrow$

$\int (\sec^2 y - 1) dy = \int \sin x \cdot \sin^2 x \, dx$

$\int (\sec^2 y - 1) dy = \int \sin x \cdot (1 - \cos^2 x) \, dx$

$\int (\sec^2 y - 1) dy = \int (\sin x - \cos^2 x \cdot \sin x) \, dx$

$\tan y - y = -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + c$

برهن ان $y = \cos x$ هو حل للمعادلة $y'' + y = 0$

2014 ناربعين

sol : $y' = -\sin x \Rightarrow y'' = -\cos x$

LHS : $y'' + y = -\cos x + \cos x = 0 = \text{RHS}$

ان العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية

Mob: 07902162268

208

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

برنامج رحلتي في السادس

$$y' = \frac{\cos^2 y}{x}$$

$$y = \frac{\pi}{4}, x = 1$$

حل المعادلة التفاضلية

2014 تممحي

sol : $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2 y}{x} \Rightarrow \sec^2 y dy = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \sec^2 y dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \tan y = \ln|x| + c$

$$\Rightarrow \tan \frac{\pi}{4} = \ln 1 + c \Rightarrow 1 = 0 + c \Rightarrow c = 1 \Rightarrow \tan y = \ln|x| + 1$$

$$2x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 \quad \text{حل المعادلة التفاضلية}$$

sol : $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2x^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x^2 + y^2}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 + (\frac{y}{x})^2}{2}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + v^2}{2} \quad \dots\dots\dots (1)$$

نرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

2012 دور 1

2012 تممحي

2014 دور 1

2015 تممحي

2015 دور 1

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{2} \quad \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{2} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \left(\frac{1 + v^2 - 2v}{2} \right) \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2} (v^2 - 2v + 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2} (v - 1)^2 \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} dx}{x} = \frac{1}{(v - 1)^2} dv \Rightarrow \int \frac{\frac{1}{2} dx}{x} = \int \frac{1}{(v - 1)^2} dv$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} = \int (v - 1)^{-2} dv \Rightarrow \frac{1}{2} \ln|x| = - (v - 1)^{-1} + c$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \ln|x| = \frac{-1}{v - 1} + c \Rightarrow \frac{-1}{v - 1} = \frac{1}{2} \ln|x| - c \Rightarrow \frac{-1}{v - 1} = \frac{\ln|x| - 2c}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{v - 1}{-1} = \frac{2}{\ln|x| - 2c} \Rightarrow v - 1 = \frac{-2}{\ln|x| - 2c} \Rightarrow v = 1 - \frac{2}{\ln|x| - 2c}$$

$$\Rightarrow \frac{y}{x} = 1 - \frac{2}{\ln|x| - 2c} \Rightarrow y = x - \frac{2x}{\ln|x| - 2c}$$

$$\text{let } 2c = c_1 \Rightarrow y = x - \frac{2x}{\ln|x| - c_1}$$

اثبت ان $2x^2 + y^2 = 1$ هو حلا للمعادلة $y^3 y'' = -2$

2015 خارج 1

2016 داخل 2

$$\text{sol : } 4x + 2y y' = 0 \Rightarrow 2y y' = -4x \Rightarrow y' = \frac{-2x}{y}$$

$$y'' = \frac{(y)(-2) - (-2x)(y')}{y^2} = \frac{-2y + 2x(y')}{y^2} = \frac{-2y + 2x(\frac{-2x}{y})}{y^2} = \frac{-2y^2 - 4x^2}{y^2}$$

$$= \frac{-2y^2 - 4x^2}{y^3} = \frac{-2(y^2 + 2x^2)}{y^3} = \frac{-2}{y^3}$$

وم بتعويضها بطرفي المعادلة التفاضلية للحصول على طرفين متساويين

$$\text{LHS : } y^3 y'' = y^3 \left(\frac{-2}{y^3} \right) = -2 = \text{RHS}$$

اذن العلاقة المعطاة هي حل للمعادلة التفاضلية $\therefore \text{LHS} = \text{RHS}$

تذكير || اذا كان الاشتقاق ضمنيا وكانت المعادلة التفاضلية تحتوي على نوع واحد من المشتقات فيفضل تبسيط المشتقة الاولى قبل الانتقال الى المشتقة الثانية اما اذا كانت تحتوي على اكثر من نوع من المشتقات فيفضل الانتقال الى المشتقة الثانية مباشرة بعد حساب المشتقة الاولى

ملاحظة || يمكن ان يكون السؤال السابق هو:-

هل ان $2x^2 + y^2 = 1$ هو حلا للمعادلة $y y'' + (y')^2 = -2$

$$\text{Sol: } 4x + 2y y' = 0 \Rightarrow 4 + 2y y'' + y' \cdot 2y' = 0 \Rightarrow [2y y'' + 2(y')^2 + 4 = 0] \div 2$$

$$y y'' + (y')^2 + 2 = 0 \Rightarrow y y'' + (y')^2 = -2$$

برنامج رحلتي في السادس

حل المعادلة التفاضلية $(x + 2y)dx + (2x + 3y)dy = 0$

2015 تاريخي 1

sol : $(2x + 3y)dy = - (x + 2y)dx$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x - 2y}{2x + 3y} \quad \text{نقسم البسط والمقام على } x \neq 0 \text{ لينتج}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{-x - 2y}{x}}{\frac{2x + 3y}{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-1 - 2(\frac{y}{x})}{2 + 3(\frac{y}{x})}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1 - 2v}{2 + 3v} \quad \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{-1 - 2v}{2 + 3v} \quad \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{-1 - 2v}{2 + 3v} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{-1 - 2v - v(2 + 3v)}{2 + 3v} \Rightarrow$$

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{-1 - 2v - 2v - 3v^2}{2 + 3v} \Rightarrow -x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + 4v + 3v^2}{2 + 3v}$$

$$\frac{-dx}{x} = \frac{2 + 3v}{1 + 4v + 3v^2} dv \Rightarrow \int \frac{-dx}{x} = \int \frac{2 + 3v}{1 + 4v + 3v^2} dv$$

$$\text{let } u = 1 + 4v + 3v^2 \\ u' = 4 + 6v = 2(2 + 3v)$$

$$-\int \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} \int \frac{2(2 + 3v)}{1 + 4v + 3v^2} \Rightarrow -\ln|x| = \frac{1}{2} \ln|1 + 4v + 3v^2| + c$$

$$-c = \ln|(1 + 4v + 3v^2)^{\frac{1}{2}}| + \ln|x|$$

$$\Rightarrow \ln c_1 = \ln|x \cdot \sqrt{1 + 4v + 3v^2}|, c_1 > 0 \Rightarrow c_1 = |x \cdot \sqrt{1 + 4v + 3v^2}|$$

$$\Rightarrow c_1 = |x \cdot \sqrt{1 + \frac{4y}{x} + \frac{3y^2}{x^2}}| \Rightarrow c_1 = |x \cdot \sqrt{\frac{x^2 + 4xy + 3y^2}{x^2}}|$$

2015 دور 2 خارج

حل المعادلة التفاضلية $(y^2 - xy) = -x^2 dy$

sol : $x^2 dy = -(y^2 - xy)dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{xy - y^2}{x^2}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{xy - y^2}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

$$\frac{dy}{dx} = v - v^2 \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = v - v^2 \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = -v^2 \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{-dv}{v^2} \Rightarrow \frac{dx}{x} = -v^{-2} dv$$

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$\int \frac{dx}{x} = \int -v^{-2} dv \Rightarrow \ln|x| = v^{-1} + c \Rightarrow \ln|x| = \frac{1}{v} + c \Rightarrow \ln|x| = \frac{1}{\frac{y}{x}} + c$$

$$\ln|x| = \frac{x}{y} + c \Rightarrow \frac{x}{y} = \ln|x| - c \Rightarrow y = \frac{x}{\ln|x| - c}$$

$xy'' + 2y' + 25yx = 0$ حلا للمعادلة $yx = \sin 5x$

2015 دور 2 خارج

Sol : $y + x y' = 5\cos 5x \Rightarrow y' + xy'' + y' = -25\sin 5x$

2016 دور 1 في

$$xy'' + 2y' + 25\sin 5x = 0 \Rightarrow xy'' + 2y' + 25xy = 0$$

ان العلاقة المعطاة هي حلا للمعادلة التفاضلية

جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $(x + 1) \frac{dy}{dx} = 2y$

2015 دور 2

sol : نجعل المعادلة التفاضلية بالصورة $g(y)dy = f(x)dx$

$$(x + 1)dy = 2y dx \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{2dx}{x+1} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{x+1} \Rightarrow \ln |y| = 2\ln(x + 1) + c$$

$$\ln |y| = \ln (x + 1)^2 + c \Rightarrow \ln |y| = \ln (x + 1)^2 + \ln c_1$$

$$\ln |y| = \ln c_1(x + 1)^2 \Rightarrow |y| = c_1 (x + 1)^2$$

$$y' = \frac{y^2}{xy + x^2} \quad \text{حل المعادلة التفاضلية}$$

2015 4 رماة

sol :

بقسمة البسط والمقام على $x^2 \neq 0$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y^2}{x^2}}{\frac{xy}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y^2}{x^2}}{\frac{xy}{x^2} + 1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)^2}{\left(\frac{y}{x}\right) + 1} \Rightarrow \text{المعادلة متجانسة}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v^2}{v+1} \quad \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2}{v+1} \quad \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2}{v+1} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - v(v+1)}{v+1} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - v^2 - v}{v+1} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{-v}{v+1}$$

$$x(v+1) dv = -v dx \Leftrightarrow \int \frac{(v+1) dv}{v} = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{v}{v} dv + \int \frac{1}{v} dv = - \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int dv + \int \frac{1}{v} dv = - \int \frac{dx}{x}$$

$$v + \ln|v| = -\ln|x| + c \Leftrightarrow \frac{v}{x} + \ln\left|\frac{v}{x}\right| = -\ln|x| + c$$

تعقيب || بالرغم من ان السؤال غير موجود نصا في الكتاب المنهجي الا ان فكرته منهجية ويعتبر من الاسئلة

المتوسطة الصعوبة او ماهو دون ذلك ويكون السؤال اكثر صعوبة قليلا ان كان التكامل بالشكل التالي

$$\int \frac{v dv}{v+1} = - \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int \frac{[(v+1)-1] dv}{v+1} = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{(v+1) dv}{v+1} - \int \frac{1}{v+1} dv = - \int \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \int dv - \int \frac{dv}{v+1} = - \int \frac{dx}{x}$$

$$v - \ln|v+1| = -\ln|x| + c \Leftrightarrow \frac{v}{x} - \ln\left|\frac{v}{x} + 1\right| = -\ln|x| + c$$

برنامج رحلتي في السادس

Mob: 07902162268

213

اعدادية الكاظمية للبنين
اعدادية الكاظمية للبنين

جد الحل العام للمعادلة التفاضلية $xy \frac{dy}{dx} + y^2 = 1 - y^2$

2016 دور 1 في

$$\text{sol : } xy \frac{dy}{dx} = 1 - 2y^2 \Rightarrow xy dy = (1 - 2y^2) dx$$

$$\frac{y}{1-2y^2} dy = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{y}{1-2y^2} dy = \int \frac{1}{x} dx$$

$$(-\frac{1}{4}) \int \frac{-4y}{1-2y^2} dy = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow (-\frac{1}{4}) \ln|1-2y^2| = \ln|x| + c$$

$$\ln|(1-2y^2)^{-\frac{1}{4}}| = \ln|x| + \ln c_1, c_1 > 0$$

$$\ln|(1-2y^2)^{-\frac{1}{4}}| = \ln|c_1 x| \Rightarrow |(1-2y^2)^{-\frac{1}{4}}| = |c_1 x|$$

$$\frac{1}{\sqrt[4]{1-2y^2}} = c_1 x \quad \text{الحل العام للمعادلات التفاضلية}$$

أوجد حل المعادلة التفاضلية $y' - x\sqrt{y} = 0$ عندما $x=2, y=9$

2016 دور اول

 $\text{sol : } g(y)dy = f(x)dx$ نجعل المعادلة التفاضلية بالصورة

$$\frac{dy}{dx} - x\sqrt{y} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = x\sqrt{y} \Rightarrow \frac{dy}{\sqrt{y}} = x dx \Rightarrow \int y^{-\frac{1}{2}} dy = \int x dx$$

$$2y^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}x^2 + c \Rightarrow 2\sqrt{y} = \frac{1}{2}x^2 + c \Rightarrow x=2, y=9 \Rightarrow 2\sqrt{9} = \frac{1}{2}(2)^2 + c$$

$$6 = 2 + c \Rightarrow c = 4 \Rightarrow 2\sqrt{y} = \frac{1}{2}x^2 + 4$$

$$2\sqrt{y} = \frac{1}{2}x^2 + c \Rightarrow 4\sqrt{y} = x^2 + 2c \Rightarrow 4\sqrt{y} = x^2 + c_1$$

$$\because x=2, y=9 \Rightarrow 4\sqrt{9} = (2)^2 + c_1 \Rightarrow 12 = 4 + c_1 \Rightarrow c_1 = 8$$

$$4\sqrt{y} = x^2 + 8 \Rightarrow \sqrt{y} = \frac{1}{4}x^2 + 2 \Rightarrow y = (\frac{1}{4}x^2 + 2)^2$$

اسلوب الكتاب
يفضل ولا يجب
اجراءه

$$x^2 y \, dx = (x^3 + y^3) \, dy$$

بقسمة البسط والمقام على $x^3 \neq 0$ **sol :** $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x^2 y}{x^3}}{\frac{x^3 + y^3}{x^3}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x^2 y}{x^3}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^3} \Rightarrow \text{المعادلة متجانسة}$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج $\frac{dy}{dx} = \frac{v}{1+v^3} \dots\dots\dots (1)$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \dots\dots\dots (2)$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج $v + x \frac{dv}{dx} = \frac{v}{1+v^3} \dots\dots\dots (3)$

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v}{1+v^3} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v-v(1+v^3)}{1+v^3} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v-v-v^4}{1+v^3} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{-v^4}{1+v^3}$$

$$\Rightarrow -\frac{dx}{x} = \frac{1+v^3}{v^4} dv \Rightarrow \int -\frac{dx}{x} = \int \frac{1+v^3}{v^4} dv \Rightarrow -\int \frac{dx}{x} = \int \frac{1}{v^4} dv + \int \frac{v^3}{v^4} dv$$

$$-\int \frac{dx}{x} = \int v^{-4} dv + \int \frac{1}{v} dv \Rightarrow -\ln|x| = -\frac{1}{3} v^{-3} + \ln|v| + \ln|c|, c > 0$$

$$-\ln|x| = -\frac{1}{3v^3} + \ln|v| + \ln|c| \Rightarrow \frac{1}{3v^3} = \ln|x| + \ln|v| + \ln|c|$$

$$\frac{1}{3v^3} = \ln|cxv| \Rightarrow \frac{1}{3\left(\frac{y}{x}\right)^3} = \ln|cx\left(\frac{y}{x}\right)|$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\frac{3y^3}{x^3}} = \ln|cy| \Rightarrow \frac{x^3}{3y^3} = \ln|cy| \Rightarrow y^3 = \frac{x^3}{3\ln|cy|} \Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt[3]{3\ln|cy|}}$$

حل المعادلة التفاضلية الآتية $(x^2 + 3y^2)dx - 2xy dy = 0$

2016 دور 2

sol : $2xydy = (x^2 + 3y^2) dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 3y^2}{2xy}$

بقسمة البسط والمقام على $x^2 \neq 0$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x^2 + 3y^2}{x^2}}{\frac{2xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x^2}{x^2} + \frac{3y^2}{x^2}}{\frac{2xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 + 3(\frac{y}{x})^2}{2(\frac{y}{x})} \rightarrow \text{المعادلة متجانسة}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + 3v^2}{2v}$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + 3v^2}{2v}$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + 3v^2}{2v} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + 3v^2 - 2v^2}{2v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{2v} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{2v dv}{1 + v^2}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{2v dv}{1 + v^2} \Rightarrow \ln|x| = \ln|1 + v^2| + \ln c, c > 0$$

$$\ln|x| = \ln|c(1 + v^2)| \Rightarrow |x| = |c(1 + v^2)|$$

$$x = \mp c(1 + v^2) \Rightarrow x = \mp c(1 + (\frac{y}{x})^2) \Rightarrow x = \mp c(1 + \frac{y^2}{x^2})$$

التقييم | السؤال من التمارين العامة الخاصة بالكتاب المقرر ويعد من الاسئلة المتوسطة الصعوبة . ويمكن للطلاب عدم كتابة السطرين الاخيرين وينتهي السؤال بمجرد اجراء التكامل على ان يستبدل $(\frac{y}{x})$ بـ v

قصي هاشم التميمي

2016 دور 2 خارج

$$y' = \frac{3y^2 - x^2}{2xy} \quad \text{حل المعادلة التفاضلية}$$

sol :

لينتج

بقسمة البسط والمقام على $x^2 \neq 0$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3y^2 - x^2}{x^2}}{\frac{2xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3y^2}{x^2} - \frac{x^2}{x^2}}{\frac{2xy}{x^2}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{3\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 1}{2\left(\frac{y}{x}\right)} \Rightarrow \text{المعادلة متجانسة}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3(v)^2 - 1}{2(v)} \quad \dots\dots\dots (1)$$

نفرض ان $\frac{y}{x} = v$ لينتج

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad \dots\dots\dots (2)$$

نشتق العلاقة $y = vx$ بالنسبة الى المتغير x لينتج

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{3(v)^2 - 1}{2(v)} \quad \dots\dots\dots (3)$$

نعوض المعادلة (2) بالمعادلة (1) لينتج

نقوم بفصل المتغيرات لينتج

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{3v^2 - 1}{2v} - v \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{3v^2 - 1 - 2v^2}{2v} \Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1}{2v}$$

$$(v^2 - 1) dx = 2v x dv \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{2v dv}{v^2 - 1}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{2v dv}{v^2 - 1} \Rightarrow \ln|x| = \ln|v^2 - 1| + \ln c, c > 0$$

$$\ln|x| = \ln|c(v^2 - 1)| \Rightarrow x = \pm c(v^2 - 1)$$

$$\Rightarrow c = \pm \left(\frac{x}{v^2 - 1} \right) \Rightarrow c = \pm \left(\frac{x}{\left(\frac{y}{x}\right)^2 - 1} \right) \Rightarrow c = \pm \frac{x}{\frac{y^2}{x^2} - 1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c = \pm \frac{x}{\frac{y^2 - x^2}{x^2}} \Rightarrow c = \pm \frac{x^3}{y^2 - x^2}$$

يفضل ولا يجب التبسيط اي تقبل وزاريا دون تبسيط

حملة شبابنا

برنامج

رحلتي في السادس

هذا البرنامج يهدف الى خدمة طلاب السادس
ومساعدتهم لتخطي هذه المرحلة من خلال
توفير ما يحتاجونه من ملازم ونصائح ودروس
وكل ما يقدم في مجموعة برنامج رحلتي في
السادس هو مجاني حيث ان هذا العمل غير
ربحي من دون اي مقابل وانما هو
الى الله تعالى

يمنع طباعتها او بيعها بأكثر من سعر الاستنساخ